

# السلسلة الفضية



الأستاذ بن خريف مصطفى

الأستاذ بن مداني جلال

بالتعاون مع فريق عكاشة

## علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

كل ما تحتاجه في كتاب واحد شامل



منهجية الأجوبة في البكالوريا

دروس شاملة ومحفظة وبطريقة بسيطة

جميع التجارب المقررة في برنامج البكالوريا

دوليات وطنية مقسمة حسب الوحدات ومرتبة حسب نموذج التمرين

دوليات أجنبية مقسمة حسب الوحدات ومرتبة حسب نموذج التمرين

تمارين مقترنة مقسمة حسب الوحدات ومرتبة حسب نموذج التمرين

موافقة للبناء الجديد للاختبار

أدوية دقيقة ومحفظة

التحضير الجيد لبكالوريا الجزائر

عكاشة  
BOOKSTORE  
We can help you  
لهم الله أقرب

# جدول محتويات السلسلة الفضية في علوم الطبيعة والحياة

امتحان شهادة البكالوريا

منهجية الإجابة

٩

## المجال ا: التخصص الوظيفي للبروتينات

**الوحدة ٠١: تركيب البروتين**

١١

١- جزء ال دروس

١١

١- اكتشاف

١١

٢- مفاهيم أساسية

١٢

٣- الاستنساخ

١٨

٤- الشفرة الوراثية

٢٠

٥- الترجمة

٢٢

خلاصة

٢٤

٦- جزء التمارين

٦

نماذج عن التمارين الأول ٤٦ | نماذج عن التمارين الثاني ٣٣ | نماذج عن التمارين الثالث ٤٦

٥٦

**الوحدة ٠٢: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين**

٥٦

٧- جزء ال دروس

٥٦

١- الأحماض الأمينية

٥٨

٢- بنية البروتين

٦١

٣- العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

٦٣

خلاصة

٦٤

٧- جزء التمارين

٧٧

نماذج عن التمارين الثالث ٧٧ | نماذج عن التمارين الثاني ٧٤ | نماذج عن التمارين الأول ٦٤

<b>المقدمة 05: دور البروتينات في الاتصال العصبي</b>	231
١. جزء الدروس	231
١- كمون ونبار	231
٢- جهاز عصبي	231
٣- منعكس عضلي	234
٤- كمون الراحة	235
٥- كمون العمل	239
٦- نقل مشبك	243
٧- إدماج عصبي	247
٨- المخدرات	247
خلاصة	248
١١. جزء التمارين	249
تمارين عن التمارين الأولى ٢٤٩   تمارين عن التمارين الثانية ٢٥٨   تمارين عن التمارين الثالثة ٢٧٣	249
<b>المجال 02: نوارات طاقمية</b>	293
١. جزء الدروس	293
<b>المقدمة 01: تركيب ضوئي</b>	293
١- تركيب ضوئي	293
٢- شدة التركيب الضوئي	294
٣- مقر التركيب الضوئي	295
٤- مراحل التركيب الضوئي	297
٥- حضيلة التركيب الضوئي	309
خلاصة	309
<b>وحدة 02: تنفس وتخمر</b>	310
<b>التنفس</b>	310
١- مقر التنفس	310
٢- مراحل التنفس	311
٣- مقارنة بين الفسفرة الناكسدية والفسفرة الضوئية	318
٤- حضيلة طاقمية للتنفس	318

- ١- مفهوم الازم وأهميته
  - ٢- بنية الازم
  - ٣- تفاعل إنفي
  - ٤- حركة الازم
  - ٥- عوامل المؤثره على اتجاه الازم
  - ٦- حزء التعارين

١١- جزء المغاريل ..... ٩٥  
نماذج عن التمرين الثاني .. ٩٦ .. | نماذج عن التمرين الثالث ١١  
نماذج عن التمرين الأول . ٩٣

#### **المقدمة 04: دور البروتستانت في الدفاع عن الذات**

- |   |     |
|---|-----|
| ١- معانة طبيعية ومعانة مكشبة.....   | 131 |
| ٢- جهاز مناعي .....   | 132 |
| ٣- ذات ولادات.....  | 132 |
| ٤- مولود الصيد .....  | 141 |
| ٥- استجابة خلطية.....   | 141 |
| ٦- استجابة خلوية.....   | 149 |
| ٧- تغير الخلايا المعانة.....  | 155 |
| ٨- اختبار نمط الاستجابة المعانة.....  | 156 |
| ٩- فقدان المعانة المكشبة (سیدا).....  | 159 |
| خلاصة.....  | 163 |
| ١١- جزء التقارير.....   | 164 |
| نداج عن التعریف الأول 164   نداج عن التعریف الثاني 177   نداج عن التعریف الثالث 199 |     |

الـ جـزـءـ الـتـعـارـيفـ

نماذج عن التصريح الأول 164 | نماذج عن التصريح الثاني 177 | نماذج عن التصريح الثالث 199

## امتحان شهادة البكالوريا

امتحان مادة علوم الطبيعة والحياة لشعبة العلوم التجريبية يتضمن موضوعين (02) على الخبار، مدته الامتحان أربع (04) ساعات، تضاف لها نصف ساعة (30 دقيقة) لاحتيار الموضوع.

يبي الاعتبار بكيفية تحقيق العدل والإنصاف بين كل التلاميذ بحيث:

- المواضيع مطابقة لما درسه التلاميذ في الأقسام.

- التمارين متنوعة تغطي الحالات التي درسها التلاميذ.

- المواضيع تصاغ بعناية وأسلوب واضح يكون مفهوماً من طرف كل مرشح وتكون التعليمات دقيقة وواحدة من الغموض والتأنويل.

- المواضيع تحترم المدة الضرورية لإنجازها بالنظر إلى مرشح ذو مستوى دراسي متوسط.

- قابلية الموضوع للحل من قبل مرشح متوسط المستوى خلال الزمن المخصص للاختبار.

- يأخذ بعين الاعتبار الزمن اللازم للقراءة، الفهم، التفكير والإجابة الكتابية.

والشكل العام للمواضيع ينجز بعناية بحيث يرقم الموضوعين وترقم الصفحات والتمارين والقرارات والوثائق والتعليمات، وتوضع النقطة الممنوعة لكل تمرين. الوثائق تكون واضحة والنصوص مفرومة ودقيقة علمياً ولغوياً.

- يشمل كل موضوع ثلاثة تمارين مستقلة إجبارية.

### التمرين الأول (05 نقاط): استرجاع معارف

يحتوي التمرين جزءاً واحداً، يتضمن وثيقة واحدة تحتوي على شكل أو شكلين، يمكن أن تكون صوراً، رسوماً تخطيطية أو نصاً، ويمكن ألا يتضمن التمرين أي وثائق. عدد التعليمات في هذا التمرين لا يتجاوز الاثنين، يطلب في التعليمية الثانية غالباً إنجاز نص علمي.

### التمرين الثاني (07 نقاط): استدلال علمي

يحتوي التمرين جزأين (الجزء الأول، الجزء الثاني)، ويتضمن وثيقتين على الأكثر تحتوي أربع أشكال على الأكثر.

عدد التعليمات لا يتجاوز الاثنين في الجزء الأول ولا يتجاوز الثلاثة في الجزء الثاني.

الاستدلال العلمي: هو عملية بحث منظم وتفكير عميق باستغلال الوثائق المقدمة في التمرين مع معلوماتك القبلية مما يسمح بتقديم الحجج والأدلة والبراهين بطريقة معمقة ودقيقة لاستحداث معلومة جديدة.

### التمرين الثالث (08 نقاط): استدلال علمي ضمن مسعى علمي

يحتوي التمرين ثلاثة أجزاء (الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث)، يتضمن وثيقتين على الأكثر، تحتوي خمسة أشكال على الأكثر. الجزء الثالث يطلب فيه إنجاز حصيلة تركيبية: خلاصة، رسماً تخطيطياً، مخطط أو نصاً علمياً.

المسعى العلمي (المنهج العلمي، المنهج التجريبي): هو الطريقة العملية التي يستخدمها العلماء من أجل جمع معلومات يتوصلون بها لفهم ظاهرة طبيعية، ويتضمن المسعى العلمي بالضرورة استدلالاً علمياً.

## منهجية الإجابة

الصلة المذهبة

علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

الصلة المذهبة  
استدلال علمي

- يستغل النتائج والمعطيات: تبدأ بقراءة الوثيقة وتوضيح الملاحظات (بين الوثيقة...، نلاحظ... وهذا يدل...).
- تدمج الموارد من المعطيات والمكتبات. (علم أن...).

- بناء إجابة تفسيرية منسجمة تدمج النتائج. (إذن أو نستنتج أن...)

- تستعمل الاستدلال العلمي للتبين والتحقق من صحة الفرضية أو الفرضيات.

- الجاز رسم خططي وظيفي أو تفسيري: يرسم باليد، يهدف إلى توضيح وظيفة ما، يرفق إجراءيا بكامل

- البيانات اللازمة والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوظيفة المراد توضيحها.

- خطط تركيجي: هي تمثيل خططي يلخص عناصر الموضوع بوضوح، لهذا يطلب دائما في آخر سؤال من

- التسرين. ينجز كالتالي:

- تحديد العناصر الأساسية المكونة للموضوع المدرس في التسرين، وهي عادة ما تكون واردة في التسرين

- بشكل متسلل.

- ترتيب هذه العناصر حسب تسلسلها وتنظيمها أفقيا أو عموديا.

- تربط بين مختلف العناصر بشكل منطقي باستعمال أسمهم ذات اتجاه صحيح.

- وضع عنوانا مناسبا للمخطط.

- شرح: يبسط ما يطلب شرحه.

- ذكر: تعد باختصار دون تفصيل وتحدد أدق من الكلمات.

- عد: ذكر أسماء جميع العناصر دون التعليق عليها.

- وصف: قراءة إجمالية وترجمة لما نلاحظه من تطورات ظاهرة معينة، لا تستعمل كلمات أو تعبيرات تفيد المقارنة مثل بينما أو التعليل مثل لأن.

- تصنيف: تنظم ونوع في مجموعات أو أقسام وفق ترتيب معين انطلاقا من معيار واحد أو عدة معايير.

طرح مشكل علمي: تصيغ على شكل سؤال كان بهذا: كيف تفسر...؟  
صياغة فرضية: تدرج حال تفسيرها موقعا فاقدا للاختبار باللاحظة والتجربة.  
تحليل: غير التحليل بثلاث مراحل:

- 1- تعرف بالوثيقة المدرسبة.

- 2- تشكك المعطيات العلمية إلى مختلف إجرائها ويجد علاقة بين العناصر.

- 3- تقدم استنتاجا.

مثال: تحليل منحى عن ظاهرة بيولوجية محددة متغيرة بدلالة بعد معين قد يكون مثلا الزمن أو تركيز مادة  
يعبر المنحى عن الإضافة والظلام... غير تحليل منحى بدلات مراحل كذلك:

- 1- تحديد الظاهرة المدرسبة: تحديد الظاهرة المتغيرة على محور أو محاور الترتيب وتحدد العامل المغير على

- محور التواصل.

- 2- دراسة تغيرات الظاهرة: تقوم بتصنيم المنحى إلى فترات زمنية أو مراحل أو مقاطع حسب نوع الوثيقة

- وذلك الوحدات المستعملة. لا تقول "يرتفع المنحى" أو "ينخفض المنحى"، بل تقول "زيادة الظاهرة" أو

- "نقصها".

- 3- بحث عن التغيرات الموجودة مثل التزايد، التناقض، الثبات، الاستقرار، التوقف، الانعدام...

- 3- الاستنتاج.

استنتاج: تقدم فكرة أساسية انطلاقا من معطيات مقدمة.

تفسير: تذكر الظاهرة أو النتيجة أو الملاحظة ثم تقدم أسبابها، وذلك بالإجابة عن السؤالين: ما...؟

وكيف؟

مقارنة: تتم المقارنة في ثلاثة مراحل.

1- تحديد موضوع المقارنة والمدلف منه.

2- توضح أوجه الشبه والاختلاف.

3- تقدم استنتاجا.

تعليق (أثري): تقدم الأدلة على صحة ما طلب تعليمه. التعليل ليس له صيغة معينة، قد يكون على

شكل تحليل أو ملاحظة أو مقارنة...

كتابة نص علمي

- مقدمة: تكتب مبادئ الظاهرة ثم نظر الشكل العلمي.

- عرض: تحيج عن الشكل العلمي المطروح بالتفصيل وبأسلوب علمي دقيق ولغة سلية.

- خاتمة: تكتب المقدمة الأساسية التي تحيج عن الشكل العلمي باختصار.

## الوحدة 01: تركيب البروتين

### ا- جزء الدرس

#### 1- اكتشاف

- المورثات تحدد النمط الظاهري: في سنة 1902 وضع طبيب بريطاني نظرية مفادها أن "المورثات تحدد النمط الظاهري" بواسطة إنزيمات تحفز تفاعلات كيميائية محددة في الخلية. واستدل على ذلك من الأمراض الوراثية حيث تنتج أعراضها (الصفات) من عجز العضوية عن تركيب إنزيم معين.
- مورثة واحدة - إنزيم واحد: بعد ذلك توصل العلماء إلى اكتشاف حول العلاقة بين المورثة والإنزيم تم تلخيصه في النظرية "مورثة واحدة إنزيم واحد"، أي كل مورثة مسؤولة عن تركيب إنزيم معين.
- مورثة واحدة - بروتين واحد: بعد دراسات أكثر دقة عن البروتينات، تم تغيير هذه الفرضية لأن البروتينات ليست كلها إنزيمات، فمثلا الكيراتين بروتين بنوي يركب شعر الثديات، والأنسولين هو هرمون... ووضعت الفرضية "مورثة واحدة بروتين واحد".
- مورثة واحدة - متعدد بيتيد واحد: بعد التوصل إلى أنه توجد عدة بروتينات تتركب من سلسلتين بيتيدتين أو أكثر لكل منها مورثة خاصة، مثل الهيموغلوبين الذي يتربّك من أربع سلاسل، وجب على العلماء تغيير صيغة الفرضية السابقة إلى "مورثة واحدة متعدد بيتيد واحد".

#### 2- مفاهيم أساسية

##### 2-1- تعبير مورثي

ظاهرة حيوية يتم فيها التعبير عن المعلومات الوراثية المحمولة على الـ ADN إلى بروتينات أو ARN وظيفي مثل الـ ARNr والـ ARNt. في الخلايا حقيقة النواة يتم التعبير عن المورثات إلى بروتينات في مرحلتين: الاستنساخ في النواة والترجمة في الهيولى.

##### 2-2- نمط تكويبي ونمط ظاهري

في النواة، توجد جزيئات ضخمة تحمل المعلومات الوراثية لكل بروتينات الخلية تسمى الحمض النووي منقوص الأكسجين (ADN). كل قطعة من الـ ADN مسؤولة عن تركيب متعدد بيتيد معين وتسمى المورثة، يسمى مجموع المورثات بالنط تكويبي أو النمط الوراثي. ينبع عن التعبير المورثي للمورثات بروتينات نوعية تتشكل منها البنيات الخلوية وتقوم بمحظوظ الوظائف فتكتسب العضوية صفات وراثية خاصة بها، يسمى مجموع الصفات بالنط الظاهري ويظهر على ثلاث مستويات: الجزيئي، الخلوي والعضوي.

##### 2-3- معلومة وراثية، مورثة وأليل

تتركب المورثة من تالي عدد محدد من النكليوتيدات، يشكل هذا التتابع معلومة وراثية متعدد بيتيد معين. تختلف النكليوتيدات في القاعدة الآزوتية فقط لذا يمكن القول بأن المعلومة الوراثية تكتب بترتيب عدد محدد من القواعد الآزوتية.

### السلسلة المعلمة

تحمل الوراثة المعلومة الوراثية متعدد بيتيد معين، ويمكن أن يوجد اختلاف طبيعي في بعض القواعد الأزوتية نفس الوراثة بين أفراد النوع الواحد، وبالتالي يوجد لنفس الوراثة عدة أشكال يتنبأ بها صفات مختلفة كل شكل منها يسمى الجين.

قد يتغير التتابع النوكليويني بسبب تزعع، إضافة، استبدال أو قلب نوكليوتيد أو أكثر ويسمي ذلك بالطفرة، وهي ظاهرة نادرة ومفاجئة تحدث بصورة تلقائية أو يمكن إحداثها بواسطة عوامل فخرىان كالأشعة السينية.

### 3. الاستنساخ

#### 3-1. مفهوم الاستنساخ

الاستنساخ هو تركيب جزيء ARN انطلاقاً من المعلومة الوراثية المخولة على ADN.

يمكن ملاحظة عملية الاستنساخ بالجهير الإلكتروني على مستوى التواه حيث يظهر خيط مرتكبي سبلان ADN، تتبع منه عدة خيوط رفيعة متزايدة الطول في اتجاه واحد تتمثل جزيئات ARN في طر الشكل.


يعنى الـ ARN الناتج عن استنساخ مورثة مسؤولة عن تركيب البروتين معين بالـ ARN الرسول أو ARNm.

#### 3-2. تجارب تظهر مكونات وبنية الـ ARN


##### 3-2-1. الإماءة الكلية

يعنى تفكك الـ ARN إلى جزيئات أساسية باستعمال حمض قوي (HCl) أو قاعدة قوية (NaOH) وفي درجة حرارة مرتفعة، ينتج عنها ثلاثة جزيئات أساسية:

- حمض الفوسفوريك ( $H_3PO_4$ )



- سكر حمضي: الريبوز ( $C_5H_{10}O_5$ )



- أربعة أنواع من القواعد الأزوتية:

- قواعد أزوتية بيريميدية: يوراسيل (U) وسيتوzin (C).


- قواعد أزوتية بيريفينية: أدينين (A) وغوانين (G).

### السلسلة المعلمة

#### الوحدة 01: تركيب البروتين

##### • تجربة 2: الإماءة الجزئية

يتم فيها تفكك جزئي الـ ARN بواسطة الإنزيم ARNase (إماءة إنزيمية)، ينتج عنها عدد كبير من أربعة أنواع من الوحدات تسمى نوكليوينات. تتركب النوكليوتيد الواحدة من سكر الريبوز ترتيبه في القاعدة الأزوتية بالكتروين رقم 1' من جهة وحمض الفوسفوريك بالكتروين رقم 5' من جهة أخرى.



النيوكليوتيد المميتة لـ ARN

- البيروريدين أحادي الفوسفات - UMP

#### • مقارنة بين الـ ADN والـ ARN

- أوجه التشابه: يتألف التركيب الكيميائي لـ ADN والـ ARN في ثلاثة أنواع من القواعد الأزوتية: A, G, C, T.
- بالإضافة إلى حمض الفوسفور.
- أوجه الاختلاف

ARN	ADN	
شريط خطري	جزوني مضاعف	بنية فرعية
سلسلة واحدة	سلسلتين	عدد سلاسل متعددة النوكليوتيد
U	T	قاعدة آزوتية مميتة
ريبوز عادي	ريبوز منقوص الأكسجين	نوع السكر

#### 2-3. عناصر الاستنساخ



تدخل في عملية الاستنساخ أربعة عناصر: مورثة، الإنزيم ARN بوليميراز، نوكليوتيدات حرة وطاقة (ATP).

##### أ- مورثة

تحمل المعلومة الوراثية للبروتين على شكل تتابع محدد لعدد من النوكليوتيدات.

##### ب- ARN بوليميراز

مسؤول عن عملية الاستنساخ.



**4-3. أنواع الـ ARN الناتجة عن الاستنساخ**

**ARNm** -

يتركـبـ الـ ARNـ منـ سـلـسلـةـ ARNmـ وـاحـدةـ مـنـ مـتـعددـ الـ نـكـلـيوـتـيدـ يـخـلـفـ طـوـلـ المـورـثـةـ الـقـيـاسـيـةـ مـنـ هـنـاـهاـ،ـ حـمـلـ نـسـخـةـ مـنـ الـمـعـلـوـمـةـ الـوـرـالـيـةـ الـلـلـبـرـوـتـيـنـ.ـ

**تجربـةـ** تـظـهـرـ أنـ ARNmـ يـحـمـلـ نـسـخـةـ مـنـ الـمـعـلـوـمـةـ الـوـرـالـيـةـ الـلـلـبـرـوـتـيـنـ.


وـضـعـتـ ثـلـاثـ مـجـمـوعـاتـ مـنـ الـخـلـاـيـاـ فـيـ وـسـطـ يـحـتـويـ عـلـىـ اـحـمـاصـ أـمـيـنـيـةـ مـوـسـمـةـ بـنـظـيرـ مـشـعـ.

المـجـمـوعـةـ الـأـوـلـىـ:ـ الـخـلـاـيـاـ الـأـصـلـيـةـ لـكـرـاتـ الـدـمـ الـحـمـراـءـ (ـكـ دـحـ)ـ لـلـأـرـنـبـ وـالـتـيـ لـهـ الـقـدرـةـ عـلـىـ تـرـكـيبـ بـرـوـتـيـنـ الـهـيـمـوـغـلـوبـينـ.

المـجـمـوعـةـ الـثـانـيـةـ:ـ الـخـلـاـيـاـ الـبـيـضـيـةـ لـلـضـفـدـعـ مـحـقـونـةـ بـ ARNـ تـمـ عـرـلـهـ وـتـقـيـيـهـ مـنـ الـخـلـاـيـاـ الـأـصـلـيـةـ لـ (ـكـ دـحـ)ـ لـلـأـرـنـبـ.ـ تـمـ اـسـتـخـالـصـ وـفـصـلـ بـرـوـتـيـنـاتـ الـتـيـ اـنـجـتـ الـأـحـمـاصـ الـأـمـيـنـيـةـ الـمـشـعـةـ بـوـاسـطـةـ تـقـيـيـةـ التـسـجـيلـ الـلـوـنـيـ (ـكـرـوـمـاـتـوـغـرـافـيـ)ـ وـتـحـدـيدـ مـوـاـضـعـهـ وـكـمـيـةـ الـإـشـعـاعـ فـيـهـاـ بـتـقـيـيـةـ خـاصـةـ.ـ نـتـائـجـ الـتـجـربـةـ مـوـضـحـةـ فـيـ الـوـثـيقـةـ الـتـالـيـةـ.

**السلسلة الفضية****الوحدة 01: تركيب البروتين****تصوير إشعاعي ذاتي**


تقنية تعتمد على تصوير الإشعاعات الصادرة من النظائر المشعة مثل  $^{35}\text{S}$  و  $^{32}\text{P}$  التي تدخل في تركيب العينة المدرسة بواسطة فيلم الأشعة السينية. تستخدم لتنعيم مصير العنصر الموسوم بنظير مشع (حمض أميني، بوراسييل...) والجزيئات التي يدخل في تركيبها والتخلصات التي تطرأ عليه. فمثلاً للتعرف على مقر تركيب البروتين تستعمل أحماض أمينية موسومة، ولدراسة مقر تركيب الـ ARN نستخدم البوراسييل أو البوريدين الموسوم...

**• التحليل**

تبين الوثيقة نتائج فصل البروتينات المشعة بواسطة تقنية التسجيل اللوني (الكروماتوغرافي) لثلاث معمور  $^{35}\text{S}$  نكليوتيديه من الخلايا وضعت في وسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة بنظير مشع حيث نلاحظ: تلف السلسلة حول نفسها مشكلة بنية فراغية مستقرة بفضل الروابط الهيدروجينية التي تتشكل بين القواعد الأزووية المتكاملة. تظهر الحمراء (ك د ح) للإرث قامت بتركيب بروتين الهيموغلوبين. المجموعة الثانية: ظهور ذروة واحدة تمثل الهيموغلوبين. وهذا يدل على أن الخلايا الأصلية لكرتون  $\text{L}$  البنية الحقيقية ثلاثة الأبعاد للـ ARNr على شكل حرف L مقلوب. إذا مثلنا جزيئة الـ ARNr بشكل مسطح لإظهار قطع القواعد الأزووية المتكاملة فإنه تتحدد بنية ثنائية الأبعاد على شكل ورقة النفل.

المجموعة الثالثة: ظهور ذروتين تمثلان البروتينين الخاصين بالخلايا البيضية، وذروة ثالثة تمثل الهيموغلوبين للرامزة المضادة، وهذا يدل على أن الخلايا البيضية المحقونة بـ ARNm مستخلص من الخلايا الأصلية  $\text{L}$  (ك د ح) قامت بتركيب بروتيناتها الخاصة، وكذلك الهيموغلوبين الخاص بالخلايا الأصلية  $\text{L}$  (ك د ح).

ستنتهي أن الـ ARNm يحمل المعلومة الوراثية لبروتين معين.

**ARNt**

يتركب الـ ARNr من سلسلة ARNr واحدة لا يتجاوز طولها 80 نكليوتيده تغيراً. تلف السلسلة حول نفسها مشكلة بنية فراغية مستقرة بفضل الروابط الهيدروجينية التي تتشكل بين القواعد الأزووية المتكاملة. تظهر الحمراء (ك د ح) للإرث قامت بتركيب بروتين الهيموغلوبين. المجموعة الثانية: ظهور ذروة واحدة تمثل الهيموغلوبين. وهذا يدل على أن الخلايا البيضية المحقونة بـ ARNr على موقعين أحدهما لثبت الحمض الأميني والأخر وهذا يدل على أن الخلايا البيضية المحقونة بـ ARNm مستخلص من الخلايا الأصلية  $\text{L}$  (ك د ح) قامت بتركيب بروتيناتها الخاصة، وكذلك الهيموغلوبين الخاص بالخلايا الأصلية  $\text{L}$  (ك د ح).

**تجربة تظهر أن الـ ARNm ينتقل من النواة إلى الهيولى.**

تم في تجربة أخرى تحضن خلايا حيوانية لفترة قصيرة في وسط يحتوي على البوراسييل المشع ثم حررت الخلايا إلى وسط بوراسييل عادي وترك لفترة أطول. نتائج التصوير الإشعاعي الثاني في الحالتين موضحة في الوثيقة التالية:


**• التحليل**

تمثل الوثيقة نتائج التصوير الإشعاعي الثاني لخلايا تم حضنها في وسط يحتوي على البوراسييل المشع حيث نلاحظ: - بعد فترة قصيرة: تمركز الإشعاع في النواة فقط، دليل على وجود البوراسييل المشع في النواة. - بعد فترة أطول: ت擴ص الإشعاع في النواة وانتشاره في الهيولى، دليل على انتقال البوراسييل المشع من النواة إلى الهيولى.

ستنتهي أن الـ ARNm يتركب في النواة ثم ينتقل إلى الهيولى.

**ARNr****تجربة تبين أحاطة الـ ARNr الهيولية.**

يتم فصل الأحماض النووي الرئيبة (ARNr) بتقنية الطرد المركزي، ثم يتم قياس كعبيتها أثناء فترة تركيب البروتين وخارجها. النتائج المتحصل عليها موضحة في الوثيقة التالية:



التجربة بـ: خارج فترة تركيب البروتين

#### السلسلة الفرعية

٤- التحليل المقارن للتسجيلين (أ) و(ب)

٥- التسجيل

٦- التسجيل

٧- التسجيل

٨- التسجيل

٩- التسجيل

١٠- التسجيل

١١- التسجيل

١٢- التسجيل

١٣- التسجيل

١٤- التسجيل

١٥- التسجيل

١٦- التسجيل

١٧- التسجيل

١٨- التسجيل

١٩- التسجيل

٢٠- التسجيل

٢١- التسجيل

٢٢- التسجيل

٢٣- التسجيل

٢٤- التسجيل

٢٥- التسجيل

٢٦- التسجيل

٢٧- التسجيل

٢٨- التسجيل

٢٩- التسجيل

٣٠- التسجيل

٣١- التسجيل

٣٢- التسجيل

٣٣- التسجيل

٣٤- التسجيل

٣٥- التسجيل

٣٦- التسجيل

٣٧- التسجيل

٣٨- التسجيل

٣٩- التسجيل

٤٠- التسجيل

٤١- التسجيل

٤٢- التسجيل

٤٣- التسجيل

٤٤- التسجيل

٤٥- التسجيل

٤٦- التسجيل

٤٧- التسجيل

٤٨- التسجيل

٤٩- التسجيل

٥٠- التسجيل

٥١- التسجيل

٥٢- التسجيل

٥٣- التسجيل

٥٤- التسجيل

٥٥- التسجيل

٥٦- التسجيل

٥٧- التسجيل

٥٨- التسجيل

٥٩- التسجيل

٦٠- التسجيل

٦١- التسجيل

٦٢- التسجيل

٦٣- التسجيل

٦٤- التسجيل

٦٥- التسجيل

٦٦- التسجيل

٦٧- التسجيل

٦٨- التسجيل

٦٩- التسجيل

٧٠- التسجيل

٧١- التسجيل

٧٢- التسجيل

٧٣- التسجيل

٧٤- التسجيل

٧٥- التسجيل

٧٦- التسجيل

٧٧- التسجيل

٧٨- التسجيل

٧٩- التسجيل

٨٠- التسجيل

٨١- التسجيل

٨٢- التسجيل

٨٣- التسجيل

٨٤- التسجيل

٨٥- التسجيل

٨٦- التسجيل

٨٧- التسجيل

٨٨- التسجيل

٨٩- التسجيل

٩٠- التسجيل

٩١- التسجيل

٩٢- التسجيل

٩٣- التسجيل

٩٤- التسجيل

٩٥- التسجيل

٩٦- التسجيل

٩٧- التسجيل

٩٨- التسجيل

٩٩- التسجيل

١٠٠- التسجيل

#### الوحدة ١٠: تركيب البروتين

١-

٢-

٣-

٤-

٥-

٦-

٧-

٨-

٩-

١٠-

١١-

١٢-

١٣-

١٤-

١٥-

١٦-

١٧-

١٨-

١٩-

٢٠-

٢١-

٢٢-

٢٣-

٢٤-

٢٥-

٢٦-

٢٧-

٢٨-

٢٩-

٣٠-

٣١-

٣٢-

٣٣-

٣٤-

٣٥-

٣٦-

٣٧-

٣٨-

٣٩-

٤٠-

٤١-

٤٢-

٤٣-

٤٤-

٤٥-

٤٦-

٤٧-

٤٨-

٤٩-

٥٠-

٥١-

٥٢-

٥٣-

٥٤-

٥٥-

٥٦-

٥٧-

٥٨-

٥٩-

٦٠-

٦١-

٦٢-

٦٣-

٦٤-

٦٥-

٦٦-

٦٧-

٦٨-

٦٩-

٧٠-

٧١-

٧٢-

٧٣-

٧٤-

٧٥-

٧٦-

٧٧-

٧٨-

٧٩-

٨٠-

٨١-

٨٢-

٨٣-

٨٤-

٨٥-

٨٦-

٨٧-

٨٨-

٨٩-

٩٠-

٩١-

٩٢-


٩٣-

٩

## علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

**السلسلة الفرعية**  
**4-2. ميراث الشفرة الوراثية** هي ميراث الشفرة الوراثية إلى بروتين هي التثليث، الترداد، الشفرونة والشمولية.

**بنية الريبوزوم:** تتكون من تحت وحدتين، تحت وحدة صغيرة تحمل موقع ارتباط الـ ARNm، وتحت وحدة كبيرة تحمل موقعين تحفيزيين (A و P) خاصين بارتباط الـ ARNr.



### بـ. احماض أمينية


تمثل الوحدات البالية للبروتينات، تُخَرِّجُها الخلايا في المحلول بحيث بعضها تركب نفسها والأخرى تتجه عن هضم البروتينات وتصل إلى الخلايا عن طريق الشعيرات الدمعوية. تنشط الأحماض الأمينية في المحلول وتُخَرِّجُ في المحلول لتكون جاهزة عند القيام بعملية تركيب البروتين.

### 3-5. تنشيط الحمض الأميني

هي ربط الحمض الأميني بجزئي الـ ARNr الخاص به وتم في ثلاثة خطوات:

- يربط كل من الحمض الأميني والـ ARNr الخاص به بالموقع الفعال لإzym التنشيط الخاص به كذلك يسمى أمينوسيل ARNr ستيكاز.
- يُحْفِرُ الإنزيم **تشكل** رابطة تكافؤية (رابطة أستر فوسفاتية) بين الحمض الأميني والـ ARNr ويتم خلاها إماهه ATP.

- ينفصل المعقد "حمض أميني - ARNr" عن الإنزيم ويصبح الحمض الأميني جاهزاً لعملية الترجمة.



### برنامِج أناجان

يستعمل البرنامج في:

- عرض ومقارنة تتابع الكليوتيونات في ADN أو ARN أو تتابع احماض أمينية.
- إجراء عملية الاستنساخ (من ADN إلى ARN).
- مقارنة بين مورثات طبيعية ومورثات طافرة لتحديد موقع ونوع المطفرة بسهولة.

### 5. الترجمة

#### 1- مفهوم الترجمة

الترجمة هي تركيب متعدد يتهدى انتقالاً من المعلومات الوراثية المخولة على الـ ARNm بعد تركيبة في النواة، ينتقل الـ ARNm عبر الثقب النووي إلى المحلول حيث يتم ترجمته بواسطة عصبة تسمى الريبوزوم، يقرأ الريبوزوم المعلومات الوراثية في الـ ARNm ويتراجمها إلى متعدد ينبع في المحلول. ترتبط عدة ريبوزومات بجزئي ARNm، واحد مشكلة متعدد الريبوزوم (الريبوزوم) حيث تسمح القراءة المتزامنة لنفس الـ ARNm من طرف عدد من الريبوزومات بتركيب كمية كبيرة من البروتين في مدة قصيرة.

#### 2- عناصر الترجمة

يتدخل في عملية الترجمة خمسة عناصر ضرورية هي: ريبوزوم، ARNm، ARNr، أحماض أمينية وإنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية.

#### أ- ريبوزوم

الطبيعة الكيميائية للريبوزوم: يتركب من ثلاثة أنواع من الـ ARNr 16S (5S, 16S, 23S) و 52 نوعاً من البروتينات الخاصة، حيث:

- تحت الوحدة الريبوزومية الكبيرة تتركب من الـ ARNr 5S (23S, 5S) و 31 نوعاً من البروتينات.
- تحت الوحدة الريبوزومية الصغرى تتركب من الـ 16S ARNr (21 نوعاً من البروتينات).




#### السلسلة النضجية

##### 4.5 آلية الترجمة

تم ترجمة المعلومة الوراثية إلى متعدد بيتيد في ثلاث مراحل: انطلاق، استطالة ونهاية.

###### الوحدة 01: تركيب البروتين

يُنصح البروتين الناتج (يكتسب بنية فراغية) ويوجه للقيام بوظيفته داخل الخلية أو خارجها. قد يكون البروتين يتألف من مدخل في بناء مختلف أجزاء الخلية، أو وظيفياً كالإنزيمات والطرمونات.



رسم تخطيطي يمثل مراحل عملية الترجمة

1- **الانطلاق**  
ترتبط تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم بالـ ARNm على مستوى الرامزة البادئة ل التركيب (AUG)، وعندما تصل رامزة البداية (Met) برامزة البادئة بواسطة رابطة هيدروجينية تنشأ بين القواعد الأزوتية للرمزة الحامل للميثيونين (Met) والرمزة الكبرى على تحت الوحدة الصغرى (UAC). بعد ذلك تتوضع تحت الوحدة الصغرى (UAC) حيث يكون الـ ARNm الأول في الموقع المفترض P (من P نسبة للبيتيد) وموقع القراءة A (شمسي A) لحمض الأميني يكون شاغراً، وهكذا يتشكل معقد الانطلاق.

2- **استطالة**  
يتوسع ARNm ثانية حاملاً حمض أميني ثانٍ موافق للرامزة الثانية في الموقع الشاغر A وتتشكل رابطة بين حمض الأمين الثاني والميثيونين. يفصل الـ ARNm الأول عن الميثيونين ويعادر الريبوزوم. ينتقل الـ ARNm بمقدار رامزة واحدة على الـ ARNm ثانية في الموقع P والموقع A شاغراً من جديد، يتوسّع ARNm ثالث حاملاً حمض أميني ثالث موافق للرامزة الثالثة وتتشكل رابطة بينية بين الحمضين الأمينيين الثاني والثالث... وهكذا ينتقل الـ ARNm على طول جزيء الـ ARNm في الاتجاه 5' نحو 3' من رامزة أخرى ويربط الأحماض الأمينية وتستطيل السلسلة البيتينية.

3- **نهاية**  
 يصل موقع القراءة A للـ ARNm إلى إحدى رامزات التوقف (UGA, UAG, UAA) فتنفصل مكونات المركب (تحت وحدتي الـ ARNm والـ ARNt)، ينفصل متعدد البيتيد عن تحت الوحدة الـ ARNm الكبرى كما ينفصل الحمض الأميني الأول للميثيونين عن السلسلة البيتينية.

#### ذلة

تواجد المعلومات الوراثية في النواة محولة على الـ ADN (المورثات).

انطلاقاً من إحدى سلسلتي الـ ADN (السلسلة المستنسخة أو الناسخة)، يقوم الإنزيم ARNt بوليسن بتركيب نسخة عن المعلومة الوراثية تتمثل في جزئي الـ ARNm، تسمى العملية بالاستنساخ، ميزتها الأساسية أنها تخضع للتكامل بين القواعد الأزوتية.

تحمل الـ ARNm الناتج المعلومة الوراثية مشفرة على شكل تتابع عدد ونوع وترتيب محدد بدقة من القراءة الأزوتية (النوكليوتيدات).


ينتقل الـ ARNm عبر النسب النووي إلى المحلول حيث ترتبط به الـ ARNm وترجمه إلى بروتين نوعي: بـ الـ ARNm رامزات الشفرة الوراثية ويربط الأحماض الأمينية الموقعة لها لـ تركيب البروتين.

## ١٠. جزء النمارين

## نماذج عن التمارين الأول

## ٢٠. التمارين ٠١

بعد ظهور النمط الظاهري إلى تركيب بروتين يسفر من طرف مورات، ولدراسة العلاقة بين المورات والبروتين والأكالا المتدخلة في ذلك واحدى خصائصه، نقترح الوثيقة التالية:



- ١- أكتب البيانات المرقمة من ١ إلى ١٠ ثم سُمِّيَّت الظاهرتين (س) و(ص) وحدد مقرها في الخلية.
- ب- تعرَّف على مرحلتي الظاهرة (ص) المُشار إليها في الشكلين (أ) و(ب).

٢- مما سبق ومعلوماتك وضح العلاقة بين المورات والبروتين.

## الإجابة الممدوذة

## ١-١- بيانات

- ١- الإنزيم ARN بوليميراز، ٢- السلسلة المستنسخة (التابخة)، ٣- السلسلة غير المستنسخة، ٤- ADN، ٥- سلسلة بيتيدية، ٦- نحت وحدة ريبوزومية كبيرة، ٧- نحت وحدة ريبوزومية صغيرة، ٨- سلسلة بيتيدية، ٩- ARNm، ١٠- ريبوزوم.


- الظاهرة (س): الاستنساخ، مقرها الواة.

- الظاهرة (ص): الترجمة، مقرها الهيولي.

ب- مرحلتي الترجمة

- الشكل (أ): النهاية.

- الشكل (ب): الاستنساخ.



١- سم البيانات المرقمة (من ١ إلى ٨) وكذلك الأحرف (أ، ب، ج، د) والنشاط (س).

٢- اشرح:

أ- النشاط (س) وحدد نوع التفاعل الحادث مدعما إجابتك بمعادلة.

ب- ظاهرة تركيب البروتين تتطلب تدفق المادة والمعلومة والطاقة.

٣- مثل برسم تخطيطي إيجابي سيرورة الظاهرة المدرستة في الوثيقة (٠١) مبرزا العلاقة بين المرحلتين.



### السلسلة الوراثية

#### رقم التصريح 03

تؤدي البروتينات دوراً فعالاً في حياة الكائنات الحية نظراً للموظائف العديدة التي تقوم بها حيث تؤدي أدوارها، كإنتاج أو هدم أو تحويل مواد ناقلة للغازات التنفسية، فتواء ناقلة، بروتينات بنائية... الخ - انطلاقاً من معارفك، اعرض في نص علمي الآليات التي تسمح بإنتاج بروتين فعال وظيفي انطلاقاً من المعلومة الوراثية المشفرة في الـ **ADN**.

#### الإجابة المودجة

السلسلة الوراثية																		
الوحدة 01: تركيب البروتين																		
ر. الألف																		
_____																		
FGAAAAAAACTGAAATTACGGT.....GCCCTGCCGCCATTATCTA A3																		
↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓																		
Ala Arg Asp Glu Gly His Ile Leu Lys Met Pro Ser Thr Trp Tyr Val																		
1 1 1 2 3 1 1 10 6 1 3 3 1 1 3 1																		
_____ ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓      ↓																		
الوبيقة																		

#### نص علمي

- 1- من الشكل (أ) في الوبيقة:
- 2- تعرف على سلسلة الـ **ADN** المقترحة.
- 3- حدد إتجاه سير الترجمة.
- 4- أوجد العلاقة بين قطعة سلسلة الـ **ADN** المقترحة وجزيئة الـ **ARNm** الناتجة.
- 5- اعتماداً على معلوماتك وما توصلت إليه من معاجلة الوبيقة، بين في نص علمي أن تركيب البروتين ينبع من المعلومة الوراثية.

#### الإجابة المودجة

#### الإجابة المودجة

#### 1- سلسلة الـ **ADN** المقترحة

- السلسلة الغير متنسخة.
- التحليل: تنتهي بالaramزة TAA وتحايل رامرة التوقف UAA في الـ **ARNm** مع استبدال الثامن T بالوراسيل U.
- ب- إتجاه سير الترجمة من 5' نحو 3'.
- الثبرير: تنتهي السلسلة بالaramزة TAA التي توافق رامرة التوقف UAA في الـ **ARNm** التي تتوقف عندها الترجمة.

#### ج- العلاقة

- علاقة تحايل مع استبدال T بـ U.
- دور الـ **ARNm**: يحمل نسخة من المعلومة الوراثية للمورنة وينقلها من النواة إلى الميول.

#### 2- نص علمي

تركب الخلايا حقيقة النواة بروتينات متخصصة بآليات دقيقة ومنظمة للقيام بمختلف نشاطاتها الحيوية. فما هي آليات تركيب البروتين وما هي مراحلها؟

في النواة، يحمل جزيء الـ **ADN** المعلومات الوراثية لكل بروتينات الخلية مشفرة على شكل تتابع دقيق لعدد من النكليوبتيدات، وكل قطعة من الـ **ADN** تشفّر لبروتين واحد وتسمى المورنة. ويتكون تركيب البروتين على مراحلتين:

- أ- الاستنساخ: انطلاقاً من إحدى سلسلتي الـ **ADN** (السلسلة المستنسخة)، يقوم الإنزيم **ARN** بوليميراز يتركب نسخة من المعلومة الوراثية محملة على الـ **ARNm** باستعمال الريونوكليوبتيدات الحرجة المتواجدة في العصارة الوراثية. تسمى العملية بالاستنساخ وتحضر للتكامل بين القواعد الأزوتية بحيث كل (A) في الـ **ADN** تقابلها 6 في الـ **ARNm**, G تقابلها T, T تقابلها A و A تقابلها U.

#### رقم التصريح 04

إن تركيب البروتين يتم بتدخل عناصر حيوية هامة وفق آليات منتظمة.

تضمن الوبيقة المعطاة شكلين كما يلى:

- الشكل (أ): يمثل إحدى سلسلتي قطعة **ADN** مكونة من 120 قاعدة أزوتية تدخل في تركيب الجزء المترجم من مورنة البروتين (6).


- الشكل (ب): يمثل جدول لأهمية الأمينة المشكلة لقطعة بروتين (X).

**السلسلة الفرعية**

**بـ الترجمة:** ينتقل الـ ARNm إلى المحلول أين تم ترجمته إلى سلسلة بيتيدية بواسطة الريبوزومات، حيث يقرأ الريبوزوم رموزات الـ ARNm ويربط الأحماض الأمينية الموقعة لها ويركب سلسلة بيتيدية تكون من عدد ونوع وترتيب محدد وراثياً من الأحماض الأمينية. يتدخل في عملية الترجمة جزيئات أخرى من إنها جزيئات الإنزيم أمينو أسييل ARNt ستزاول دورها ربط الحمض الأميني بالـ ARNt الخاص به، والـ ARNt ودوره تتيح نقل وتقدم الأحماض الأمينية إلى الريبوزوم، وكذلك التعرف على الرامنة بواسطة الرامنة المشاركة. تلغى السلسلة البيتيدية في وقت قصير إلى بروتين بودي وظيفة محددة داخل الخلية أو خارجها.

**بعض التمارين 05**

بحل ترکیب البروتین بالایات محددة مرتبطة فيما بينها من حيث المادة والمعلومة والطاقة. ممكن استعمال المخبر الإلكتروني من ملاحظة النشاط الخلوي لخلايا إفرازية وتحلل المعطيات الممثلة في الوثيقة التالية:



الوثيقة

- 1- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 6، وضع عنواناً للظاهرة الممثلة بالوثيقة وكل من المراحلين (أ) و(ب).

2-

ممثل برسم تخطيطي إجمالي سيرورة الظاهرة المدرستة بالوثيقة.

**الإجابة الممدوذة**

**1- البيانات**


- 1- نهاية المورنة، 2- ARN، 3- بداية المورنة، 4- ريبوزوم، 5- ARNm، 6- متعدد بيتيد.

عنوان مناسب للظاهرة: آلية التعبير المورثي (تركيب البروتين).

المراحل (أ): الاستساخ.

المراحل (ب): الترجمة.

**2- رسم تخطيطي تفسيري لأآلية التعبير المورثي**



رسم تخطيطي يمثل مراحل تركيب البروتين


### السلسلة الفعلية

من الألف إلى

**البروتينات مواد حيوية هامة تقوم بأدوار أساسية متعددة في حياة الكائنات الحية ترتكب وفق آليات غير منتظمة.**

**الميلانين مادة صبغية تُفرز من قells خلايا تدعى الميلانينا تتكون في جلد الإنسان وتكتل بصفات الشعر وغيرها.**

**معرفة كيفية إنتاج ونقل الميلانين في الجلد تتفق الوثيقة الآتية:**



### الوثيقة

1- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 4، والمراحل أ، ب، ج.

2- خص في نص علمي العلاقة بين المورثة وظهور لون البشرة (السطح الظاهري).

### الإجابة المودجية

1- هيول، 2- ميتوكوندري، 3- شبكة هبولة داخلية محيبة، 4- حويصلة إفرازية (نقل الميلانين).

### السلسلة الفعلية

**الوحدة 01: تركيب البروتين**

1- الاستنساخ: في النواة يتم نسخ السلسلة الناسخة للمورثة المشرفه على بناء الإنزيم تيروزيناز بتدخل الإنزيم ARN بوليمراز، ينفع عنه ARNm دوتاباع محمد من التكليوبينيات (رسالة وراثية).

2- الترجمة: ينتقل الـ ARNm إلى الميول يتم ترجمته بالآلة الترجمة في مستوى الشبكة المحيولة الداخلية بواسطة البريوزومات إلى بروتين ممثل في الإنزيم تيروزيناز ومحدد بنوع وعدد وترتيب معين من الأحماض الأمينية.

في الميول يعمل الإنزيم تيروزيناز على تحويل البريوزومات إلى صبغة الميلانين التي تنتقل إلى الخلايا الكراتينية فتكتلون ما ينفع عنه ظهور لون بشرة الجلد (السطح الظاهري).

التعير المورثي ظاهرة تتكامل فيها الآيتين هنا الاستنساخ والترجمة ينفع عنها بناء بروتين نوعي مصدر السطح الظاهري للفرد.

### نماذج عن التمارين الثاني


#### تمرين 01

تأثير عملية تركيب البروتين بعوامل كثيرة منها ما ي العمل على إيقاف تركيبه، وفي هذا الإطار يسعى الباحثون إلى استغلال المواد المبيطة لتركيب البروتين في علاج الأورام السرطانية، ومن هذه المواد مادة الريسين المستخرجة من بنور نبات الحرقع، لمعرفة آلية تأثير مادة الريسين ثقىج عليك الدراسة التالية:

#### الجزء الأول


تمثيل الوثيقة (01) نتائج مخبرية لتأثير مادة الريسين حيث:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (01) تكاثر الخلايا السرطانية في وجود و في غياب مادة الريسين.
- يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج متابعة نسبة إدمام النايميدين واللوسين المشعدين لعينات من الخلايا السرطانية تم حضنها في تركيز متزايدة من مادة الريسين.



ترجم المعلومة الوراثية المحمولة على الـ ADN إلى بروتين بظاهرة التعير المورثي مصدر السطح الظاهري للفرد. وتفق الآيتين متتاليتين هنا الاستنساخ والترجمة تدخل فيما عناصر حوية. فما هي العلاقة بين آلية بناء البروتين وظهور السطح الظاهري (لون بشرة الجلد)؟

٧- لإظهار قيمة سعر سهم اربعين لتفريح عليك الوثيقة (٠٣) التالية:



اعط حلًا للمشكلة المقروحة انطلاقاً من استغلالك لمعطيات الوثيقة (03).

الإجابة النموذجية

الجزء الأول

- الشكل (أ): يمثل تكاثر الخلايا السرطانية في وجود وفي غياب مادة الريسين حيث نلاحظ:  
 في غياب الريسين: تقسم الخلايا السرطانية عدة انقسامات وتكاثر بشكل كبير.  
 بـ وجود الريسين: تكاثر الخلية السرطانية بشكراً قليلاً.

ستنتج أن المسمى تشطّه تكاثر الخلايا.

الشكل (ب) يمثل تغير النسبة المئوية لادماج العناصر المشعة (تايكيديز، وبلسم) بدلاً من ذكرها بمحض ذكرها.

غاب الرسمين (تركيز 0) يكون إدماج التأييدين واللوسيين طبيعيًا (100%)، وكلما زاد تركيز الرسمين

ستنتج أن مادة الريسين تُبْطِّل تركيب البروتين (دمج اللوسمين) وكذلك تضاعف الـ ADN (دمج التايميدين) وبالتالي تُبْطِّل تكاثر الخلايا السرطانية وتُصنِّعها للبروتين.

جزء الثاني

- تحلیل

- الشكل (أ): يمثل تغير إدماج اليوريدين المشع بدلاًلة تركيز الريسين حيث نلاحظ:

وتحتاج اليوريدين (أوكسالات الكالسيوم) تدخل في تركيب الـ ARN يتم بشكل طبيعي (100%) رغم زيادة تركيز


يُستنتج أن مادة الريسين لا تؤثر على عملية الاستنساخ.

لورم العطية والحياة من

**السلطة القضائية**  
- حل الوثيقة (٥١) مبرزاً العلاقة بين نكارة الخلايا السرطانية  
الموضحة في الشكل (ب).

الموضحة في المقدمة  
الجزء الثاني  
1- تحديد آلية تأثير مادة الرين على تركيب البروتينات من إدماج البروتينات  
- الشكل (أ) من الوثيقة (02) يمثل صالح متلاعنة نسبة إدماج  
تم حضنها في وجود تركيز متزايدة من مادة الرين.  
- الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل تطور إدماج الحمض الأميني فيتبل الرين  
ARNm أضيف له الحمض الأميني فتبل الرين

- الشكل (ب) من نفس الـ ARNm حيث:  
 الوسط الأول: يحتوي على مستخلص خلوي حال من الـ ARNm أضيف له المضامين فيتيل الـ alanine.  
 المشع ومتعدد البوريدين:  
 الوسط الثاني: يحتوي على مستخلص خلوي حال من الـ ARNm ومتعدد البوريدين و 0.5 ميكروغرام من الـ ribonuclease.  
 المشع ومتعدد البوريدين على حامل الشفرة ARNm تغير المضامين فيتيل الـ alanine.



كلون (١) و(ب) ميرزا المشكلاة حول تأثير المادة الرئيسين على تركيب اليروتين.

25

3

لوضع مصادر الإصابة بهذا المرض نقدم الوثيقة (02)، حيث تتمثل في تكثيف الإنزيم غلووكيناز عند شخص مصاب بداء السكري من النوع 2 من الحال المسجلة في الشكل (ب) مبينا سبب الارتفاع المستمر للتحلول عند الشخص المصابة.

لسلسلة من تركيب البرجم ميلتون بيمار عند شخص سليم وأخر مصاب بهذه الـ **السكر** من النقطة 2

أرقام التلائمات (السلسلة المستنسخة)	
277	عند الشخص السليم
278	عند الشخص المصاب
279	عند الشخص المصاب
280	عند الشخص السليم
281	عند الشخص السليم
282	عند الشخص السليم
.....CAC CTG CTC TCG AGA CGT ..	
.....CAC CTG ATC TCG AGA CGT ..	
التجاه القراءة	
→	
	الوثيقة (02)

٢- بين سبب الإصابة بداء السكري من النمط ٢

الإجابة التمودجية

الجزء الأول

٢٦٣

الشكل (ب) منحنيين بيانيين لنشاط الإنزيم غلووكيناز في الكبد بدلالة تركيز الغلوكوز في الدم عند من الشخص السليم والشخص المصاب حيث:  
الشخص السليم: نلاحظ تزايداً تدريجياً لنشاط الإنزيم حتى يبلغ قيمة أقصى تقدر بـ 80% عند الغلوكوز في الدم يقدر بـ 25 ميلي مول / ل.

يُتَّسِّعُ أنَّ انعدام نشاط الإنزيم غلوكونيكاز الكبدِي أدى إلى تراكم الغلوكوز في الدم مسبباً الارتفاع تدريجياً للتحلول.

جزء الثاني

تہذیب

متاليّة الأحماض الأمينيّة

GUG GAC GAG AGC UCU GCA  
Val - Asp - Glu - Ser - Ser - Ala

:ARNm

ARNM

37

36

**السلسلة الفرعية**  
**- الشكل (ب):** ممثل تغطية ادميّة الفئران الانثويّة والذكريّة

٤- في غياب الريسيجين: يتزايد إدماج الفينيل الالين المشع بدلالة الزمن بمقدار وحدة اعتبارية بعد نصف ساعة، وهذا دليل على حدوث عملية الترجمة بشكل طبيعي وإدماج الالين.

**في وجود الرئيس:** إدماج اللوسين المشع ضئيل جداً يكاد ينعدم، دليل على عدم حدوث عملية الترجمة.  
تستنتج أن مادة الرئيس توقف عملية الترجمة.

## ٢- القتاع حـاـلـ المـشـكـلةـ


**٤- اقتراح حل للمشكلة:**  
 تمثل الوثيقة (03) رحماً تعطينا بوضوح عملية الترجمة في وجود وفي غياب مادة الريسين حيث:  
 في غياب الريسين يقوم الريبيوزوم بترجمة ال ARNm إلى متعدد ببتيد بشكل طبيعي. بينما في وجود مادة الريسين التي ترتبط بتحت الوحدة الكبرى للريبيوزوم على مستوى ال ARN<sub>i</sub>285 فيصبح الريبيوزوم غير وظيفي ولا يقوم بقراءة ال ARNm.

إذن، الرئيسين توقف عملية الترجمة بالارتباط بالريزوروم وتشييط عمله.

التمرين 02

**بعض المعايير 02**  
يُصَبِّبُ ذَلِكَ السُّكْرِيَّ مِنِ النَّمْطِ ٢ (Mody-2) بعْضَ الْأَشْخَاصَ قَبْلَ بَلوْغِهِ سِنِ العَشَرَيْنَ، حِيثُ يَعْلَمُ  
الْأَنْدَادُ بِهِ وَالْأَخْيَارُ بِهِ، فَالْجَوْكِيزْ فِي الدُّنْدُلِ لِإِثْبَاتِ مُصَبِّرِ هَذَا الْمَرْضِ تَفَرَّجُ الْمُعْطَياتِ التَّالِيَّةِ.

**الجزء الأول**  
يغزو الغلوكوز في الكبد على شكل غликوجين بتدخل عدة إنزيمات من بينها الغلوكونيكيناز الذي يعمل





## الوحدة 04: تركيب البروتين

### الإجابة المودجة

#### الجزء الأول

الخلل: مستقبل الأنترولوكين للمقاويبات **T** غير عادي بدون السلسلة الببتيدية 1 عند الطفل المريض.

#### الجزء الثاني

تحديد الـ **ARNm** والسلسلة الببتيدية في الحالتين

**CCC CGA AUU**

**Pro – Arg – Ile**

سلسلة الببتيدية:

الطفل المصايب:

**CCC UGA AUU**

**Pro**

سلسلة الببتيدية:

**ARNm**

التبين:

حدوث طفرة على مستوى **ADN**: استبدال **G** بـ **A** على مستوى النكليوتيد 865 في السلسلة المستنسخة (قبول استبدال **T** على مستوى النكليوتيد 865 في السلسلة غير المستنسخة). ظهور رامزة توقف (**Stop**) على مستوى الـ **ARNm** أدى إلى تركيب سلسلة ببتيدية قصيرة فتح عنه تركيب مستقبل غير وظيفي (لا يستقبل الـ **Ile**) وبالتالي الإصابة بالمرض.


## الوحدة 05

تعد الطفرات من أسباب السرطان عند الإنسان، ويقدر الباحثون أن حوالي 5% إلى 10% من حالات انطلاقاً من الوثيقة (01)، استخرج الخلل الملحوظ على مستوى مقاويبات الطفل المصايب بمرض القصر السرطان ذات أصل وراثي، لإبراز الأصل الوراثي لبعض حالات سرطان الثدي عند النساء فتح العيوب المذكورة.

### السلسلة الفضفاضة

#### بعض التغيرات في التعبير عن البروتين

يعتبر مرض القصور المناعي من الأمراض الوراثية الخطيرة التي تصيب بعض المواليد، الذين يصبحون عرض لأمراض انتهازية متعددة (نعقانات تفسخية، تعفنات هضمية...). لحماية الأطفال المصايبين يتم دخيم في قاعات معقمة في انتظار العلاج. لفهم سبب ظهور المرض عند المواليد فتح دراسة العيوب الآتية:





### الوثيقة (01)


#### الجزء الثاني

يمثل شكلان الوثيقة (02) متالية النكليوتيدات لجزء من المورثة المسؤولة عن تركيب السلسلة الببتيدية 1 عند كل من الطفل السليم (الشكل a) والطفل المصايب (الشكل b).

انطلاقاً من استغلال الوثيقتين (01) و(02) وباستعمال جدول الشفرة الوراثية، بين سبب الإصابة بمرض القصور المناعي عند بعض المواليد، علماً أن السلسلة الببتيدية 1 المركبة عند الطفل المصايب لا تثبتت على غشاء المقاويبات 1




قارن نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء ميرزاً علاقة المورثة **BRCA1** بهذا المرض.



### السلسلة المضادة

**الجزء الثاني**  
تحكم المورثة **BRCA1** في تركيب بروتين "BRCA1" الذي يتدخل في تفسير الكيفيةإصابة النساء بسرطان الثدي نتيجة تعرضهن للأشعة فوق البنفسجية والأشعة X.



### كـ التصرين 06

تم عملية تركيب البروتين على مستوى المبولي بتدخل عضيات وجزيئات مختلفة ووفق آليات خلوية دقيقة حيث أي خلل على المستوى الجزيئي يعرقل هذه العملية. الأمر الذي مكنا من الاستفادة منه في المجال الطبي خصوصاً مع البكتيريا للمرضية وعلاج الإصابة بها.

معرفة مدى تأثير بعض المضادات الحيوية وطريقة تأثيرها تفتح الدراسة التالية:

### الجزء الأول

وضعت مزرعتين من البكتيريا من نوع المكورات المعاوية في وسطي زرع بمحابان على نفس المكورات طيلة مدة التجربة حيث يضاف إلى المزرعة الثانية مادة الماكروليد (**macrolide**), جزيئات لها خصائص المضادات الحيوية.

### الإجابة المموجة

### الجزء الأول

### المقارنة

نماذج (01) منحتي بيان يعبر عن تغيرات نسبة المصابات بسرطان الثدي من النساء الحاملات للأليل عادي والحملات للأليل طافر بدلالة العمر حيث نجد ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الثدي، النقدم في النسخ عند النساء الحاملات للأليل طافر للمورثة **BRCA1** مقارنة مع النساء الحاملات للأليل العادي.

ومنه نستنتج أن حدوث الطفرة في المورثة **BRCA1** يرفع من احتمال الإصابة بسرطان الثدي عند النساء.


### الجزء الثاني

### 1- التفسير

تؤدي الطفرة على مستوى المورثة **BRCA1** إلى عدم إصلاح الانكسار اللولبي لـ **ADN** مما يتربّع عنه ذلك العشوائي للخلايا الثديية ويرفع من نسبة الإصابة بسرطان الثدي عند النساء.

2- تبيين الأصل الوراثي لسرطان الثدي عند النساء

استخراج **ARNm** ومتالية الأحماض الأمينية للمورثة **BRCA1**:



الوحدة 01: تركيب البروتين

الإجابة المنشودة

الجزء الأول

تحليل

الوثيقة (02)

نتائج فحص تطور عدد البكتيريا في المزرعة (01)

المزرعة 1: في غياب مادة الماكروليد يتزايد عدد البكتيريا باستمرار.

المزرعة 2: في وجود مادة الماكروليد نلاحظ تزايداً متقطعاً متزامناً وسريعاً في عدد البكتيريا. تستنتج أن مادة الماكروليد تبيّن تكاثر البكتيريا.

تقديم فرضيتين

الفرضية 1: تعمل الماكروليد على منع البكتيريا من تركيب البروتينات الحيوية والضرورية لنموها وتکاثرها.

الفرضية 2: تعمل الماكروليد على تخريب البروتينات البكتيرية الحيوية والضرورية لنموها وتکاثرها.

الجزء الثاني

الاستدلال العلمي

من خلال الشكل (أ) من الوثيقة (02) نلاحظ أن نشاط الإنزيم ARN بوليموراز لا يتأثر بزيادة تركيز الماكروليد، وهذا يدل على أن الماكروليد لا يؤثر على عملية الاستنساخ.

من خلال الشكل (ب) من الوثيقة (02) نلاحظ:

- تثبت مادة الماكروليد على مستوى تحت الوحدة الكبرى للريبوسومات البكتيرية بين المواقع A و P.

- تمنع مادة الماكروليد انتقال الإنزيم ARN<sup>+</sup> الحامل للحمض الأميني الثاني من الموقع A إلى الموقع P.

- تمنع مادة الماكروليد تشكيل الرابطة البي碍ية بين الحمضين الأمينيين الأول والثاني.

- تمنع مادة الماكروليد تحريك الريبوسوم على طول سلسلة الرنا ARNm.


ونعلم أن:

- البروتينات تلعب أدواراً هامة وحيوية في الخلية.


- تكاثر ونمو الخلايا البكتيرية يحتاج إلى تركيب بروتينات وظيفية.

- تركيب البروتينات يتطلب توفر شروط وعناصر وعضيات سليمة.

وبالتالي مادة الماكروليد تعمل على توقیف عملية تركيب البروتين من خلال عرقلة عملية الترجمة مما يؤدي إلى موت البكتيريا وعدم تکاثرها.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (02)

- بين باستدلال علمي طريقة عمل للمضاد الحيوي الماكروليد مثبتاً صحة إحدى الفرضيات.



السلسلة الفنية  
نماذج من التمارين الثالث

بر العرين 01

تهدف المضادات الحيوية عملية تركيب البروتين عند البكتيريا لوقف نشاطها وفتح تكاثرها  
لتحل محل كاتب للقضاء على البكتيريا الفارة. تحديد مستويات تأثير هذه الأدوية تفتح الدراسة  
الجزء الأول  
لوضع كمية ابتدائية من بكتيريا (س) في أوسط تركيب البروتين بدلاً من الزمن. نتائج القياس ملخص  
لتحصص صن شروط ثم مناسبة ثم نفس نسبة تركيب البروتين بدلاً من الزمن. نتائج القياس ملخص  
الشكل (أ) من الوثيقة (أ)، أما الشكل (ب) فيمثل رسمًا تخطيطيًا بين عملية تركيب البروتين.

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفنية



1- حلل النتائج الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (أ).

2- اقترح باستغلال معطيات الشكل (ب) من الوثيقة (أ) ثلاث فرضيات تحدّد من خلالها مستوى تأثير المضاد الحيوي (Rifamycine) على تركيب البروتين.

الجزء الثاني

بالتحصص جدول الشكل (أ) من الوثيقة (2) شروط ونتائج تجربة ثلاثة أوساط مختلفة، أما الشكل (ب)  
فيمثل نتائج قياس السرعة الابتدائية لنشاط الإنزيم ARN بوليميراز بدلاً من تركيز الوسط من المضاد الحيوي  
(Rifamycine) في شروط تجريبية ملائمة.

الجهة الثالث

- باستغلال معطيات الوثيقة (02) بين صحة إحدى الفرضيات المقترنة سابقاً محدداً بدقة تأثير المضاد

الحيوي (Rifamycine).

**السلسلة الفرضية**

<p>الوحدة 01: تركيب البروتين</p> <p><b>الجزء الثالث</b></p> <p><b>خلاصة</b></p> <p>تؤثر المضادات الحية على عملية تركيب البروتين من خلال توقيفها لأحد مراحلها الضرورية حيث يمكنها أن توقف:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- عملية الاستنساخ بثبيط الإنزيم ARN بوليميراز مثل الريقاميسين.</li> <li>- عملية تشيشط الأحماض الأمينية بثبيطها لعمل الإنزيم أمينو أسييل ARN استيتاز.</li> <li>- عملية الترجمة بثبيط عمل الريبوزوم أو إنزيمات تشكيل الروابط الببتيدية بيتديل ترونسفيراز.</li> </ul> <p><b>كم التغيرين 02</b></p> <p>تركب الخلية بروتيناتها انطلاقاً من 20 نوعاً من الأحماض الأمينية حسب معلومة وراثية يحملها الـ ARNm وهو متعدد نكليوتيدي يدخل في تركيبة 4 أنواع من القواعد الأزوتية. فكيف توافق 4 أنواع من القواعد الأزوتية 20 حضاً أمينياً؟</p> <p><b>الجزء الأول</b></p> <p>لتحديد هذا التوافق اقترحنا الفرضية التالية:</p> <p>«إن أي حمض أميني ينحدر في السلسلة الببتيدية بـ n نكليوتيدة من الـ ARNm حيث n عدد طبيعي.</p> <p>1-أ- حدد أصغر قيمة n تسمح بتعيين مختلف الأحماض الأمينية في الببتيد المركب من طرف الخلية. بتر إجابتك.</p> <p>ب- أعد صياغة الفرضية على ضوء ذلك.</p> <p>2- للتحقق من صحة هذه الفرضية استعمل كل من Crick و Brenner في سنة 1961 بكثيريا مصادبة بفيروس معالج بعامل مسبي للطفرات ثُمّ ثبّط تغييراً في عدد نكليوتيدات ADN فيروسي، نتائج الدراسة مماثلة في جدول الوثيقة (1).</p>	<p><b>الإجابة المودعة</b></p> <p><b>الجزء الأول</b></p> <p>1- التحليل</p> <p>فشل التجارب تغمرات نسبة تركيب البروتين (%) بدلاً عنه (0%). حيث:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- المضاد الحيوي Rifamycine (Rifamycin) حيث تتساوى عكضاً مع تركيز المضاد الحيوي بحيث لا يلاحظ أن نسبة تركيب البروتين تتساوى عكضاً مع تركيز المضاد الحيوي حيث تصل (200%).</li> <li>- في التركيز (1μg/ml) تزيد بشكل سريع ومنذذهب حتى تصل (200%).</li> <li>- في التركيز (2μg/ml): تزيد بطيئاً.</li> <li>- في التركيز (4μg/ml): تتساوى تدريجياً لفترة ثم تبت.</li> <li>- في التركيز (8μg/ml): تتساوى بشكل سريع ثم ينكمش حتى تنعدم.</li> <li>- في التركيز (Rifamycin): يبطّع عملية تركيب البروتين.</li> </ul> <p>تستنتج أن المضاد الحيوي Rifamycin يثبّط عملية تركيب البروتين.</p> <p><b>2- اقتراح هYPOTHESES</b></p> <p>الفرضية 1: المضاد الحيوي يثبّط الإنزيم ARN بوليميراز.</p> <p>الفرضية 2: المضاد الحيوي يثبّط إنزيمات التشيشط.</p> <p>الفرضية 3: المضاد الحيوي يثبّط الريبوزوم.</p> <p><b>الجزء الثاني</b></p> <p>1- إثبات صحة إحدى الفرضيات السابقة</p> <p>يمثل الجدول شروط ونتائج تجربة ثلاثة أوساط مختلفة حيث:</p> <p>الوسط (1)، تجربة شاهدة، في وجود كل العناصر الضرورية لعملية الاستنساخ والترجمة شدة الإشعاع للأحماض الأمينية المدمجة كبيرة، دليل على حدوث عملية تركيب البروتين. بينما في الوسط (2) في وجود نفس عناصر الوسط (1) مضاد المضاد الحيوي Rifamycin، شدة الإشعاع في الأحماض الأمينية المدمجة قليلاً جداً، دليل على عدم حدوث عملية تركيب البروتين.</p> <p>من مقارنة نتائج التجربة 2 بنتائج التجربة 1 بين أن المضاد الحيوي يؤثر على العناصر المتدخلة في عمليات تركيب البروتين.</p> <p>أما في الوسط (3) ففي وجود الـ ARNm والعناصر الضرورية للترجمة مضاد إليها المضاد الحيوي ARNm Rifamycin، شدة الإشعاع في الأحماض الأمينية المدمجة كبيرة ومماثلة للوسط (1)، دليل على حدوث عملية تركيب البروتين.</p> <p>من مقارنة نتائج التجربة 3 بنتائج التجربة 2 بين أن المضاد الحيوي يؤثر على عناصر الاستنساخ فقط تستنتج أن المضاد الحيوي Rifamycin يثبّط عملية الاستنساخ.</p> <p>وهذا ما يصادق على صحة الفرضية الأولى التي تنص على أن «المضاد الحيوي يثبّط الإنزيم ARN بوليميراز» أثبتت باستدلال منطقي صحة الفرضية المقترنة باستغلال النتائج التجريبية السابقة.</p> <p>ويتبعد صحة الفرضيتين الثانية والثالثة.</p>
--	---

السلسلة الفرعية

الجزء الثاني  
في نفس السنة 1961 أتى كل من *Matthaei*, *Niremberg*, *ARNm*, وأصحابه على مستخلص بكتيري يدعى *ARNm*، أضافوا للمستخلص خليطاً

جميع العناصر الضرورية لتركيب البروتين وحال من *ADN* ومن *ARNm*

مختلف أنواع الأحماض الأمينية، *ARNm* مصنوعاً من تابع نوع واحد من الـ *ARNm* مصنوعاً من 3 رامزات أو 4 رامزات أو 4 رامزات

بالنهاية مع ذلك استعمل الباحث *Khorana Har Gobin*، والتي مكنت لاحقاً من حل الشفرة الوراثية.

أكبر من نوع من الـ *ARNm*.

مثل الوثيقة (02): نتائج التجارب المتجربة، والتي مكنت لاحقاً من حل الشفرة الوراثية.

الإجابة المودجة

الجزء الأول

1-1- قيمة ٤

أصغر قيمة ١١ تسمح بتعريف مختلف الأحماض الأمينية في الببتيد هي: ٣.  
العتبر: بوضع ١١ - ٣ يكون عدد البلاطيات المتحصل عليها ٦٤ (٣٤) وهذا العدد يعطى ٢٠ حمض

أمينياً مشكلة لمتعددات الببتيد مع وجود مرادفات.

ب- صياغة الفرضية

كل ثلاثة من الـ *ARNm* المتتالية (القواعد) تغير عن حمض أميني واحد.

2- الاستدلال المنطقي

مثل الوثيقة (١) نتائج دراسة أجريت على بكتيريا مصابة بفيروس معالج بعامل مسيبة للطفارات حيث

- في حالة عدم تغيير عدد الـ *ARNm* تتبع متالية أحماض أمينية مماثلة للبروتين الفيروسي الطبيعي.  
- عند إضافة أو حذف نوكليوتيد أو نوكليوتيدتين، يتغير عدد مختلف من الأحماض الأمينية في البروتين

الفيروسي الطافر مقارنة بالطبيعي. وهذا يدل على أن نوكليوتيد واحدة أو تابع نوكليوتيدتين لا يغير عن

أي حمض أميني.

- عند إضافة ثلاثة نوكليوتيدات يتبع بروتين فيروسي يزيد عن البروتين الطبيعي بحمض أميني واحد،  
و عند حذف ثلاثة نوكليوتيدات يتبع بروتين ينقص عن البروتين الطبيعي بحمض أميني واحد. وهذا يدل  
على أن كل ثلاثة من الـ *ARNm* تغير (تشفر) عن حمض أميني واحد.  
إذن، الفرضية "كل ثلاثة من الـ *ARNm* (القواعد) تغير عن حمض أميني واحد" صحيحة.

الجزء الثاني

1- أ- تبيين العلاقة من الوثيقة (02)

من تجربة *Matthaei* و *Niremberg* نلاحظ:

- عند استعمال متعدد U، يتغير متعدد بيتيد مكون من *Phé* فقط.

- توقع عدد أنواع الأحماض الأمينية التي يمكن الكشف عن رامزاتها وفقاً لشروط تجربة *Niremberg* - عند استعمال متعدد A، يتغير متعدد بيتيد مكون من *Lys* فقط.

- عند استعمال متعدد C، يتغير متعدد بيتيد مكون من *Pro* فقط.

إذن تابع نوع الـ *ARNm* يشفّر لنوع الأحماض الأمينية في البروتين.

ب- تعريف الرامزات

تحكم مجموع الرامزات الممكنة من الـ *ARNm* في استعمال الأحماض الأمينية المعروفة والمستعملة في تركيز *Phe*.

- تابع 3 قواعد من U (رامزة UUU) يشفّر للفنيل الألين (*Phe*).  
- تابع 3 قواعد من A (AAA) يشفّر لليسين (*Lys*).  
- تابع 3 قواعد من C (CCC) يشفّر للبرولين (*Pro*).  
- توقع عدد أنواع الأحماض الأمينية

تسمح تجربة *Niremberg* و *Matthaei* بالكشف عن الشفرة الوراثية باستعمال أربعة (٤) أحماض أمينية فقط.

1- من تجربة *Matthaei* و *Niremberg* :  
أ- بين العلاقة بين الـ *ARNm* والأحماض الأمينية في البروتين.

ب- بين الرامزات التي تحدد الأحماض الأمينية في التجربة.

2- توقع عدد أنواع الأحماض الأمينية التي يمكن الكشف عن رامزاتها وفقاً لشروط تجربة *Niremberg* - عند استعمال متعدد A، يتغير متعدد بيتيد مكون من *Lys* فقط.

.  
3- فسر نتائج تجربة *Khorana Har Gobin* .

الجزء الثالث

باستغلال المعلومات التي توصلت إليها في الجزء الأول والجزء الثاني وجدول الشفرة الوراثية، وضع كد - تابع 3 قواعد من U (رامزة UUU) يشفّر للفنيل الألين (*Phe*).  
- تابع 3 قواعد من A (AAA) يشفّر لليسين (*Lys*).  
- تابع 3 قواعد من C (CCC) يشفّر للبرولين (*Pro*).  
- تابع 3 قواعد من G (GGG) يشفّر لـ *Glycine* (*Gly*).

2- توقع عدد أنواع الأحماض الأمينية

تحكم مجموع الرامزات الممكنة من الـ *ARNm* في استعمال الأحماض الأمينية المعروفة والمستعملة في تركيز *Phe*.

- تابع 3 قواعد من U (RAM) يشفّر لـ *Alanine* (*Ala*).  
- تابع 3 قواعد من C (CCG) يشفّر لـ *Cysteine* (*Cys*).  
- تابع 3 قواعد من G (GGG) يشفّر لـ *Glycine* (*Gly*).  
- تابع 3 قواعد من A (AAA) يشفّر لـ *Lysine* (*Lys*).  
- تابع 3 قواعد من P (PPP) يشفّر لـ *Proline* (*Pro*).  
- تابع 3 قواعد من S (SSS) يشفّر لـ *Serine* (*Ser*).  
- تابع 3 قواعد من T (TTT) يشفّر لـ *Threonine* (*Thr*).  
- تابع 3 قواعد من V (VVV) يشفّر لـ *Vegetable* (*Vegetable*).  
- تابع 3 قواعد من Y (YTY) يشفّر لـ *Yeast* (*Yeast*).  
- تابع 3 قواعد من F (FFF) يشفّر لـ *Fruit* (*Fruit*).  
- تابع 3 قواعد من I (III) يشفّر لـ *Insect* (*Insect*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Hair* (*Hair*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Human* (*Human*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Human* (*Human*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Human* (*Human*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Human* (*Human*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Human* (*Human*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Human* (*Human*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Human* (*Human*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Human* (*Human*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Human* (*Human*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Human* (*Human*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Human* (*Human*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Human* (*Human*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*DNA*).  
- تابع 3 قواعد من R (RRR) يشفّر لـ *RNA* (*RNA*).  
- تابع 3 قواعد من H (HHH) يشفّر لـ *Human* (*Human*).  
- تابع 3 قواعد من K (KKK) يشفّر لـ *Kernel* (*Kernel*).  
- تابع 3 قواعد من Q (QQQ) يشفّر لـ *Quail* (*Quail*).  
- تابع 3 قواعد من N (NNN) يشفّر لـ *Neuroleptic* (*Neuroleptic*).  
- تابع 3 قواعد من W (WWW) يشفّر لـ *Wool* (*Wool*).  
- تابع 3 قواعد من M (MMM) يشفّر لـ *Milk* (*Milk*).  
- تابع 3 قواعد من D (DDD) يشفّر لـ *DNA* (*D*

## السلسلة الفرعية

### وحدة 02: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين


تبين أن عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية يحدد بنية البروتين ووظيفته: تحليل الجسور الكبريتية التي تنشأ بين الأحماض الأمينية من نوع (γ) تحت تأثير المركب  $\beta$  مركبتوإيثانول فقد البروتين ببنائه الطبيعية ووظيفته، هذا يدل على أنه لو تغير الحمض الأميني (γ) بمحض أمني آخر لن تتشكل جسور ثنائية الكبريت وبفقد البروتين ببنائه وظيفته.

تشكل الجسور ثنائية الكبريت في غير مواقعها الطبيعية تحت تأثير البيريا التي تعيق الانطواء الطبيعي أدى إلى فقدان البروتين ببنائه الطبيعية ووظيفته، هذا يدل على أنه لو تغير موضع الحمض الأميني (γ) في السلسلة البريدية فسيتغير موضع الجسور ثنائية الكبريت وبفقد البروتين ببنائه الطبيعية وظيفته.

وهذا يؤكد أن نوع وترتيب وكذلك عدد الأحماض الأمينية المشكّلة للبروتين يحدد ببنائه الفراغية وبالتالي وظيفته.


## نلاصة

ترك البروتين من عدد ونوع وترتيب محدد وراثياً من الأحماض الأمينية، ينشأ بينها روابط كيميائية في واسع دقة في السلسلة البريدية على مستوى الوظائف الكيميائية المختلفة للجذور الجاما هيدروجينية، شاردية، تجاذب الجنور الكارهة للماء وجسور ثنائية الكبريت) فيكتسب البروتين بنية راغبة ثابتة ومستقرة تسمح له بالقيام بوظيفة معينة في الخلية.



ribonuclease محرر وطرد  
تحليل الجسور ثنائية الكبريت وتغريب الريبيونوكلياز

بعد فصل هذين المركبين عن الإنزيم يستعد الإنزيم لتنشيطه الطبيعي تدريجياً، ويعل ذلك يتشكل ثانية الكبريت مرة أخرى.



إعادة تشكيل الجسور ثنائية الكبريت والحصول على إنزيم طبيعي


بعد تغريب البروتين لكن في وجود مركب البيريا لوحظ أن الإنزيم لا يستعيد نشاطه الطبيعي رغم وجود الجسور ثنائية الكبريت، وقد تم تفسير ذلك بأن وجود مركب البيريا يعيق الانطواء الطبيعي للإنزيم مما يؤدي إلى تكون جسور ثنائية الكبريت في مواقع تختلف عن المواقع الأصلية لها، أي أن الإنزيم لا يكون إلا إذا ارتبطت مجموعات (SH) السيسين بطريقة محددة ومعلومة لإنتاج شكل بنائي محدد.

## كلمة فريق عكاشه

عندما كنا صغاراً أحبينا المطر فكان نذهب تحته ونسنتمنه  
وعندما كبرنا أحبينا العلم فجعانا بنعلنا لأجله. وعفينا العزم على تسخير أنفسنا له.

نحن في البداية فقط، صديق لسنا كباراً ولكن سنكبر معاً...  
سنحاول... نحاول... ونحاول تقديم المساعدة دوماً

نحن في انتظار المنفوفين منكم... تواصلو معنا على صفحته الفيس بووك  
**مكتبة عكاشه Okacha Bookstore**



ريبيونوكلياز محرر  
بطريقة غير طبيعية

إعادة تشكيل الجسور ثنائية الكبريت في غير مواقعها وتشكل إنزيم غير طبيعي

عند إزالة البيريا ينطوي الإنزيم طبيعياً لإعطاء الشكل البنائي الطبيعي ويستعيد وظيفته.

### السلسلة الفعلية Khorana 3- تفسير تتابع تجربة

في حالة حصوله على بيتين مكونة من تتابع غوري من الأحماض الأمينية:

- السيرين (Ser) يحدد بتتابع (UUC) واللوسين بتتابع (CUU).

- البروتين يحدد بتتابع (ACA) والبيستدين بتتابع (CAC). يفسر إنتاج ثالثيات وثلاثيات يشهد عند استعمال 4 رامزات من 3 أنواع من القواعد بوجود رامزات UAA، UGA، UAG، STOP. وتشمل في الرامزات التالية UAA، UGA، UAG، STOP.

يقابلها أي حمض أميني وهي رامزات التوقف.

الآن يقابلها أي حمض أميني وهي رامزات التوقف.

توضيح تتابع الرامزات في تحديد أنواع الأحماض الأمينية:

- يتراكب الـ ARNm من أربعة أنواع من النكليوتيدات تختلف نوع القاعدة الأزوتية U، A، C، G.

- يسمح وجود أربعة أنواع من القواعد في الـ ARNm بتكوين 64 رامزة.

- الرامزة هي تتابع 3 من القواعد وتشكل وحدة الشفرة الوراثية.

- تشفّر بعض الرامزات حمض أميني واحد مثل رامزة الانطلاق AUG التي تشفّر للحمض الأميني للمبروك.

- يشفّر بعض الأحماض الأمينية أكثر من رامزة، قد تشفّر له رامزتين مثل AAC و AAU للأسبارجين.

أو من 4 رامزات مثل UUU و UUC و UCC و UCA للألين Alanine. وقد تكون 6 رامزات مثل UUU و UUC و UAU و UAG و UGG و UGA لللوسين Leu.

- بعض الرامزات ليس لها معنى هي UAA و UAG و UGA و UGG و UUC.

### في التمرين 03

مرض الشيخوخة المبكرة عند الصغار ينادي إلى موت الأطفال في سن مبكرة، حيث معدل العمر المعمور فيه الطفل المصاب هو 12 عاماً، من بين أعراضه محدودية سرعة النمو، اضطرابات أقراص 2- اقترح فرضية تفسر من خلالها سبب مرض الشيخوخة المبكرة عند الصغار.

#### الآن يقابلها الإصابة بالسرطان. من أجل فهم سبب المرض والبحث عن علاج له.

يُبيّن الدراسات أن داء الشيخوخة المبكرة عند الصغار يرتبط بمورثة تسمى LMNA. توجد هذه المورثة في شكل أليلين: أليل LMNA<sup>+</sup> يتحكم في تركيب البروتين العادي، والأليل LMNA<sup>-</sup> يتحكم في تركيب البروتين غير العادي.


حد على مستوى النواة عدة أصناف من البروتينات اليفية تسمى لامين (Lamin) مسؤولة عن تقديم الوثيقة (02) جزءاً من السلسلة المستنسخة للأليل LMNA<sup>+</sup> عند طفل مصاب بداء الشيخوخة المبكرة.

الوثيقة (01) معطيات حول دور البروتين لامين في الحالة العادية وفي حالة الإصابة بهذا المرض

رقم الثلاثيات	الوثيقة (01)
169 ..... 170 .....	جزء الأليل LMNA <sup>+</sup> عند شخص سليم
..CAC - CGG - TTC - GAA - CTC - CGT - GAT - CCA ..	جزء الأليل LMNA <sup>-</sup> عند شخص مصاب

اتجاه القراءة →

الوثيقة (02)



الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

موقع بروتينات لامين A  
على الماء الماء

الوحدة 01: تركيب البروتين

السلسلة الفعلية

الماء الماء

بنية النواة

&lt;p

علوم الطبيعة والحياة من الأدلة

**السلة النضبة**

- استدل بمعطيات الوثيقة (02) ومكبات المعرفة لكي تتأكد من صحة الفرضية المقترنة سائغة الوحدة 01: تركيب البروتين
- في محاولة للبحث عن علاج هذا الداء، تم حديثاً إجراء دراسات على فئران تعاني من نفس المرض المظاهر الخارجي: انقسام خلوي عادي مع إصلاح وتجديد الأنسجة عند الشخص المريض لمظهر خارجي عادي، وانقسام خلوي غير عادي مع حدوث خلل في إصلاح وتجديد الأنسجة عند الشخص المريض (شحودة مبكرة). نستنتج أن كل تغير في البروتين لامين (A) ينبع عنه تغير في الصفة (الانقسامات الخلوية) أي هناك علاقة بين البروتين والصفة (النمط الظاهري).

#### 2- اقتراح فرضية

يعد سبب المرض إلى خلل وراثي، حيث حدثت طفرة في مورثة لامين (A) أدت إلى تغير في بنية البروتين لامين (A) وتتجزأ غير وظيفي.

#### الجزء الثاني

1- الاستدلال للتتأكد من صحة الفرضية متالية الـ ARNm والأحماض الأمينية

- عند الشخص العادي:

:ARNm

سلسلة أحماض أمينية:

- عبد الشخص المريض

:ARNm


سلسلة أحماض أمينية:

GUG GCC AAG CUU GAG GCA GCC CUA GGU

Val - Ala - Lys - Leu - Glu - Ala - Ala - Leu - Gly

GGG CCA AGC UUG AGG CAG CCC UAG GU

Gly - Pro - Ser - Leu - Arg - Gln - Pro



الوثيقة (03)

- بالاعتماد على معطيات الوثيقة (03) بين كيف يمكن حفظ الـ ARN مضاد المعنى من منع إنتاج الروتاج النوكليوتيديات، وتركيب ARNm غير مقارنة مع الـ ARNm العادي (مع ظهور رامزة بدون معنى)، ينبع عن ترجمة هذا الـ ARNm المغير سلسلة ببتيدية صغيرة وقصيرة (بروتين لامين (A) غير عادي بدون معنى). وهذا يؤكد صحة الفرضية المقترنة سابقاً: سبب المرض يعود إلى حدوث طفرة وراثية.

#### 2- التبيين

الـ ARN مضاد المعنى يرتبط بشكل منكامل مع جزيئة الـ ARNm الرامز للبروتين غير العادي يؤدي إلى كبح ترجمة الـ ARNm وبالتالي عدم تركيب البروتين غير العادي المسؤول عن المرض.

#### الجزء الثالث

#### اقتراح العلاج

- البروتين لامين (A): عند كلا الشخصين يرتبط بمجموعة فارنيزيل مما يساعد على الوصول إلى القلب إدخال قطع ADN مضاد المعنى لـ ARN الرامز في الخلايا المريضة والدماغ مع الذخيرة الوراثية للخلايا التوتوية. هنا البروتين عادي عند الشخص السليم وغير عادي عند الشخص المصاب. قوضى البروتين لامين (A) على الغشاء النووي: يكون منتظماً عند الشخص السليم حيث يتم تناول مجموعة فارنيزيل مما يسمح بدمج لامين (A) مع الصفيحة التوتوية. أما عند الشخص المريض فإنه يتواجد في الموضع غير منتظم حيث لا يمكن قطع مجموعة فارنيزيل عن البروتين لامين (A) مما يؤدي إلى تركها في الصفيحة التوتوية.

بنية التوازن: عادية عند الشخص السليم وتشوهات مرافقية عند الشخص المريض.

#### الإجابة النموذجية

#### الجزء الأول

#### 1- المقارنة

من معطيات الوثيقة (02) نلاحظ:

- البروتين لامين (A): عند كلا الشخصين يرتبط بمجموعة فارنيزيل مما يساعد على الوصول إلى القلب إدخال قطع ADN مضاد المعنى لـ ARN الرامز في الخلايا المريضة، فتحصل على خلايا معدلة وراثياً قادرة على إنتاج ARN مضاد المعنى بشكل مستمر. قوضى البروتين لامين (A) على الغشاء النووي: يكون منتظماً عند الشخص السليم حيث يتم تناول مجموعة فارنيزيل مما يسمح بدمج لامين (A) مع الصفيحة التوتوية. أما عند الشخص المريض فإنه يتواجد في الموضع غير منتظم حيث لا يمكن قطع مجموعة فارنيزيل عن البروتين لامين (A) مما يؤدي إلى تركها في الصفيحة التوتوية.

## الوحدة 02: العلاقة بين بروتينات وظيفة البروتين

### أ- جزء الدرس

السلسلة الم الغذية

الوحدة 02: العلاقة بين بروتينات وظيفة البروتين

#### ب- نقطه التعادل الكهربائي (pHi)

هي درجة pH الوسط التي تكون فيها الحمض الأميني متوازن كهربياً، أي عدد شحنة الموجة يساوي عدد شحنة السلسلة. يغير كل حمض أميني  $\text{pH}_i$  ذاته حسبه ويتغير عن الأحماض الأخرى.

الحمض الأميني مركب عصوي أزوبي (يحتوي على الأزوت N)، يتركب من كربون مركري (α-كربيون) وظيفة ثابتة (amine group) (amine group) وظيفة قاعدية (quaternary nitrogen) (NH<sub>3</sub><sup>+</sup>). وتشكل الجزيء الثابت، وكثيراً ما يكتسب صبغة الأرجواني، وشكله كثيف، يختلف عن الأحماض الأخرى.

- الأحماض الأمينية المحمصية تغير  $\text{pH}_i$  أقل بكثير من 7 (حمض الأسارين: 2,7، الغلوتاميك: 3,2).

- الأحماض الأمينية المفادة تغير  $\text{pH}_i$  أكثر من 7 (حمض الستريك: 7,6، أرجينين: 9,7، أرجين: 10,7).

#### 3- سلوك الأحماض الأمينية

عند وضع حمض أميني في وسط ذو pH معين فإنه قد يفقد أو يكتسب بروتوناً وتغير شحنته وتصبح موجة أو سالبة، وهذا ما يسمى سلوك الحمض الأميني في الوسط الذي يغير بدوره درجة pH.

لتتحديد سلوك الحمض الأميني تقوم بالمقارنة بين  $\text{pH}_i$  الحاسنة و  $\text{pH}$  الوسط ويتم ثلاث حالات:

-  $\text{pH} > \text{pH}_i$ : الوسط قاعدي بالنسبة للحمض الأميني، وبالتالي يكتسب سلوك الحمض (يفقد  $\text{H}^+$ ).

-  $\text{pH} < \text{pH}_i$ : الوسط حامض بالنسبة للحمض الأميني، وبالتالي يكتسب سلوك الماء (يكتسب  $\text{H}^+$ ).

-  $\text{pH} = \text{pH}_i$ : الوسط متوازن بالنسبة للحمض الأميني، وبالتالي يفقد و يكتسب بروتوناً في نفس الوقت.

نصف الأحماض الأمينية بالاعتماد على ما تحويه السلسلة الجاماية (المذر R) منمجموعات قاعدية، تكون شحنته معدومة.

حمض أميني حمضية يحتوي جذره على وظيفة حمضية، وهي حمض الغلوتاميك (Glu) وهو الأساينت (Asp).

حمض أميني قاعدية يحتوي جذره على وظيفة أمينة قاعدية وهي: لизين (Lys)، أرجينين (Arg) وHistidine (His).

أحماض أمينية معدومة جذرها لا يحتوي على وظيفة حمضية أو قاعدية، مثل خمسة عشر حمض أميني.

الثانية وهي أحماض أمينية البقائية، كحولية، كربيدية، عطرية وأميدية.

2- خواص الأحماض الأمينية

تعبر الأحماض الأمينية خاصتين هما الخاصية المقطورة (المقطبة)، ونقطة التعادل الكهربائية

أ- خاصية المقطورة (المقطبة)


كالأحماض الأمينية والبروتينات حسب نوع وقوة الشحنة الكهربائية في وسط ذو درجة pH معطومة على مفهومها: يسلك الحمض الأميني سلوك الحمض في الوسط القاعدي (يكتسب بروتونا  $\text{H}^+$ ) وبذلك سلوك

ذريحة pH معندة.

مصدرها: احتواء الحمض الأميني على الأقل على وظيفتين حمضية (COOH) وقواعدية (NH<sub>3</sub><sup>+</sup>).

وظائف ضعيفة يمكنها أن تفقد أو تكتسب بروتوناً على الترتيب.

وهي




## السلسلة النفعية


تجربة تظهر تغير سلوك الحمض الأميني حسب قيمة pH الوسط

الوحدة 02. العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين  
2-1. رابطة بيتيدية

رابطة تكافؤية قوية تتشكل من ارتباط مجموعة الكربوكسيل للحمض الأميني الأول بمجموعة الأمين للحمض الأميني الثاني وتحمير جزئه ما، صيغتها الكيميائية  $\text{CO-NH-}$ .



تم تكرار التجربة السابقة عند  $\text{pH} = 6$  ثم عند  $\text{pH} = 12$ ، النتائج موضحة في الوثيقة التالية:



الفرق بين متعدد البيتيد والبروتين: هو "الوظيفة"، فمتعدد البيتيد لا يزال في طور التشكيل، أو عبارة عن أحد السلاسل المركبة للبروتين. أما البروتين فهو يتميز ببنية فراغية وظيفية.

- بروتين: يعني كل ما هو بروتيني من أحاسيس أمينة وبيتايدات وبروتينات.

## 2-2. مستويات تعقيد البروتين

❖ تفسير نتائج المجرة الكهربائية للحمض الأميني  $\text{Ala}$   
- عند  $\text{pH} = 2$ : يهاجر الألانين نحو القطب السالب.

التفسير: في الوسط الحمضي (عالي  $\text{pH} < \text{pH}_i$ )، يكتسب الحمض الأميني بروتونا ( $\text{H}^+$ ) على مستوى الوظيفة الأمينية ( $\text{NH}_2$ ). فتصبح شحنته الكهربائية موجبة ( $\text{NH}_3^+$ ) ويهاجر نحو القطب السالب.

- عند  $\text{pH} = 6$ : لا يهاجر الألانين إلى أي قطب.  
التفسير: في الوسط المتعادل  $\text{pH} = \text{pH}_i$ ، تabil الوظيفتين الكربوكسيلية ( $\text{COO}^-$ ) والأمينية ( $\text{NH}_3^+$ )، فيكتسب الألانين شحنة إيجابية محدومة ولا يهاجر إلى أي من القطبين.

- عند  $\text{pH} = 12$ : يهاجر الألانين نحو القطب الموجب.

التفسير: في الوسط القاعدي (عالي  $\text{pH} > \text{pH}_i$ ), يحرر الحمض الأميني بروتونا ( $\text{H}^+$ ) على مستوى الوظيفة الكربوكسيلية ( $\text{COOH}$ ). فتصبح شحنته الكهربائية سالبة ( $\text{COO}^-$ )، ويهاجر إلى القطب الموجب.

### ❖ الاستنتاج


تتميز الأحماض الأمينية بالخاصية الأمفوتيرية، فهي تسلك سلوك الحمض في الوسط القاعدي، وسلوك القاعدة في الوسط الحمضي.

## 2. بنية البروتين

بنية البروتين هي شكل ثلاثي الأبعاد ثابت ومستقر يكسب البروتين خصصاً وظيفياً، يتبع عن آرها عدد ونوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية بواسطة روابط بيتيدية حسب الرسالة الوراثية. ولوصل البروتين إلى بيته الوظيفية تتطور السلسلة البيتيدية وتنتقل من مستوى إلى آخر أكثر تعقيداً يكتب شكلاً فراغياً.

### بـ- بنية ثانوية

انطواء سلسلة بيتيدية ذات بنية أولية في مناطق محددة بشكل حلزوني أو ورقي تفصل بينها مناطق بنية بحيث البنية الثانوية  $\alpha$  ذات التناقض حلزوني والبنية الثانوية  $\beta$  ذات انطواء ورقي. قد تحيي نفس السلسلة عدة بنيات ثانوية ألفا أو بيتا أو كليهما يفصل بينها مناطق ذات بنية أولية تدعى المناطق البيانية.




رسم تخطيطي يمثل البنية الأولية للبروتين

السنة العصبة

**النقطة العاشرة**  
تتضح هذه النتيجة وبنفي مستقرة بواسطة روابط هيدروجينية تنشأ بين الوظائف المترابطة معاً - (O-H-O) .  
النقطة العاشرة: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين  
و- الروابط الببتيدية.

د- بنية داعية  
ارتباط سلسلتين أو أكثر ذات بنية ثالثة بروابط غالبا ضعيفة وتسمى كل منها بتحت الوحدة.



III- الروابط البيتينية.

The diagram illustrates the **alpha-helix** secondary structure of proteins. It shows a zigzag backbone composed of **α-carbon atoms** (C<sub>α</sub>) connected by **peptide bonds** (amide linkages). The backbone is labeled with **α-hydrogen atoms** (H<sub>α</sub>) and **carboxyl groups** (-COOH). **Carbonyl groups** (C=O) are shown above the backbone, and **amino groups** (NH) are shown below. **Hydrogen bonding** is depicted as dashed lines between the carbonyl oxygen (O=C) of one residue and the **α-hydrogen atom** (H<sub>α</sub>) of the next residue along the helix. The **amide linkage** is shown as C=O-NH-C<sub>α</sub>. The **α-carbon atom** (C<sub>α</sub>) is bonded to the **α-hydrogen atom** (H<sub>α</sub>), the **carboxyl group** (-COOH), and two **side-chain groups** (R<sub>1</sub> and R<sub>2</sub>). The **side-chain groups** (R<sub>1</sub> and R<sub>2</sub>) are labeled as **amine groups** (NH<sub>2</sub>) and **carboxyl groups** (-COOH). The **amide linkage** is also labeled as **روابط هيدروجينية**.

**جـ- بنية ذاتية**  
 سلسلة بيتدية تحتوي على عدد من إحدى البيانات الثانوية  $\alpha$  أو  $\beta$  أو كليهما منطوية في مستوى لـ البيئة التي تصبح مناطق الانعطاف.

يساهم في تشكيل واستقرار هذه البنية أربع أنواع من الروابط هي: الهيدروجينية، الشاردية، تحاذب المكارهة للماء والجسور شائعة الكبريت. تنشأ هذه الروابط بين الوظائف الجانبية للأحماض والأمينيات السلسلة البيتدية، تصنف كما يلى:

- ج-٢- روابط تعاونية قوية

  - الهيدروجينية: تنشأ بين بعض الجموعات في السلسل الجانبي.
  - المغاردية: تنشأ بين الوظائف القطبية (الثانية) السالية (-COO-) والموجبة (+NH<sub>3</sub>).
  - تخاذب الجذور الكارهة للماء: شجذب الجذور الكارهة للماء وتحجّم في مركز جزيئ البروتين.

برنامه راستوب


برنامج يستعمل لتمثيل البنية الفراغية للبروتينات بشكل مفصل على شكل نماذج اهمها نموذج الكرة (النحوذج المكبس)، نموذج العود، نموذج الكرة والعود، النموذج الشريطي. كما يستعمل للتعرف على البروتينات بشكل مفصل: تحديد البنية الفراغية، عدد السلسل ال بينماية، عدد البنيات  $\alpha$  و  $\beta$  ومناطق الانعطاف، عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية.

### 3. العلاقة بين بنية ووظيفة الروتين

توقف البنية الفراغية للبروتين على عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة له، المتوضعة بشكل دقيق على السلسلة البيئية حسب الرسالة الوراثية. تنشأ بين جذور بعض الأحماض الأمينية روابط كيميائية (جسور ثنائية الكبريت، شاردية، هيدروجينية وتحاذب الجذور الكارهة للماء) في مواضع محددة، فتنتهي السلسلة وتلتقي وتشكل بنية فراغية وظيفية.

● تجربة أنفنسن: تظهر العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

لتراسه العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين استعمل العالم أنفسن الإنزيم ريبونيكلاز، يحتوي هذا الإنزيم على سلسلة بيتينية واحدة تتكون من 124 حمض أمينيا وأربعة جسور ثنائية الكبريت (ثمانية سيسنين).  
باستعمال مركب البيريا الذي يعيق الانطواء الطبيعي للبروتين ومركب  $\beta$ -ميركابتيو إيثانول الذي يعمل على تحليل الجسور ثنائية الكبريت، تم تحليل كل الجسور ثنائية الكبريت مما أدى إلى فقدان الإنزيم لنشاطه وإزالة خواصه الطبيعية.




(اسم تخطيطي يمثل البنية الثالثية للبروتين)

### السؤال رقم 01

نهاية عن التمارين الأول

بع تركيب البروتينات باليات محددة ومنظمة، لإبراز العلاقة بين المورثة وبنية البروتين عند خلية حقيقة النواة.

نقل الوبقة الناتجة مرافق تركيب البروتين عند خلية حقيقة النواة.



أ- اكتب البيانات المزفقة للأرقام وسُمّي المرحلتين (أ) و(ب).

ب- حدد في جدول العناصر الضرورية لحدوث كل من المرحلة (أ) والمرحلة (ب) ودور كل عنصر

ج- بين في نص على كيف يتحكم العنصر 7 في تحديد البنية الفراغية للعنصر 6.

### الإجابة المودجية

البيانات

1- شعيرة دموية، 2- أحاض الأمينية، 3- ARNm، 4- شبكة هيدرولية داخلية محيبة،

5- نخ وحدة كري للريبوزوم، 6- سلسلة بيتيدية (أو متعدد بيتيد)، 7- ADN،

8- نخ وحدة صغرى للريبوزوم.

- المرحلة (أ): الاستنساخ.

- المرحلة (ب): الترجمة.

### 2- نص علمي

المورثة قطعة من الـ ADN تحمل المعلومة الوراثية للبروتين، وينتاج عن تعبيرها المورثي بروتين يتميز بنية فراغية محددة. فكيف تحكم المورثة في تحديد البنية الفراغية للبروتين؟

انطلاقاً من إحدى سلسلتي الـ ADN (السلسلة المستنسخة)، يقوم الإنزيم ARN بوليميراز بتركيب

جزيء ARNm يحمل نسخة من المعلومة الوراثية باستعمال الريبونكليلوبوتيدات الحرة المتواجدة في العصارة الورقية، تسمى العملية بالاستنساخ وتختصر للتكامل بين القواعد الأوزوتية.

ينتقل الـ ARNm إلى الهيولى أين تتم ترجمته بواسطة الريبوزومات إلى سلسلة بيتيدية مكونة من عدد ونوع

وترتب محدد من الأحاسض الأمينية حسب تتابع عدد ونوع وترتيب النكليوبوتيدات على الـ ARNm.


تشاءَ بين جذور الأحاسض الأمينية في السلسلة البيتيدية روابط كيميائية في مواضع محددة بدقة في السلسلة البيتيدية (هيدروجينية، ثنائية الكبريت، شاردية وبخاذب الجذور الكارهة للماء)، فتنتف السلسلة تلقائياً وتشكل بنية فراغية ثابتة ومستقرة للبروتين.

### السلسلة الفرعية

بنية البروتين محددة وراثياً، فالمورثة تحكم في عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المشكّلة للبروتين، وهذه الأخيرة تحدد نوع وموضع الروابط الكيميائية في السلسلة البيئية وبالتالي تكتب البروتين بنية فراغية مميزة تخصّها وظيفياً. المورثة تحكم في عدد ونوع وترتيب التكليبيات على الـ *ARNm* هذا الأخير يتحكم في عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة البيئية.

بـ العزرين 02

يتوقف الشخص الوظيفي للبروتين على ثبات بنية الفراغية، خدف الدراسة التالية إلى معرفة كيفية اكتساب البروتين لبنية الوظيفة.  
مثل الشكل (أ) للوبيقة النائية البة الفراغية لبروتين تم الحصول عليه باستخدام معمر دايتوب. بينما الشكل (ب) عبارة عن توضيح لجزء من البروتين.




### 2. نص علمي

تتميز البروتينات ببنيات فراغية مختلفة كما أن كل بروتين ي يؤدي وظيفة محددة في المضوية، فما هي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين؟

يتوقف الشخص الوظيفي للبروتين على بنية الفراغية والتي يحددها عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب السلسلة البيئية وكذا الروابط الكيميائية (جسور كربونية، شاردية، هيدروجينية، بخاذب الجذور الكارهة للماء) الناشطة بين السلاسل الجانبية للأحماض أمينية محددة ومتوصولة بطرفية الفراغية للبروتين يفقد تخصّصه الوظيفي. واي خلل في البنية الحافظة على البنية الفراغية للبروتين تؤدي إلى الخلافة على أداء وظيفته، البنية هي التي تحدد الوظيفة.

بـ العزرين 03



لتوع الأحماض الأمينية وسلوكها المختلفة علاقة مباشرة بتحديد بنية ووظيفة البروتين.  
مثال الوبيقة نتائج المحررة الكهربائية لثلاثة أنواع من الأحماض الأمينية وضفت ضمن جهاز المحررة الكهربائية في وسط ذي  $pH = 3.2$ .



- 1- أكتب الصيغة نصف مفصلة لكل حمض أميني عند  $pH = 3.2$ . مبرزاً سلوكه في هذا الوسط.
- 2- قدم تعريفاً لـ  $pH$  الوسط 3.2 بالنسبة للحمض الأميني (س).
- 3- أكتب معادلة ارتباط الأحماض الأمينية حسب الترتيب التالي: Lys-Glu-Gly.
- 4- بين في نص علمي علاقة تنوع الأحماض الأمينية وسلوكها في تحديد بنية البروتين ووظيفتها.

### الإجابة المودجة

- 1- كتابة البيانات
  - 1- بنية ثانية ورقة  $\beta$ .
  - 2- بنية ثانية حلوانية  $\alpha$ .
  - 3- منطقة انعطاف.
- المستوى البنياني لهذا البروتين: يتركب من سلسلة بيئية واحدة ملتفة على شكل كروي، تحتوي على عدد من البيانات الثانوية  $\alpha$  و  $\beta$  يفصل بينها مناطق انعطاف، كما يوجد رابطة شاردية بين الجمادات الكيميائية الموجبة والسلبية في السلاسل الجانبية، فمستوى البنية ثالثية.

### الإجابة المودعة


السلسلة الفرعية  
لوحدة 02: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين  
جـ- مكتابات معادلة الارتباط




### 2- نص علمي

يدخل في تركيب البروتينات عشرون نوعاً من الأحماض الأمينية، وهي مركبات عضوية تتركب من جزء ثابت وجذر متغير R يحتوي على وظيفة مميزة للحمض الأميني. فما هي علاقة نوع هذه المركبات بسلوكها بتحديد بنية البروتين ووظيفته؟

يتركب البروتين من عدد ونوع وترتيب محدد وراثياً من الأحماض الأمينية، تنشأ مجموعة من الروابط سلوكه في الوسط: الحمض الأميني متعدد ووضع في وسط حمضي ( $\text{pH} < \text{pHi}$ ) لذا سلوكه الكيميائية بين وظائفها الطرفية الحرجة، وبين جذري حمضين أمينيين من نوع السيسينين (Gly) تنشأ الجسور (أكسبروتونيا  $\text{H}^+$ ) على مستوى الوظيفة الأمينية ( $\text{NH}_2$ ). واكتسب محصلة شحنة موجة (بناية الكبريت، وتتجاذب الجذور الكارهة للماء مثل الأحماض الأمينية الأليفاتية، كما تنشأ روابط هيدروجينية بين الجذور المستقطبة، وتتشكل الروابط الشاردية بين جذور الأحماض الأمينية الحمضية (Gly، Lys، Arg، Asp) والقاعدية (Lys, His, Arg)، حيث يتغير سلوك هذه الأحماض الأمينية حسب درجة  $\text{pH}$  الوسط.



### الصيغة نصف المفضلة



تشكل هذه الروابط يتأثر على الحالة الكهربائية لوظائفها الكربوكسيلية والأمينية الحرجة. تشتغل هذه الروابط يساهم في انتظام السلسلة البيتدية، حيث الأحماض الأمينية المتعددة في السلسلة البيتدية تتقارب في الفراغ، وتكتسب السلسلة بنية فراغية مميزة وناتجة تسمح لها بآداء وظيفة محددة في لعضوية.

### بنية كل بروتين تتحدد بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية وذلك من خلال الروابط الكيميائية

وأكتسب بروتينين على مستوى الوظيفتين القاعدتين الطرفية والجانبية وأصبحت محصلة شحنة (2+) وهاجر نحو القطب السالب بمسافة كبيرة.

### بـ التعريف

تسعى درجة  $\text{pH}$  الوسط 3.2 بالنسبة لحمض الجلوتاميك نقطة التعادل الكهربائي  $\text{pHi}$ ، وهي درجة  $\text{pH}$  التي يكون فيها الحمض الأميني متعدل كهربائياً (محصلة شحنته معدومة).

نحن في البداية فقط. صديق لساناً كباراً ولكن سنكبر معاً...  
سنداول... نداول... ونداول تقديم المساعدة دوماً

لحن في انتظار المتفوقين منكم... نواصل معنا على صفحة الفيس بوك  
**مكتبة عكاشه Okacha Bookstore**

## السلسلة الفضفية


## تمرين 04

علوم الطبيعة والحياة من الألف

## الوحدة 02: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين


يرتبط نشاط البروتين ببنية الفراغية التي تحددها مجموعة من الأحماض الأمينية الدالة في تركيبها. الغرض دراسة العلاقة بين بنية البروتين وخصصه الوظيفي ودور الأحماض الأمينية في ذلك تعطي الوثيقة التالية التي تمثل البنية الفراغية لإنزيم الليزوزم.

- تعرف على الأرقام الممثلة في البنية (A)، ثم باستخدام الصيغة العامة للأحماض الأمينية أكتب صيغة الجزء المؤطر في الوثيقة (01).
- باستغلال الوثيقة (01) اشرح في نص علمي تباعد الأحماض الأمينية في الشكل (B) وتقارنها في الشكل (A) محددا دور المورنة في ذلك.



## الإجابة النموذجية

1- الأرقام الممثلة في البنية (A) هي الأحماض الأمينية المشكّلة للموقع الفعال. صيغة الجزء المؤطر



## 2- نص علمي

يأخذ البروتين بعد تشكيله بنية فراغية ثابتة تكتبه خصصه الوظيفي. كيف يحدث ذلك؟

بعد تشكيل السلسلة البيئيدية يمر بعدة مستويات بنوية متدرجة التعقيد وينتهي بالبنية الأولية والتي تتميز بارتباط الأحماض الأمينية بروابط بيئيدية مشكّلة سلسلة بيئيدية حيث عدد، نوع وترتيب الأحماض الأمينية فيها تحدده المورنة.

تلت السلسلة البيئيدية تلقائياً لأخذ مستوى فراغي ثانوي ثم ثالثي والذي يتميز بقارب الأحماض الأمينية فضائياً وتنسق هذه البنية لظهور روابط كيميائية جديدة تظهر بين جذور الأحماض الأمينية (هيدروجينية، شاردية، بخاذب الجذور الكارهة للماء والجسور ثنائية الكبريت).

أثناء نضج البروتين تحدث له انطلاقات عديدة، تسمح للأحماض الأمينية ذات أرقام متعددة في السلسلة الأولية والتي تحددها المورنة بأن تقارب فضائياً مكاسب البروتين مستوى فراغياً وظيفياً.


## السلسلة الفضفية

## تمرين 05

## الوحدة 02: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

تأخذ البروتينات بعد تركيبها بنية فراغية وظيفية ترجع في الأصل إلى الاختلاف في عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية التي تدخل في تركيبها.

يوضح الشكل (A) من الوثيقة البنية الفراغية الثلاثية الأبعاد لجزيء بروتين، مدعاة بالشكل (B) الذي يعرض التفاصيل الجزيئية للجزء المؤطر منها.



## الوثيقة

ملاحظة: تعطي صيغ بعض الجذور R لوحدات الأحماض الأمينية كما يلي:

(Ile) =	(Ala) = -CH <sub>3</sub>	(Asp) = -(CH <sub>2</sub> )-COOH	(Ser) = -CH <sub>2</sub> OH
-CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>		(Gln) = -(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -CO-NH <sub>2</sub>	(Cys) = -CH <sub>2</sub> -SH

1- تعرف على البيانات المشار إليها بالأرقام من الشكل (A) والأحرف من الشكل (B) محددا المستوى البيئي للجزء المؤطر في الشكل (A).

2- إن معاملة البروتين الموضع في الشكل (A) مركب  $\beta$  مركب إيثانول ي يؤدي إلى فقدانه لوظيفته.

باستغلال معلومات الوثيقة ومعارف المكسبة وضع في نص علمي العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته.

## الإجابة المموجة السلسلة الفضية

- 1- تعريف**
- اللغة النوية: هي أبجدية تكتب باربعة أحرف هي (A, C, G, T) في الـ ADN ولا (A, C, G, U) في الـ ARNm
  - ترتكب كل كلمة من اللغة النوية من ثلاثة أحرف وتسمى الرامز، وتضم اللغة 64 كلمة نوية مبنية في جدول الشفرات الوراثية.
  - اللغة البروتينية: هي أبجدية تكتب بـ 20 كلمة تمثل في الأحماض الأمينية 20 التي تدخل في تركيب البروتينات.
  - لا يمكن تحديد بدقة المورثة التي تشرف على تركيب جزيء الأنكيفالين العامل: لأن معظم الأحماض الأمينية تشرف لها عدة رامزات (المرادف) وبالتالي يمكن أن تأخذ المورثة عدة إشكالاً تشرف كلها لنفس الببتيد: Phe - Met - Gly - Gly - Tyr - Gly - Tyr - Gly - Gly - Met.
  - مثال: المورثتين التاليتين تشفران نفس الببتيد المدرس:

UAU - GGU - UUU - AUG  
UAC - GGC - GGG - UUC - AUG
- 2- نص علمي**
- إن اللغة النوية الممثلة بالمورثة (ADN) مكونة من أربعة أنواع من الكلورونات، تسع إحدى سلسلتها (السلسلة الناسخة) إلى ARNm وهي لغة نوية أخرى تترجم إلى لغة بروتوبية مكونة من 20 حمض أمينياً. فكيف يتم تحويل اللغة النوية إلى لغة بروتوبية؟
- تعد البروتينات جزيئات حيوية تتميز بيئتها خاصة تشرف على تركيبها مورثات، حيث يتم التعرف عن المعلومة الوراثية المحمولة على الـ ADN بالبيتين متاليتين هما الاستساخ والترجمة. الاستساخ يتم في النواة وتم خلاله التصنيع الحيواني لجزيء الـ ARNm، هذه الجزيئة عبارة عن لغة نوية وتحتل الشفرة الوراثية المكونة بأربع قواعد آزوتية، تتم العملية بواسطة الإنزيم ARN بوليميراز وتتضمن لتكامل القواعد الآزوتية بين سلسلة ARNm الناسخة والسلسلة الناسخة في الـ ADN.
- تخرج جزيء الـ ARNm من النواة إلى الهيكل لتترجم إلى سلسلة بيتيدية أي لترجمة اللغة النوية إلى لغة بروتوبية.

بعد تجارب فلك رموز الشفرة الوراثية تم التوصل إلى أن كل الكلمات النوية تتشكل من ثلاث نوكليوتيدات (الرامز) وتشفر حمض أميني واحد، أي تترجم حمض أميني واحد. وتم التوصل إلى وجود 64 كلمة نوية تترجم إلى 20 حمض أمينيا مع وجود مرادفات، أي أن بعض الأحماض الأمينية تشفّر لها أكثر من رامز واحدة.

تم ترجمة الـ ARNm إلى سلسلة بيتيدية بواسطة الريبوزومات حيث يقرأ الريبوزوم رامزات الـ ARNm ويربط الأحماض الأمينية الموقوفة لها ويركب سلسلة بيتيدية مكونة من عدد ونوع وترتيب محدد وراثياً من الأحماض الأمينية.


## الإجابة المموجة

- 1- البيانات**
- منطقة انعطاف، 2- بيضة ثانية حازونية ألفا، 3- بيضة ثانية ورقية  $\beta$ .
  - رابطة شاردية، ب- رابطة كارهة للماء، ج- جسر ثالثي الكربون، د- رابطة هيدروجينية.
  - المستوى البيوي للجزيء: بيضة ثالثة (محتوى على سلسلة بيتيدية واحدة).
- 2- نص علمي**
- البيضة الفراغية للبروتين ضرورية له كي يصبح البروتين وظيفياً. حيث يحدد التابع النوكليوتيد في السلسلة المستنسخة للمورثة التابع النوكليوتيد في الـ ARNm الذي يحدد عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب البروتين. فما هي العلاقة بين بيضة ووظيفة البروتين؟
- توقف البيضة الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين على الروابط التي تنشأ بين الأحماض أمينية (روابط كبريتية، شاردية، كارهة للماء...) ومتواضعة بكيفية دقيقة في السلسلة البييدية.
- عند تفكيرك هذه الروابط باستعمال مركبات كيميائية مثل مركب  $\beta$ -مركيتو إيثانول الذي يعمل على تفكيرك الجسور الكبريتية فقد البروتين بهذه الفراغية فنصلع عند ذلك غير فعال.
- فهذه الروابط ضرورية للمحافظة على استقرار وتماسك البيضة الفراغية الطبيعية للبروتين وبالتالي المحافظة على تخصصه الوظيفي.

### بعض التمارين 06

تعتبر البروتينات والبيوتيدات جزيئات أساسية في حياة الكائنات الحية حيث يتم تركيبها وفق آلية التعبير المورثي وذلك بتحويل اللغة النوية إلى لغة بروتوبية باستعمال عناصر نوية وأخرى هيولية.

تمثل الوثيقة التالية نموذجاً لجزيء الأنكيفالين وهو مبلغ عصبي يدخل في وظائف الخلايا العصبية.



الوثيقة

- 1- بالاعتماد على الوثيقة وجدول الشفرة الوراثية:  
- عرف كلاً من اللغتين النوية والبروتوبية.  
- هل يمكن تحديد بدقة المورثة التي تشرف على تركيب جزيء الأنكيفالين؟ علل ذلك.
- 2- على ضوء ما سبق، اشرح في نص علمي آلية تحويل اللغة النوية إلى لغة بروتوبية مبرزاً العلاقة بين المورثة والبروتين.

### السلسلة الفضفية

تبدأ آلية التعبير المورني انطلاقاً من المورونة وتنتهي بتشكيل البروتين، حيث عدد ونوع وترتيب الكليوبيدات في المورونة يحدد عدد ونوع وترتيب الكليوبيدات في الـ ARNm، والتي يدورها تحدد عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المشكّلة للبروتين.




### نماذج عن التعبيرين الثاني

**بعض التعبير 01**  
يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الفراغية، ولتوسيع العلاقة بين تغير البنية الفراغية وظهور مشاكل واختلالات صحية نقدم الدراسة التالية:

#### الجزء الأول

يتقدّم الكوليستيول في الدم ضمن مادة تعرف بالـ LDL (تشكل من طبقة بروتينية خارجية في داخلها الكوليستيول). يدخل الـ LDL إلى الخلايا بعد تبنته على مستقبلات غشائية نوعية R فيما اقتاصده من طرف الخلية لاستعماله. يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (01) آلية دخول الـ LDL وتنкиّر للمستقبل R، أو الشكل (ب) من نفس الوثيقة في حين جذور بعض الأحماض الأمينية الداخلة في بناء المستقبل الغشائي مع رقم تسلسلها والـ pH الخاص بكل حمض أميني.



- مثيل الصيغة الشاردية للحمض الأميني (75) في درجات الـ pH (5 ، 2.77 ، 9.74).

- باستغلال الشكلين (أ) و(ب) حدد بدقة دور الأحماض الأمينية في تشكّل وثبات البنية الفراغية للمستقبل R.


#### الجزء الثاني

إنَّ مرض نصلب الشريان الناجع عن ارتفاع الكوليستيول في الدم وما ينتجه عنه من ضيق الشعيرات الدموية وخاصة على مستوى القلب يتسبّب في وفاة الكثير من الأفراد، وللتعرّف على سبب المرض تابع الوثيقة (02) التي يمثل الشكل (أ) منها جزء من الأليل R<sub>1</sub> المسؤول عن ترقيب المستقبل الغشائي.

## السلسلة المختصرة


### الجزء الثاني

- متالية الأحماض الأمينية التي يُشرف على تركيبها جزء الأليل R<sub>1</sub>.



متالية الأحماض الأمينية  
Arg — Asn — Glu — Phe — Gln — Cys — Gln  
29 30 31 32 33 34 35

- متالية الأحماض الأمينية التي يُشرف على تركيبها جزء الأليل R<sub>2</sub>.



متالية الأحماض الأمينية  
Arg — Asn — Glu — Phe رامزة التوقف  
29 30 31 32

### 3- مناقشة العلاقة

- عند الشخص السليم، الأليل R<sub>1</sub> طبيعي يشفر لبروتين R (المستقبل الغشائي) ذو بنية طبيعية يحافز على استفزارها جسورة ثنائية الكربون تتشابه بين جذور الأحماض الأمينية من نوع السيسينين وروابط شاربدين بين الأحماض الأمينية Asp و Lys. تسمح له البنية الطبيعية بشبكة LDL مما يسمح للخلايا من افتساب فلا يتراكم في الأوعية الدموية، فلا تضيق ولا تظهر أعراض المرض الناتج عن ارتفاع الكوليسترول.

- عند الشخص المصاب، تُتعديل القاعدة الأزوية الأولى في الرامزة رقم 33 وهي الغوانين (G) في الأليل R<sub>1</sub> للشخص السليم بالأدنين A في الأليل R<sub>2</sub> للشخص المصاب. ينتج ARNm تغير فيه الرامزة رقم 33 (CAG) التي تُشفّر للحمض الأميني الغلوتامين (Gln) عند الشخص السليم وتُصبح رامزة التوقف (UAG) عند الشخص المصاب.

وأثناء ترجمة ARNm في خلايا الشخص المصاب، توقف العملية عند رامزة التوقف "الجديدة" رقم 33 (UAG) وتشكل سلسلة بيتيدية قصيرة مكونة من 32 حمض أمينيا فقط، وتتوسط الروابط في غير أماكنها الصحيحة فلا تُركب السلسلة البيتدية الناتجة البروتين الوظيفي الطبيعي للمستقبل في المستقبل R، وبالتالي لا تتمكن خلايا الشخص المصاب من استقبال المادة LDL الناقلة للكوليسترول من الدم إلى الخلايا، ترتفع نسبة الكوليسترول في دم الشخص المصاب مقارنة بالشخص السليم وتُسبب له مرض تصلب الشرايين والأعراض الناتجة عنه.

## السلسلة المختصرة


### الوحدة 02: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين نماذج عن التمارين الثالث

#### كـ التمارين 01

من الأمراض حيث يحمل أويبيز وتعزى أيضاً SLOS مرض نادر يرتبط بارتفاع الكوليسترول. يتميز مثلاً مريضاً SLOS بشروبه مثير في الوجه، صفر الرأس، فاخر النمو والإعاقة الذئنية، تحديد سبب مرض SLOS والبحث عن علاج له تفتح الدراسة التالية:

#### الجزء الأول

الكريستول ضروري لنمو الجنين طبيعياً وله وظائف مهمة قبل وبعد الولادة، فهو يمثل عنصراً بنائياً للأغشية الخلايا بالإضافة إلى أنه يلعب دوراً في إنتاج بعض الهرمونات والأحماض الأمينية.  
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (01) المراحل الأخيرة من طريق التركيب الحيوي للكوليسترول، بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة التفاعل المحفز بواسطة الإنزيم 7-DHCR.



الشكل (01)

1- على معطيات الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة (01) ميرزا دور الإنزيم 7-DHCR في التركيب الحيوي للكوليسترول.

2- اقترح فرضيتين تفسر من خلالهما سبب المرض SLOS.


#### الجزء الثاني

إثبات صحة إحدى الفرضيتين المقترنتين تعطي الدراسة التالية:  
مثل الوثيقة (02) جزء من التسلسل النكليوتيد لأليل شخص سليم (السلسلة غير الناسخة) ومن أليل شخص مريض للمورثة (W151X).

رقم النكليوتيدات	5
أليل الشخص السليم	5
أليل الشخص المريض	
الوثيقة (02)	

### السلسلة الفعلية

- 1- استبدل بمعضيات الوثيقة (02) ومستعيناً بجدول الشفرة الوراثية لكي تؤكد صحة إحدى الفرضيات المقترنة.
- 2- للبحث عن علاج لهذا المرض، أجرى العلماء تجربة للحصول على فئران تعاني عجزاً في إنتاج الكوليسترول، حيث قاموا بمعالجتها بجزيئة BM 15.766. تم قياس تركيز الكوليسترول الجنوبلازمي عند مجموعات من الفئران بعد مرور أسبوعين على المعالجة:
- مجموعة من الفئران غير المعالجة (يرمز لها 0).
  - مجموعة من الفئران المعالجة بالجزيئة BM 15.766 (يرمز لها 1).
  - مجموعة من الفئران المعالجة بالجزيئة BM 15.766 وتلقت غذاء غني بالكوليسترول (يرمز لها 1+).
- نتائج الحصول عليها ممثلة في الوثيقة (03).



- حل النتائج الممثلة في الوثيقة (03).

**الجزء الثالث**  
من خلال المعلومات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة، أكتب ملخصاً حول مصدر أمراض متلازمة SLOS. وفقاً لهذه الدراسة على الفئران، اقترح علاج يمكن اعتماده لدى المرضى الذين يعانون، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية 2: نقص أو غياب الكوليسترول يعود إلى فقد الإنزيم 7-DHCR نشاطه متلازمة SLOS.

### الإجابة النموذجية

#### الجزء الأول

1- التحليل


يتمثل الشكل (أ) المراحل الأخيرة من طريق التركيب الحيوي للكوليسترول.

يختبر الإنزيم سكالين ستار تحويل فرنسيل ثاني الفوسفات (مادة التفاعل) إلى سكالين (ناتج التفاعل).

يتحول هذا الأخير إلى 7-DHC.

بالتالي يحترف الإنزيم 7-DHC تحويل 7-DHC (مادة التفاعل) إلى كوليسترول (الناتج).

يتمثل الشكل (ب) التفاعل الحفري بواسطة الإنزيم 7-DHCR.



**مثال الوثيقة (03)** أعمدة بيانية تعبّر عن تغيرات التركيز الجنوبلازمي للكوليسترول عند ثلاثة مجموعات (mg.dL⁻¹) تم قياسها بعد مرور أسبوعين على المعالجة حيث نلاحظ:

- عند مجموعة الفئران غير المعالجة بالجزيئة BM 15.766 يكون تركيز الكوليسترول في الدم مرتفع يقدر بحوالي  $49 \text{ mg.dL}^{-1}$ .
- عند مجموعة الفئران المعالجة بالجزيئة BM 15.766 يكون تركيز الكوليسترول في الدم أقل من تلك المسجلة عند مجموعة الشاهد حيث تقدر بحوالي  $15 \text{ mg.dL}^{-1}$ .

### السلسلة الفعلية

الوبيقة (02): العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين  
السلسلة الفعلية  
- من خلال الشكلين (أ) و(ب) افتح فرضية تفسر بما سبب اختلاف نتائج المجرة الكهربائية في  
الشكل (ب).  
الجزء الثاني  
بيانات صحة الفرضية تقتصر ما يلي:  
يترك الميموغلوبين من أربعة سلاسل ببتيدية تشرف على تصنيعها أربعة مورثات، مورثان تشفران  
السلسلتين α1 و α2 و مورثتان تحكمان في تضييع السلسلتين β1 و β2.  
وهي دراسة مكملة لمعرفة سبب هذا المرض تقتصر عليك الوبيقة (02) التي توضح نتائج تم الحصول عليها  
بالبرنامج أناجان ظهر المقارنة بين الأليلات المورثات المسؤولة عن تضييع السلسلة β عند الإنسان حيث  
أليل α1 HbA يمثل Béta Cod.ADN أما الأليلات α2 فهي مماثلة بـ BETA AVAR.ADN و BETA AVAR2.ADN و DREPCOD.ADN.

		1	5		
		Comparaison simple de séquences			
Traitement	0	ATGCGTG <b>A</b> CTGACTCCTGAGCCACI		دلت	(0)
BETACOD.ADN	0				
BETA VAR ADN	0				
BETA VAR2 ADN	0				
DREPCOD.ADN	0				

الوبيقة (02)

ا- انطلاقاً من الوبيقة (02) وجدول الشفارة الوراثية، استخرج جزيء الـ ARNm وجزء من تسلسل  
الأمراض الأمينية للسلسلة الببتيدية β لكل من أليل α1 HbA وأليلات α2 HbS، ثم قدم تحليلاً مقارناً بين  
سلسلتين بيتيدية الحصول عليهما.  
ب- فسر سبب فقر الدم المنجلی مع العلم أن الخلل الحادث في الأليلين BETA AVAR.ADN و BETA AVAR2.ADN  
لا يؤثر على نشاط البروتينين ثم تحقق من صحة الفرضية.

### الجزء الثالث

من خلال ما سبق ومعلوماتك أخيراً مخططاً وظيفياً بين العلاقة بين المورثة والبروتين مبرراً عواقب حدوث  
خلل في المورثة على بنية ونشاط بروتين الميموغلوبين.

### الإجابة النموذجية

#### الجزء الأول

##### التحليل

ثل الشكل (ب) نتائج تقنية المجرة الكهربائية لـ HbA و HbS.  
لاحظ هجرة كل من HbA و HbS نحو القطب الموجب لجهاز المجرة الكهربائية انطلاقاً من الموضع  
الثاني حيث مسافة هجرة α1 HbA أكبر من سرعة هجرة α2 HbS، دليل على اكتسابها شحنة موجبة  
وأن قدر مختلفة.

### علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

- عند مجموعة الفئران المعالجة بالجزيء BM 15.766 والتي تلقت غذاء غني بالكوليستيرول يكون تركيز  
الكوليستيرول في دمها مرتفعاً (أكبر من المجموعة الشاهد) وقدر بـ 58 mg.dL⁻¹.

يستجح أن إتباع نظام غذائي غني بالكوليستيرول يجعل من الممكن علاج نقص الكوليستيرول عند الفئران  
الجزء الثالث

الملخص  
أصل هذا المرض وراثي: حدوث طفرة وراثية على مستوى المورثة المعايرة للإنزيم 7-DHCR المسؤول عن  
الخطوة النهائية في إنتاج الكوليستيرول حيث تم على مستوى الـ ARNm الخاص بالبروتين الطافر استبدال  
الكليوتيدين G رقم 421 بالكليلوتاين A نجم عنه ظهور رامزة التوقف UGA. أدت الطفرة الوراثية إلى تركيب  
بروتين (الإنزيم 7-DHCR) فسي ذي بنية فراغية غير طبيعية (إنزيم غير وظيفي). توقيف تركيب الكوليستيرول  
أدى إلى ظهور أعراض متلازمة SLOS.

### العلاج المقترن


هذا المرض وراثي وبالتالي لا يوجد علاج شاف له.  
إمكانية علاج الآثار المترتبة بإتباع نظام غذائي مناسب يحتوي على مكمّلات الكوليستيرول.

### بعض التمارين 02

تحديد العلاقة بين المورثة والبروتين تقتصر بعض المعلومات والأبحاث العلمية حول مرض فقر الدم المنجلی.  
الجزء الأول

فقر الدم المنجلی مرض يتمثل في تشوّه شكل كريات الدم الحمراء وبالتالي فقدان وظيفتها الحيوية المتمثلة  
في نقل الغازات التنسجية، لغرض البحث عن سبب هذا المرض تم إجراء عدة تجارب وأبحاث علمية.  
تم دراسة الخصائص الكهربائية لكل من البروتين الميموغلوبين (HbA) عند شخص سليم والميموغلوبين الشخص  
المصاب (HbS) وهذا بتقنية المجرة الكهربائية.

يوضح الشكل (أ) من الوبيقة (01): البنية الفراغية لبروتين الميموغلوبين الوظيفي  
يوضح الشكل (ب) من الوبيقة (01): نتائج تقنية المجرة الكهربائية لـ HbA ولا HbS.



1- حل نتائج تقنية المجرة الكهربائية الممثلة في الشكل (ب) من الوبيقة (01).

**السلسلة الفعلية**  
**الوحدة 02:** العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين  
 المورثة المشفرة للهيموغلوبين أدت إلى تغير نوع أحد أو بعض الأحماض الأمينية من بينهما حمض أميني حمضي واحد على الأقل" صحيحة.

**الجزء الثالث**

تستنتج أن الهيموغلوبين HbA و HbS مختلفين في نوع بعض الأحماض الحاملة حيث إن HbS متحتون  
 عدد أقل من الأحماض الأمينية الحاملة.  
**2- الفرضية المقترنة**  
 عند الشخص المصابة حدثت طفرة على مستوى المورثة المشفرة للهيموغلوبين أدت إلى تغير نوع  
 أو بعض الأحماض الأمينية من بينها حمض أميني حمضي واحد على الأقل.

**الجزء الثاني**  
**1- استخراج الرNA والسلسلة الببتيدية**

BETACOD.ADN  
 AUG GUG CAC CUG ACU CCU GAG GAG  
 Met - Val - His - Leu - Thr - Pro - Glu - Glu  
 BETAavar.ADN  
 AUG GUG CAU CUG ACU CCU GAG GAG  
 Met - Val - His - Leu - Thr - Pro - Glu - Glu  
 BETAavar2.ADN  
 AUG GUG CUC CUG ACU CCU GAG GAG  
 Met - Val - Leu - Leu - Thr - Pro - Glu - Glu  
 DREPCOD.ADN  
 AUG GUG CAC CUG ACU CCU GUG GAG  
 Met - Val - His - Leu - Thr - Pro - Val - Glu


**ملاحظة:** يمكن أن تكتب السلسلة الببتيدية بمحذف للميثيونين Met

**التحليل المقارن**

من خلال ما توصلنا عليه في الإجابة عن السؤال السابق فإنه لا يوجد اختلاف بين السلسلتين الببتيديتين BETACOD.ADN و BETAavar.ADN لكن يوجد اختلاف بين السلسلة الببتيدية 1 و BETAavar2.ADN في الحمضين الأمينيين رقم 3 و رقم 7 حيث تعدد على الترتيب من اليسار إلى اليمين الوسرين والفالين تستنتج أن الطفرة لا تؤدي دالما إلى تغير في تسلسل الأحماض الأمينية في البروتين.

**2- تفسير سبب حدوث هدر الدم المنجل والتحقق من صحة الفرضية**

في حالة الطفرة الخامدة في الموضع الثالث للثلاثية الكليوتيديه رقم 3 لم تؤثر الطفرة على تسلسل الأحماض الأمينية، وفي حالة حدوث الطفرة في الموضع الثاني للثلاثية الكليوتيديه 3 تم تغيير الحمض الأميني 2 من هستيدين إلى لوسين لكن لا يؤثر هذا التغير على نشاط البروتين لأن التغير حصل خارج موقع العمل لكن في حالة الديريباتوسبيوز حدثت الطفرة في الموضع الثاني بغير القاعدة الأيزونية A إلى T للثلاثية رقم 7 أدت الطفرة إلى تغير في نوع الحمض الأميني من حمض الغلوتاميك إلى الفالين حيث أثرت الطفرة على الأحماض الأمينية المشكلة لموقع البروتين ونسبت في تشكيل الالياف من الهيموغلوبين (نداخل الجنور الكارهة للماء) وبالتالي تعطي لكرية الدم الحمراء شكلًا منجلاً. إذن فالفرضية "حدثت طفرة على مستوى



مخطط وظيفي يوضح مراقبة المورثة Béta للهيموغلوبين عند شخص سليم وشخص مصاب

## الوحدة ٣٠: دور البروتينات في التحفيز الألبيم

### ١- جزء المروض

#### ١- مفهوم الإنزيم وأهميته

إنزيم وسيط حيوي ذو طبيعة بروتينية، يحفر (يسرع) التفاعلات الحيوية، يتحيز بناءً على نوع مادة التفاعل (الركبزة)، يعمل في شروط محددة من درجة الحرارة والمحض. في حالة غياب الإنزيم يتوقف بيته الفراغية، يتوقف التفاعل الذي يحفره هنا الإنزيم **وتحفيز عمل الطاولة الحيوية الفعالة**. يفتح التغير في بيئة الإنزيم عن حدوث تغير على الورقة التي تشرف على تركيز **تغير عوامل الوسط**.

#### ٢- بنية الإنزيم

**يشير الإنزيم** ببنية فراغية مستقرة، تتركب من عدد ونوع ونطاق عدد من الأحماض الأمينية، تتحيز صغيراً على شكل فجوة أو شق يسمى الموقع الفعال ويتركب من عدد محدود من الأحماض الأمينية. موقع فعل: حزء يحيط من الإنزيم، يظهر على شكل فجوة أو شق في بيئة الإنزيم، يمكن من عدد محدود من الأحماض الأمينية، يشير بالتكامل البيولوجي مع مادة التفاعل ويكون من موقع التثبيت (الإنزيم). التعرف) يثبت مادة التفاعل **موقع التحفيز** يؤثر على مادة التفاعل.

\* الأحماض الأمينية المشكّلة للموقع الفعال لا يشترط أن تكون متالية في السلسلة البيئية، لأن السلف يحيط الأحماض الأمينية المتباينة في السلسلة تتقارب في الفرع.

#### ٣- تفاعل إنزيمي

عناصر التفاعل الإنزيمي: الإنزيم E، الركيزة أو مادة التفاعل D، المعقد (إنزيم-ركبزة (ES)) والناتج P.


#### ٤- آية التفاعل الإنزيمي

- يرتبط الإنزيم بالركبزة في مستوى الموقع الفعال لوجود تكامل بيولوجي ويتشكل المعقد إنزيم-مادة التفاعل.
- الضوري لحدوث التفاعل. بواسطة روابط التقابلية. ترتبط الوظائف الكيميائية مادة التفاعل مع الوند الشاغرة)، وجود كمية كافية من مادة التفاعل E.
- كما تتحيز بتحول مادة التفاعل E التي تتناقص كيتها إلى ناتج P وتوضع كيتها.
- مرحلة ثانية (E-Z-2): تبلغ سرعة التفاعل الإنزيمي أقصاهما وكانت تشي كل جزيئات الإنزيم مادة التفاعل. ويستمر تحويل مادة التفاعل إلى ناتج بسرعة ثانية.
- مرحلة ثالثة (E-Z-3): تتناقص سرعة التفاعل إلى ناتج كل جزيئات الإنزيم مادة التفاعل.
- يتحور الناتج عن الإنزيم.

## السلسلة الفضائية

## وحدة 03: دور البروتينات في التحفيز الإنزيمي

**ج- ترسيب:**  
يقوم الإنزيم بربط مادي تفاعل أو أكثر لتنشط مادة تفاعل واحدة مركبة، وفق المعادلة:  
 $E + S_1 + S_2 \rightarrow ES_1S_2 \rightarrow E + P$



رسم تخطيطي يمثل آلية عمل الإنزيم: تفاعل الترسيب

**4- دركية الإنزيم**  
هي دراسة سرعة التفاعل وتغيراتها مع الشروط التجريبية لاستنتاج العديد من خصائص الإنزيم وطريقه عمله.


**4-1- سرعة التفاعل الإنزيمي**  
يعبر عن سرعة التفاعل الإنزيمي بـ  $v = dS / dt$  - كمية مادة التفاعل  $S$  المتناقصة على وحدة الزمن.  
- كمية الناتج  $P$  المنشكلة على وحدة الزمن:  $v = dP / dt$ .  
حيث:  $v$ : سرعة التفاعل،  $S$ : التركيز،  $P$ : الناتج،  $t$ : الزمن،  $d$ : الفارق.

## 4-2- خصائص حركة الإنزيم

**أ- نوعية**  
يتميز الإنزيم بنوعية مزدوجة، نوعية بالنسبة لمادة التفاعل أي يرتبط بمادة تفاعل واحدة خاصة به. ونوعية بالنسبة لنوع التفاعل أي يخفر نوعاً واحداً من التفاعلات. مثلاً، الغلوكوز ركيزة ترتبط بها إنزيمات مختلفة، وكل إنزيم يخفرها إلى ناتج مختلف. إذن هذه الإنزيمات تشرك في تحصصها مع الركيزة (الغلوكوز)، ولا تشرك في نوع التفاعل. تملّك بعض الإنزيمات موقعين فعاليين مختلفين أو أكثر.

## التراكيب التجريبية المدعوم بالحاسوب

- أ- مكونات
  - مفاعل حيوي: يتم فيه التفاعل والقياسات.
  - مسبار (الاقط): يقيس تركيز مادة معينة ( $O_2$ ,  $O_2$ , pH, حرارة...).
  - وسبط: يربط اللاقط بالحاسوب.
  - حاسوب: يعرض الناتج على شكل منحنيات.




مراحل التفاعل الإنزيمي

## 3-3- أنواع التفاعل الإنزيمي

نقوم الإنزيمات بتحفيز ثلاثة أنواع من التفاعلات: تحويل، تفكيك وترسيب.

## أ- تحويل


يقوم الإنزيم بتحويل مادة التفاعل إلى ناتج وفق المعادلة:  
 $E + S \rightarrow ES \rightarrow E + P$



رسم تخطيطي يمثل آلية عمل الإنزيم: تفاعل التحويل

## ب- تفكيك

يففكك الإنزيم مادة التفاعل إلى ناتجين أو أكثر وفق المعادلة:  
 $E + S \rightarrow ES \rightarrow E + P_1 + P_2$



رسم تخطيطي يمثل آلية عمل الإنزيم: تفاعل التفكيك


### الصلة الفنية

- بـ- مرايا
- قياس سريع ودقيق لتركيز المتفاعلات والتواتج.
- نتائج مخططة لسرعه التفاعل على شكل الخطوط.
- متداولة معاشرة للتغير تغيرات شرطه التفاعلي.
- حفظ النتائج التجريبية في ذاكرة الحاسوب.

### تجربة تظهر خاصية النوعية للإنزيمات

لتحرت تجربتين تم في كل منهما قياس تركيز  $\text{H}_2\text{O}_2$  في وسط التفاعل المحتوي على تركيز ثابت في الإنزيم أكسيداز (60) بالإضافة إلى سكر الغلوكوز أو الفركتوز في درجة حرارة ثابته  $(37^\circ\text{C})$  وعند درجة  $\text{pH}$  ثابته (7).

النتائج ممثلة في المحنن التالي:



التفسير: نظر عدم استهلاك  $\text{H}_2\text{O}_2$  في حالة الفركتوز بل الإنزيم 60 لا يستهلك  $\text{H}_2\text{O}_2$  إلا في وجود الغلوكوز.

الاستنتاج: العلاقة بين الإنزيم ومدة التفاعل هي النوعية، أي الإنزيم يؤثر على مادة تفاعل واحدة.

### بـ- وساطة


ترتبط جزيئات الإنزيم بالركبنة وخطوا دون أن تتأثر بالتفاعل، أي لا يتغير تركيز جزيئات الإنزيم في مجاورة التفاعل.

### تجربة تظهر أن الإنزيم وسيط لا يستهلك أثناء التفاعل

نستعمل تركيزاً محدوداً من الإنزيم غلوكوز أكسيداز في درجة حرارة ثابته  $(37^\circ\text{C})$  وعند درجة  $\text{pH}$  ثابته (7).

نحقن كمية صغيرة من مادة التفاعل (الغلوكوز) في الزمن ز1، ثم نحقن في ز2 نفس الكمية من الغلوكوز.

النتائج ممثلة في المحنن التالي:



### هي تحليل المنحني

يمثل المحنن تغير تركيز  $\text{H}_2\text{O}_2$  بدلالة الزمن في وجود كمية صغيرة من مادة التفاعل.


بعد الحقن الأول والثاني لنفس الكمية من الغلوكوز، ينخفض تركيز ثاني الأكسجين في الوسط بنفس الكمية.

ستنتهي إنzyme وسيط لا يتأثر (لا يستهلك) أثناء التفاعل.

ملاحظة: في هذه التجربة، لو تأثر الإنزيم بالتفاعل بعد الحقن الأول للغلوكوز لما تناقص الأكسجين بنفس الكمية بعد الحقن الثاني.

### جـ- تأثير بتغير تركيز الركيزة

تأثير مسرعة التفاعل الإنزيمي بتغيير تركيز مادة التفاعل حيث تزداد بزيادة تركيز مادة التفاعل، وتثبت عندما تتشبع كل المواقع الفعالة لجزيئات الإنزيم.





تأثير درجة المحموضة على النشاط الإنزيمي يظهر أن درجة المحموضة تؤثر على النشاط الإنزيمي في درجة حرارة ثابتة (٣٧°C) و عند درجة pH ثابتة (٧). النتائج مماثلة في محلول الوثيقة التالية:

- في الوسط الحمضي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة.
- في الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية سالبة.
- يفقد المفعول الفعال شكله المميز بغير حاليه الأيونية وهذا يعيق تبادل مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.

٢) تجربة تظهر تأثير درجة pH على نشاط الإنزيم

تم إجراء سلسلة من خمسة تجارب، في كل منها استعمل نفس التركيز من الإنزيم ونفس التركيز من مادة التفاعل، وكذلك نفس درجة الحرارة (٣٧°C). ولكن في كل تجربة تغير درجة pH الوسط (٤، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠).



تحليل المنحنى: يمثل المنحنى تغير السرعة الابتدائية (٧٦) للتفاعل الإنزيمي بدلالة تركيز مادة التفاعل (٦)  
من التركيز ١ إلى ٣٠٠: كلما زاد تركيز المركبة زاد استهلاك الماء و زادت السرعة الابتدائية حتى تصل إلى  
٣٤.٨ (ملغ / ل / دقيقة).  
بعد التركيز ٣٠٠: تثبت السرعة الابتدائية في ٣٤.٨ ملغ / ل / دقيقة زاد تركيز مادة التفاعل.  
يسجل تأثير تركيز الإنزيمي محدودة وتثبت عند تركيز معين لمادة التفاعل.

#### د- تأثير بتغير تركيز الإنزيم

ترداد

سرعة التفاعل الإنزيمي بزيادة تركيز جزيئات الإنزيم.

#### ٥. عوامل الوسط المؤثرة على نشاط الإنزيم

يتأثر نشاط الإنزيم بغير درجتي الحرارة والمحموضة.

ينشط الإنزيم في مجال محدد من درجة الحرارة والمحموضة فقط، وخارجه يفقد بنيته الفراغية الوظيفية توجد قيمة ضمن هذا المجال يكون نشاطه عندها أعظمها تسمى الدرجة المثلث.

### النقطة المقدمة

من التحليل

نمثل المعلومات تغيرات تركيز الـ  $E_1$  بدلالة الزمن في وجود الإنزيم 60 وفى درجات pH مختلفة

للاحظ أن سرعة التفاعل الإنزيمي:

- معدومة في وسط  $pH = 4$  (محضه قوية).

- متوسطة في وسط  $pH = 6$  (محضه معتدلة) و  $pH = 8$  (فاسدة معتدلة).

- أقصىها في وسط  $pH = 7$  (محضه معتدلة).

لستنتج أن النشاط الإنزيمي يتغير بدرجة محضه الوسط ويكون أقصىها في درجة  $pH = 7$  = درجة مقدمة

النشاط المقدمة

2- درجة الحرارة

في درجات الحرارة المنخفضة تقل حركة الجزيئات بشكل كبير ويصبح الإنزيم غير نشط.

في درجات الحرارة المرتفعة تحرق البروتينات وتفقد غمايا بينها الفراغية المميزة وبالتالي تفقد در

التحفيز.

عند درجة الحرارة المعتدلة (الثلث) تكون البهبة ثابتة ومستقرة تسمح بالتكامل البيولوجي بين الإنزيم و


التفاعل فيكون نشاط الإنزيم أقصىها.

### تجربة تأثير درجة الحرارة على نشاط الإنزيم

تم إجراء سلسلة من خمسة تجارب، في كل منها استعمل نفس التركيز من الإنزيم ونفس التركيز من ماد

التفاعل، وكذلك نفس درجة  $pH = 7$ ). ولكن في كل تجربة تغير درجة الحرارة (10، 35، 50، 60، 70).

النتائج ممثلة في الرسم التوضيحي:



التحليل

نمثل المعلومات تغيرات تركيز الـ  $E_1$  بدلالة الزمن في وجود الإنزيم 60 وفى درجات حرارة مختلفة

للحظ أن النشاط الإنزيمي:

- معدوم في درجات الحرارة المرتفعة ( $60^{\circ}M$ ,  $70^{\circ}M$ ).

- ضعيفاً في درجة الحرارة المنخفضة قليلا ( $10^{\circ}M$ ) والمرتفعة قليلا ( $50^{\circ}M$ ).

- أقصىها في درجة الحرارة  $35^{\circ}M$ .

لستنتاج أن نشاط الإنزيم يتغير بتغير درجة الحرارة ويكون أقصىها عند درجة حرارة الجسم ( $37^{\circ}M$ ).

الطبعة الثانية

عدد درجة الحرارة 27 و 28  
وهي تشير لوجود 15 درجات اضافية عدم حدوث التفاف

١٢ درجة الحرارة ٣٦°C + ١٢ درجات التفاعل

عدد درجة الحرارة 65 °م و 7 °م  
عدم تشكيل المعدن 15% وبالتالي عدم حدوث التفاعل

٢- نص علمي


الإرئات وسائل حيوية ضرورة تعبير عن شخص وظيفي عال حيث يلعب الموقع الفعال دوراً ذلك، كما يتأثر نشاط الإرئات بعوامل الوسط، فما هو دور الموقع الفعال في التخصص الوظيفي للإرئات وكيف تؤثر عوامل الوسط على نشاطه؟

الموقع الفعال هو جزء صغير من الازتم ين تكون من أحاطض أمينة محددة وراثيا ترتيبا وعدد ا وزن له القدرة على التعرف التوعي على مادة التفاعل ويتم على مستوى التفاعل، كما يتغير بمحظتين: منطقية لتشييد مادة التفاعل: مكونة من أحاطض أمينة محددة تأخذ شكل فراغيا يتكامل بنهاية معان تفاعلا معنة، وهذا ما يك

نقطة تحفيز التفاعل: مكونة من أحاطض أمينة محددة، تغير نوعاً محدداً من التفاعلات دون غيره، وهذا يكتب الإzym خصصاً نوعياً بالنسبة لنوع التفاعل.

التفسير

للعب الأزيمات دورا أساسيا في التفاعلات الكيميائية الناتجة لمحاذيف التفاعلات الأيونية الحيوية المحلية من عدم وبناء، ولإظهار العلاقة الموجودة بين الأزيم ومادة التفاعل تفترض الوثيقة التالية التي توسيع عمل الأزيمات.



- ١- قدم مفهوماً للإنزيم، ثم تعرف على العناصر ١ و ٢ مع تحديد دور كل عنصر.

٢- من خلال ما توضّحه الوثيقة ومعلوماتك، لخص في نص علمي العلاقة الموجودة بين الإنزيم ومادة التفاعل مبرزاً مفهوم المحفز الحيوي النوعي وخصائص الإنزيم التي أدت إلى تشكيل التوازن.

الإجابة النموذجية

میراث اسلامی

وسيط حيوي ذو طبيعة بروتئينية يسرع التفاعل له تأثير نوعي اتجاه الركيزة واتجاه التفاعل لا يستهلك أثناة  
تفاعل ولا يتأثر به، يتأثر بمجموعة من العوامل الخارجية من pH ودرجة الحرارة.

- ١- رابطة التقابلية: ثبيت مادة التفاعل.
  - ٢- حمض أسيبي: الوحدة البنائية للبروتين يساهم على مستوى الموقع الفعال في تشكيل الروابط الاتقابلية مع مادة التفاعل، وذلك لثبيت مادة التفاعل.

## السلسلة المفهمة

الإzymات وسائل حيوية ذات طبيعة بروتئينية، سميت بالمحفزات الحيوية لأنها تسرع التفاعلات الكيميائية.

ما هي العلاقة بين الإنزيم والركبنة والتي تسمح بتحويل الإنزيم إلى ناتج؟

يعتمد نشاط الإنزيم على البنية الفراغية والتي يحددها تابع لعدد ونوع وترتيب معين من الأحماض الأمينية.

تحت مراقبة المورثة، حيث تخدي الإنزيمات على حيز صغير يدعى الموقع الفعال يسمح بارتباط الإنزيم.

بالإنزيم وفق التكامل البيولوجي الفراغي بينها فتشترك مجموعة الأحماض الأمينية الخاصة بالتعرف.

العلبة، حيث تتوضع المجموعات الكيميائية للركبنة في المكان المناسب لتوضع المجموعات الكيميائية.

للهبات جذور الأحماض الأمينية المتواجدة في الموقع الفعال للإنزيم، يسمى هذا بالتأثير النوعي له.

انباء الإنزيم (نظير الففل والمفتاح). إلا أنه توجد بعض الإنزيمات والتي لها خاصية تغير الشكل الفراغي لموقعها الفعال عند اقتراب الركيزة منها والعرض من ذلك الوصول إلى التكامل البيولوجي له.

تسمى هذه الظاهرة بالتكامل المفتر.

**الوحدة 03: دور البروتينات في التحفيز الإنزيمي**

الإنزيمات وسائل حيوية ذات طبيعة بروتئينية، سميت بالمحفزات الحيوية لأنها تسرع التفاعلات الكيميائية.

ما هي العلاقة بين الإنزيم والركبنة والتي تسمح بتحويل الإنزيم إلى ناتج؟

يعتمد نشاط الإنزيم على البنية الفراغية والتي يحددها تابع لعدد ونوع وترتيب معين من الأحماض الأمينية.

تحت مراقبة المورثة، حيث تخدي الإنزيمات على حيز صغير يدعى الموقع الفعال يسمح بارتباط الإنزيم.

بالإنزيم وفق التكامل البيولوجي الفراغي بينها فتشترك مجموعة الأحماض الأمينية الخاصة بالتعرف.

العلبة، حيث تتوضع المجموعات الكيميائية للركبنة في المكان المناسب لتوضع المجموعات الكيميائية.

للهبات جذور الأحماض الأمينية المتواجدة في الموقع الفعال للإنزيم، يسمى هذا بالتأثير النوعي له.

انباء الإنزيم (نظير الففل والمفتاح). إلا أنه توجد بعض الإنزيمات والتي لها خاصية تغير الشكل الفراغي لموقعها الفعال عند اقتراب الركيزة منها والعرض من ذلك الوصول إلى التكامل البيولوجي له.

أما مجموعة الأحماض الأمينية الخاصة بالتحفيز فتفاعل مع الركيزة من أجل تحويلها إلى ناتج (ناتج التحفيز، تركيب، فسفرة، تماكب، نوع هيدروجين...).

مثلاً الموقعاً الفعال للإنزيم تعطي للإنزيم تخصيصاً مزدوجاً فموقع التعرف يعطى للإنزيم التأثير النوعي وهو التحفيز بمقدار نوع التفاعل وبالتالي يحدد طبيعة الناتج.

يتأثر نشاط الإنزيم بأي تغير يطرأ على البنية الفراغية للموقع الفعال حيث استقرار هذا الحيز الصغير تؤدي روابط استقرار، فائي تخرب لها يؤدي بالضرورة إلى فقدان البنية الفراغية وبالتالي فقدان الوظيفة.

حدث التحفيز الإنزيمي الموضح في الوثيقة يستوجب وجود علاقة بيولوجية تتمثل في التكامل البيولوجي الفراغي بين الركيزة والموقع الفعال للإنزيم وعلى حسب التركيب الكيميائي للموقع الفعال للإنزيم من حيث الأحماض الأمينية يحدث تفاعل من نوع معين كمثال تركيز النشاء وتأثير الإنزيم وبنائه بعدة عوامل.

## نهاية عن التصرين الثاني

### 01 التصرير

ترتكز خاصية التأثير النوعي المزدوج للإنزيم على تشكيل المعقد "إنزيم - مادة التفاعل" تنشأ أثناء حدوث روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الإنزيم تدعى الموقع الفعال.


لفهم كيف استغل المخبراء هذه الخاصية في إنتاج دواء ناجع (فعال) مع أعراض جانبية محدودة تفتح دراسة التالية:

#### الجزء الأول

ممثل الشكل (أ) من الوثيقة (01) مخطط يوضح نشاط كل من الإنزيم COX-1 وإنزيم COX-2، بينما بين جدول الشكل (ب) من نفس الوثيقة تركيز الدواء إيبوبروفان اللازم لخفض نشاط الإنزيمين السابفين إلى 50 % ويعبر عن هذا التركيز  $\text{IC}_{50}$ .

انطلاقاً من الشكل (أ) من الوثيقة (02) على:

- تأثير الإنزيمين COX-1 وCOX-2 على نفس الركيزة.
- تأثير الإيبوبروفان على نفس الإنزيمين.
- فسر منحنى الشكل (ب) من الوثيقة (02).
- النتيجة حلاً به: كمية تخفيف الأعراض. الحانسة للأدوية التي تستهدف النشاط الإنزيمي.



حلل مخطط الشكل (أ) من الوثيقة (01).


- حلل مخطط الشكل (أ) من الوثيقة (01).

ووضح دور الدواء إيبوبروفان مثراً أعراضه الجانبية باستعمال ثلاث معطيات الوثيقة (01).

- وضح دور الدواء إيبوبروفان مثراً أعراضه الجانبية باستعمال ثلاث معطيات الوثيقة (01).

**الجزء الثاني**

ممثل الشكل (أ) من الوثيقة (02) رسومات تخطيطية للموقع الفعال للإنزيمين COX-1 وCOX-2 في وجود تركيز ملحوظ للأيشيدونيك كركبنة (5) ودواءين مختلفين (إيبوبروفان وسلكوكرب). بينما يوضح الشكل (ب) تغيرات النشاط الإنزيمي بدلالات تركيز الدواء سلكوكرب.



- انطلاقاً من الشكل (أ) من الوثيقة (02) على:
- تأثير الإنزيمين COX-1 وCOX-2 على نفس الركيزة.
  - تأثير الإيبوبروفان على نفس الإنزيمين.
  - فسر منحنى الشكل (ب) من الوثيقة (02).
  - النتيجة حلاً به: كمية تخفيف الأعراض. الحانسة للأدوية التي تستهدف النشاط الإنزيمي.

## الإجابة المودجية

## الجزء الأول

1- تحويل يمثل الشكل (أ) بخططاً يوضح نشاط الإنزيم  $\text{Cox-1}$  و  $\text{Cox-2}$ .

يتفاعل كل من الإنزيمين مع نفس الركيزة حمض الأراثيدونيك بحيث:

- يحفر الإنزيم  $\text{Cox-1}$  تفاعل تحويل حمض الأراثيدونيك إلى برستاغلوكولين من النسق الأول (Pg1).

- يحفر الإنزيم  $\text{Cox-2}$  تفاعل تحويل حمض الأراثيدونيك إلى ناتج آخر وهو برستاغلوكولين من الس

الثاني (Pg2) الذي يسبب مظاهر الالتهاب.

نستنتج أن الإنزيم يغير بخصوصه نحو نوع التفاعل.

## 2- توضيح

- بين الشكل (أ) أن Pg1 الناتج عن تفاعل  $\text{Cox-1}$  يحفر على إفراز المخاط الذي يحمي الجدار الداخلي للمعدة.

وأن Pg2 الناتج عن تفاعل  $\text{Cox-2}$  يسبب مظاهر الالتهاب.

- بين الشكل (ب) أن 9 ميكرو مول لـ آل من الدواء الإيبوبروفان يخفض نشاط الإنزيم  $\text{Cox-1}$  إلى 9%، وأن 10 ميكرو مول لـ آل منه يخفض نشاط الإنزيم  $\text{Cox-2}$  إلى 50% كذلك.

إذن، دور الدواء الإيبوبروفان هو التخفيف من درجة الحرارة وتسكن الألم (خفيف مظاهر الالتهاب).

وأعراضه الجانبية: قد يسبب آلام بالمعدة أو القرحة للمعدة لأنه يخفض من إفراز المخاط الذي يحمي الجدار الداخلي للمعدة خاصة من الحموضة الزائدة.

## الجزء الثاني

## 1- تحويل

تعديل تأثير الإنزيمين على نفس الركيزة: لأن موقعهما الفعال مشابهة وتكامل بينها مع نفس الركيزة بحيث:

- موقع التثبيت للإنزيمين متشابه يتركب من جب كارب للماء وأرجينين 120.

1- وفالين عند  $\text{Cox-2}$  تعديل تأثير الإيبوبروفان على نفس الإنزيمين: لأن بيته ماثلة (ركيزة الإنزيمين (وجود تكامل بيني) فترتبط

بموقع الفعال (موقع التثبيت) ويسع حدوث التفاعل لكلا الإنزيمين.

## 2- تفسير

في وجود تركيز متزايد للدواء سكلوكرب:

- تقر التناقص الطبيعي لنشاط الإنزيم  $\text{Cox-1}$  بضعف ارتباط هذا الدواء مع الموقع الفعال لهذا الإنزيم.

- تقر التناقص السريع لنشاط الإنزيم  $\text{Cox-2}$  بقوة ارتباط الدواء سكلوكرب بالموقع الفعال لوجود تكامل

بيني مثل (ركيزة الطبيعية، فيمنع ارتباط الركيزة بالإنسيم وبتوقف التفاعل).

الوحدة 10 دور البروتينات في التحليل الإئتي

3- مقتراح حل

- أن تكون الأدوية مستهدفة لنشاط إنزيم ما ولا تؤثر على نشاط إنزيم آخر.
- تأول الدواء بمقدمة محددة كافية لتفصيل الآثار السلبية للإنزيم.

كم التعبير 02


يكتب العديد من الدراسات أن النشاط الإنزيتي يتطلب بيئة فريائية خاصة به تسمى بـ *بيئة كل اختلاف* في بيئة الإنزيمات يؤدي حسماً إلى اختلاف في وظائفها؟

الجزء الأول

آخر فريق من الباحثين دراسة تجريبية حول الإنزيم غالوكوز أكسيداز (60) ضد الماء أسرجلوس والماء



إنزيم غالوكوز أكسيداز (60)		الأسرجلوس	الماء
السيروم	587	581	عدد الأحماض الأمينية
25	26	عدد البيات الثانية $\alpha$	
24	71	عدد البيات الثانية $\beta$	
Cys <sub>114</sub> - Cys <sub>204</sub>	(y514 - y5204)	جسر ثانوي الكربون	
Arg <sub>512</sub> , His <sub>516</sub> , His <sub>559</sub> , Asp <sub>424</sub>		الأحماض الأمينية للموقع الفعال	
الشكل (أ)			



الشكل (ب)

الوحدة 01

السلسلة الفرعية  
1- استخرج الخطوات العملية المتبعة التي تسمح بحل المشكلة المطروحة انطلاقاً من معطيات الوثيقة (01).

2- قارن بين الخصائص البيئية للإنزيم GO عند الفطريين.


### الجزء الثاني

في دراسة مكثفة، تم قياس النشاط الإنزيمي للغلوكوز أكسيداز بعد إحداث طفرات على مستوى ADN (الجين) في السلسلة الفرعية، وذلك مقارنة بالنشاط الإنزيمي للسلسلة الطبيعية في الشروط الملازمة (Vmax = 6 μM). النتائج المتحصل عليها في كل حالة ممثلة في الشكل (1) من الوثيقة (02).

بياناً يمثل الشكل (2) من الوثيقة (02) بيئة الموقعا الفعال للإنزيم GO الطبيعي عند الفطريين.

رقم التجربة	الأحماض الأمينية للإنزيم GO		
	عند Penicillium Aspergillus	عند (سلالة طبيعية) عند Vmax الإنزيمي	نتائج الاستبدال عند السلالات الطافرة
1	بدون طفرة	% 100	بدون طفرة
2	Tyr68	% 32	Phe
3	Asp424	% 7.2	Ala
4	His516	% 1.1	Ala
5	Arg512	% 3.5	Gln
6	Asn514	% 58.2	Thr

الشكل (1)



الشكل (2)

الوثيقة (2)

1- فسر النتائج التجريبية الحصول عليها باستعمال معطيات الوثيقة (02) ومن معلوماتك.

2- قدم إجابة ملخصة للمشكلة العلمية المطروحة في بداية التعرّف انطلاقاً مما توصلت إليه في هذه الدراسة.

ممثل الشكل (1) بعض الخصائص البيئية للإنزيم GO عند الفطريين تم الحصول عليها بواسطة مبرمج

ممثل الشكل (2) تسلسل الأحماض الأمينية في السلسلة البيئية للإنزيم GO عند كل فطر

أيضاً من مبرمج أناجان.

أوجه الشبه:

- يترك الإنزيم GO من سلسلة بيئية واحدة فهو ذو بنية ثالثة.

- يحتوي على حسر واحد ثالثي الكربون.

- يترك الموقعا الفعال من أربعة أحاسيس أمينية من نفس النوع: Arg, His, His, Asp.

أوجه الاختلاف:

- عدد الأحماض الأمينية.

- عدد البيئات الثانوية α و β.

- موضع الجسر ثالثي الكربون.

- موضع الأحماض الأمينية المشكّلة للموقعا الفعال.

تستنتج أن تشابه الإنزيم GO عند الفطريين في عدد ونوع الأحماض الأمينية المكونة للموقعا الفعال سمح له القيام بنفس الوظيفة (تحفيز نفس التفاعل).

### الجزء الثاني

#### 1- التفسير

التجربة 1: في غياب الطفرة %  $V_{max} = 100$ ، في هذه الحالة البنية الفراغية للإنزيم طبيعية ومستقرة،

يحدث تكامل بنبوبي بين الإنزيم ومادة التفاعل حيث تكون الوظائف الكيميائية في السلسلة الجانبيّة في

بعضها المناسب للتأثير على مادة التفاعل، فيما تحفيز التفاعل بشكل طبيعي وتحويل مادة التفاعل إلى

نتائج، تكون سرعة النشاط الإنزيمي أعظمية.

### السلسلة الفضية

**التجربتين 2 و 6:** في التجربة 2 حدوث طفرة أدى إلى استبدال الحمض الأميني  $\text{Ph}_2\text{O}\text{ Tyr}$  بال  $\text{ASN}$  نشاط إنزيمي ضعيف (32%)، وفي التجربة 6 حدوث طفرة أدى إلى استبدال الحمض الأميني  $\text{Tyr}$  بال  $\text{Asn}$  بالحمض الأميني  $\text{Thr}$  ونفع عنه نشاط إنزيمي متوسط (58.2%)، يفسر ذلك بان الطفرة في التجربتين حدثت على مستوى أحاضن لا تنتهي للموقع الفعال لهذا بقى الإنزيم نشطاً. ولكن نشاطه أقل لأن تغير بيته نتيجة الطفرة يؤثر على بنية الموضع الفعال كذلك (يشكل غير مباشر) فيقل تكامله مع مادة التفاعل وارتباطها به ويقل نشاطه.

**التجارب 3، 4 و 5:** حدوث طفرة أدى إلى استبدال  $\text{Asp}$  بال  $\text{Ala}$  في التجربة (3)، استبدال  $\text{Asp}$  بال  $\text{Alo}$  في التجربة (4)، واستبدال  $\text{Arg}$  بال  $\text{Gln}$  في التجربة (5)، ونفع عنه نشاط إنزيمي ضعيف جل  $\text{Gln}$  بال  $\text{Alo}$  في التجربة (4) في التجارب الثلاث على الترتيب. يفسر ذلك بحدوث هذه الطفرات أحدن  $1.1\%, 3.5\%, 7.2\%$  في التجارب الثلاث على الترتيب، إما على مستوى موقع الشبيت فيتم عرق تغييراً على مستوى الموضع الفعال المسؤول عن تحفيز التفاعل، إما على مستوى موقع الشبيت فيتم عرق تبييت الركيزة أو على مستوى موقع التحفيز فلا يتم تحويل الركيزة إلى ناتج.

**2- إجابة ملخصة**  
الاختلاف في بنية الإنزيمات يؤدي إلى اختلاف في وظائفها، ولكن يمكن لإنزيمين مختلفين في البنية يؤديا نفس الوظيفة إذا كانا متشارعين في عدد ونوع الأحماض الأمينية المشكلة للموضع الفعال.

بـ التعبير 03

تضمن جملة من الإنزيمات عملية هضم الأغذية في الأليوب المضعي وتفصيل نواتج هذه العملية على مستوى المعي الدقيق لتنتقل إلى الخلايا.  
قد يحدث خلال عملية الهضم عدة مشاكل من بينها حالة عدم تحمل اللاكتوز (*Intolérance au lactose*)  
- لتحديد التحولات التي تطرأ على اللاكتوز عند الشخص المصاب بهذه الحالة مقارنة بالشخص التي وسبب عدم تحمل اللاكتوز، نقترح الدراسة التالية.

### الجزء الأول

لتحديد دور إنزيم اللاكتاز وبعض خصائص نشاطه، تخري سلسلة من التجارب.

**التجربة الأولى:** ترغب في بيان دور بعض العوامل المؤثرة على نشاط إنزيم اللاكتاز ولذلك تم في

السرعة الابتدائية لنشاط هذا الإنزيم في شروط مختلفة أعطت النتائج الموضحة في الوثيقة (01).

درجة الحرارة (°)	السرعة الابتدائية VI (و !)	السرعة الابتدائية VII (و !)
4	00	00
8.5	5	10
10	20	20
10.5	16	37
12	4	42
		48
		0.5

1- الجزء منعى تغير السرعة الابتدائية بدلالة درجة  $\text{pH}$  الوسط مفسراً تأثيرها على النشاط الإنزيمي من خلال النتائج التجريبية، استنتاج تأثير درجة الحرارة على النشاط الإنزيمي.

**تجربة الثانية:** تتمثل الوثيقة (02): التفاعل الذي يحفزه الإنزيم لاكتاز، الشروط التجريبية والنتائج

التجربة		الشروط التجريبية في وجود اللاكتوز بتركيز 1 مل مولال	الإكاز	جلوكوز	الكتوز	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
مدة التفاعل	٣ دق	في 37 °م و غبار أي وسيط	١			
عدد الإنزيم	٦٠	في 100 °م في وسط حامضي (pH = 4)	٢			
دورة	٦٠	في 37 °م + اللاكتوز بتركيز 1 مل مولال في وسط ذو pH يساوي 10	٣			
مدة التفاعل	٣ دق	في 37 °م + اللاكتوز بتركيز 1 مل مولال في وسط ذو pH يساوي 4	٤			
		في 37 °م + اللاكتوز بتركيز 1 مل مولال + البيولاكتوز بتركيز 1 مل مولال في وسط ذو pH يساوي 10	٥			


ملاحظة: البيولاكتوز مادة ذات صيغة عامة قوية جداً من صيغة اللاكتوز  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6\text{S}$

الوثيقة (2)


١- تزداد العلاقة بين الجزيئات المتواجدة في الوسط (3) والوسط (5) لتشتت النتائج الحصول عليها في كل وسط ثم ضع مفهوماً دقيقاً للإنزيم.

### الجزء الثاني

تظهر على شخص يعني من عدم تحمل اللاكتوز أعراض تتمثل في انتفاخ وألم في البطن، غازات واسهال.  
لتحديد مصدر هذه الأعراض وعلاقتها بحمض اللاكتوز ودور اللاكتاز في ذلك تقدم الوثيقة (03):



الشكل 1



الشكل 2

نوع الميكروبا	غير من الأليوب
النوع الثاني	$10^1$ إلى $10^2$
النوع الثالث	$10^{11}$ إلى $10^{12}$

نتائج معالجة ملائمة ملائمة رقيقة من جدار البطن  
التحقق بأقسام مختلفة خاصة باللاكتوز  
مرادف بجزيئات مختلفة  
لكل النطاق السوداء الإيجابي  
13- عند الشخص المصابة  
3- عند الشخص السليم

الشكل 3

الوثيقة (3)

103

١٠٥


## السلسلة الفضية

بالاعتماد على أشكال الوثيقة (٠٣) وباستدلال منطقي:

- اشرح سبب ظهور أعراض عدم تحمل اللاكتوز عند الشخص المصاب وعدم ظهورها عند الشخص السليم رغم حدوث هضم اللاكتوز عند الشخصين.

## الإجابة النموذجية

### الجزء الأول التجربة الأولى ١- المنهجي



**مفهوم الإنزيم**  
جريء، بروتئي يعمل كوسسيط حيوي في تغيير نوع معين من التفاعلات الأيضية مع مادة تفاعل معينة،

### الجزء الثاني الشرح باستدلال منطقي من الوثيقة (٠٣)

الشكل (١): يبين أن البكتيريا تفرز إنزيم اللاكتاز المسؤول عن إماهة اللاكتوز بفتح عنه غلوكوز وغلاكتوز، بدل في شرط محددة من درجة  $\text{pH}$  والحرارة.

الشكل (٢): يبين أن عدد البكتيريا في المعي الدقيق قليل مقارنة بعدها في المعي الغليظ.

الشكل (٣): يبين أن ظهور الإشعاع في مقطع جدار المعي الدقيق للشخص سليم يدل على إفراز

للاكتاز، عكس الشخص المصاب حيث يتبيّن غياب الإشعاع وعدم إنتاج اللاكتاز.

إنـهـ عـدـدـ الشـخـصـ الـسـلـيمـ: يـتـوـفـرـ فـيـ المـعـيـ الدـقـيقـ لـلـشـخـصـ السـلـيمـ إنـزـيمـ الـلاـكتـازـ الـذـيـ يـحـفـزـ تـفـاعـلـ

الـبـيـوـيـ بـيـنـ الـإـزـيمـ (ـمـوـقـعـ فـعـالـ)ـ وـمـادـةـ التـفـاعـلـ تـدـعـىـ درـجـةـ  $\text{pH}$ ـ الـثـالـثـ لـعـلـ إنـزـيمـ يـكـونـ نـشـاطـ الإـزـيمـ

فـيـ أـوـجـهـ.ـ

### ٢- الاستنتاج


يتأثر نشاط الإنزيم بدرجة الحرارة ويكون أعظمها عند درجة مثل (37 م°).

غير ضعيفة.

وعند الشخص المصاب: لا يتوفّر المعي الدقيق للشخص السليم على إنزيم اللاكتاز الذي يحفّز تفاعل

تحلّل اللاكتوز إلى جلوكوز وغلاكتوز، فلا يتم هضم اللاكتوز في المعي الدقيق ويتخلّل مع الأغذية إلى

السرعة الإبتدائية  
(٧٤)



### التفسير

تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجاذبية الحرّة للأحماض الأمينية في السلام البتيدية وبالخصوص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال بحيث:

- في الوسط الحمضي تصبح الشحنة الكهربائية الإيجابية موجبة.

- في الوسط القاعدي تصبح الشحنة الكهربائية الإيجابية سالبة.

يفقد الموقع الفعال شكله المميز بتغيير حالته الأيونية وهذا يعيق ثبات مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل.

- في الوسط حيث  $\text{pH} = \text{pHi}$  تصبح الشحنة معدومة وتكون البنية ثابتة ومستقرة تسمح بالتكامل البنوي بين الإنزيم (موقع فعال) ومادة التفاعل تدعى درجة  $\text{pH}$  المثلثي لعمل الإنزيم يكون نشاط الإنزيم فيه في أوجه.

النهاية  
للمعنى المحيط حيث تقوم البكتيريا بإفراز إنزيم الألاكتوز الذي يُحفّز تفاعل تفكك الألاكتوز

وتحل محله، ثم تقوم بعملية التحمر التي للسكريات الناتجة ويتبخر عنها حمض اللبن. بعد ذلك يتم تحضير اللبن إلى الميزان ( $\text{CH}_3\text{OH}$ ) وحمض البروتوبيك، البيوتوربيك، البروبونيك، الأستيك وغازات. تسرير المركبات الناتجة أعراض مرض عدم تحمل الألاكتوز.

#### بر التعبير 04

توقف العلاقة بين الإنزيم وخصائصه الوظيفي على بنية الفراغية، ولتوسيع ذلك نقترح عليك الدراسات التالية.

#### الجزء الأول

تقبل الوثيقة (01) معطيات حول إنزيمين هما:  $\alpha$ -أميلاز والماناز.

#### المعطيات العددية

إنزيم	أرقام الأحماض الأمينية المشكّلة للموقع الفعال	عدد الأحماض الأمينية	الوثيقة (01)
$\alpha$ -أميلاز	511	58 . 59 . 62 . 63 . 151 . 197 . 233 . 300 . 305	1279 . 1355 . 1418 . 1427 . 1526 . 1560 . 1584
الماناز	1857		

#### الجزء الثاني

من جهة أخرى، مكتتب قياسات سرعة النشاط الإنزيمي (V) لكل من البيسين والتربيسين وإنزيم أستيل كولين استيراز في أوساط مختلفة  $\text{pH}$  من الحصول على الشكل (أ) من الوثيقة (02).

- ما هي المعلومات التي يمكن استخلاصها من المعطيات العددية الواردة في الجدول؟
- إذا طرأ تغير على الأميلاز في الحمض الأميني رقم 58 فإن ذلك يؤدي إلى ضعف النشاط الإنزيمي. قسّر ذلك.

#### الإجابة النموذجية

##### الجزء الأول

###### العلومات المستخلصة

- يختلف الإنزيمات من حيث عدد الأحماض الأمينية المشكّلة لها.
- يكون المواقع الفعالة من عدد قليل ومحدد من الأحماض الأمينية.
- يختلف عدد الأحماض الأمينية المشكّلة للموقع الفعال من إنزيم إلى آخر.
- يكون المواقع الفعالة غالباً من أحماض أمينية ذات مواضع متباينة في البنية الأولية، بينما تكون متقاربة نسبياً نتيجة الانطواء والالتقاف.



- التفسير
 

يشكل نوع الحمض الأميني رقم 58 يتبع عنه تغير سلسلة جانبية نشطة من المواقع الفعال، فيصبح الإنزيم غير متكامل بيوجياً مع الركيزة، مما يضعف الارتباط بين الإنزيم مع الإنزيم فيقبل تشكيل المعقد ES، فيضعف النشاط الإنزيمي.

##### الجزء الثاني

###### تحليل المقارن

- الوثيقة (02) تغير سرعة النشاط الإنزيمي لإنزيمات مختلفة بدلالة  $\text{pH}$ .  
غير الوثيقة (02) أن معظم الإنزيمات تنشط في مجالات محدودة: البيسين في  $\text{pH}$  أقل من 6، التربسين  $\text{pH} = 5$  إلى 14 وإنزيل كولين استيراز من 5  $\text{pH} = 4$  إلى 11  $\text{pH} = 11$  وإنزيل كولين استيراز من 5  $\text{pH} = 5$  إلى 14.  
لكن إنزيم درجة حموضة مثلثي يكون نشاطه عندها أعظمياً.  
إنزيم أستيل كولين استيراز يشكل حالة استثنائية لكونه لا يملك درجة حموضة مثلثي فقط بل مجال واسع  $\text{pH}$  تكون فيه سرعة نشاطه أعظمية.



1- أجرِ تحليلاً مقارناً لنتائج الشكل (أ) من الوثيقة (02).


106

١٧- سنت

**النهاية**

ب

جـ ترجمة المفاهيم الى ديد نميري



الدرس 05

تُوَلِّنَتْ أَعْلَمَةً مُدَرِّجَاتْ وَمُعْصَمَةً الْوَظِيفَةِ عَلَى بَهْرَةِ الْفَرَاغَةِ، وَتُوَسِّعَ دَلْكَ تَقْرَبَ عَلَيْكَ الدِّرَاسَاتِ.

العدد السادس

تم فحص الموكب خلال المرحلة الأولى من التحلل الكري بفضل الإزيم عبكتوكاز على مستوى الكبد، والملايا ( $\beta$ ) من الكرباميل والإزيم هيكروكيناز على مستوى الخلايا العضلية. وذلك في وجود عزمه ATP

أ- يمثل الشكل (١) من (النقطة ٠١) أعلاه عمل (الزوج المكون) الذي يغير تفاصيله  
مدعماً بحالة تفاصيل (حالة تفاصيل). تم حدد عن التفاصيل الذي يغيره هذا الزوج معملاً (حالة تفاصيل).

١١) معللاً إعانتك .

میرے انتخیب

ـ در دراسة حفاظ التحصص الوضعي للارتفاع شعور بوضع (فرم) متوسّط أكبر مع العوكم أو المركب  
ـ يلاهز معاً وكذلك مع مجموعات المؤشرات المشعة، ثم بعد ذلك مع (فرم) متوسّط أكبر ثم  
ـ أكبر بكثير. بعد ذلك رلاحظ مسيرة السكريات الداسية (العوكم أو المركب) أو كلاهما معاً  
ـ معاً مترافقاً. التالع مدوّنة في جدول الونيفة (١٢).

### السلسلة الفعلية

الوحدة 03 دور البروتينات في التحفيز الإنزيمي

التحليل: يتم على مستوى تثبيت جزيء الغلوكوز عن طريق تسعه (9) روابط هيدروجينية مؤقتة تنشأ بينها وبين إحدى الجابين للأحماض الأمينية التالية: ثريونين (Thr 168)، لизين (Lys 169)، أسياراتين (Asn 204) وحمض الغلوتاميك (Glu 256).

- وظيفة الموضع B: موقع تحفيز فسفرة جزيء الغلوكوز بتدخل الحمض الأميني حمض الأسبارتات (Asp 205).  
التحليل: يتم على مستوى تثبيت تفعيل حمض الأسبارتات (Asp) وظيفة الموضع B: موقع تحفيز التفاعل.

### الجزء الثاني

#### 1- التفسير

الإنزيم غلوكوكيناز: ظهور غلوكوز موسوم في نهاية التفاعل دليل على فسفرته بإضافة إليه فوسفات (Pi).  
موسومة بتحفيز الإنزيم غلوكوكيناز (تجربتين 1 و3). في حين لم تتم فسفرة الفركتوز (تجربتين 2 و4).

الإنزيم هيكسوكيناز: ظهور غلوكوز وفركتوز موسومين في نهاية التفاعل دليل على فسفرتهما بإضافة إليهما مجموعة فوسفات (Pi) موسومة لعدم قيام الإنزيم غلوكوز أكسيداز بتحفيز الفسفرة (تجربتين 7 و8).

١-٢. خصائص التخصص الوظيفي للإنزيم  
مقارنة تتابع التجربة (1) مع التجربة (2)

في التجربة (1) التي تم فيها وضع الغلوكوكيناز مع الغلوكوز، تتجزئ في نهاية التفاعل غلوكوزاً مشعاً دليلاً على نسخة بواسطة الإنزيم. بينما في التجربة (2) التي تم فيها وضع نفس الإنزيم مع الفركتوز، فإنه تتجزئ في نهاية التفاعل فركتوزاً غير مشعاً دليلاً على عدم فسفرته.  
تستنتج أن الإنزيم يديّ تخصصاً وظيفياً نوعياً اتجاه الركيزة. فالإنزيم غلوكوكيناز خاص بجزيء الغلوكوز.

#### مقارنة تتابع التجربة (1) مع (7)

في التجربة (1) التي تم فيها وضع الغلوكوكيناز مع الغلوكوز، تتجزئ في نهاية التفاعل غلوكوزاً مشعاً دليلاً على نسخة بواسطة الإنزيم. بينما في التجربة (7) التي تم فيها وضع الغلوكوز مع إنزيم آخر (غلوكوز أكسيداز) تتجزئ بواسطة الإنزيم. بينما تجذب كل من الغلوكوز والفركتوز غير مشعين، دليلاً على أن الإنزيم لم يتم بفسرتهما.  
تستنتج أن الإنزيم يديّ تخصصاً وظيفياً نوعياً اتجاه نوع التفاعل. فالإنزيم غلوكوكيناز وهيكسوكيناز يخزان تفاعل فسفرة بينما الإنزيم غلوكوز أكسيداز فيحفز نوع تفاعل آخر من التفاعل (أكسدة).

### نماذج عن التمارين الثالث

#### بـ التمارين 01

نوع الأحماض الأمينية الدالة في تركيب الموضع الفعال الخاص بالغلوکوز هي: ثريونين (Thr 168)، ليزين (Lys 169)، أسياراتين (Asn 204)، حمض الأسبارتات (Asp 205) وحمض الغلوتاميك (Glu 256).  
بـ الاستنتاج:  
- وظيفة الموضع A: موقع تثبيت الركيزة.  
عند بعض الأشخاص حساسية مفرطة للأشعة فوق البنفسجية (UV) التي توجد ضمن أشعة الشمس، حيث تظهر على جلودهم بقع سوداء قد تتطور إلى سرطان جلدي ويعرف هذا المرض بخفاف الجلد.

الناتج	التجربة	مادة التفاعل	الغلوكوز في نهاية التفاعل	التجربة
الإنزيم	1	غلوكوز	مشع	الإنزيم
غلوكوكيناز	2	فركتوز	غير مشع	غلوکوكيناز
	3	غلوكوز + فركتوز	مشع	
	4	غلوكوز	مشع	
هيكسوكيناز	5	فركتوز	مشع	
	6	غلوكوز + فركتوز	مشع	
	7	غلوكوز	غير مشع	غلوکوز أكسيداز
	8	فركتوز	غير مشع	غلوکوز أكسيداز

الوثيقة (02)

١- فسر الناتج الحصول عليها عند كل إنزيم، ثم استخرج خصائص التخصص الوظيفي للإنزيم من خلال مقارنة نتائج التجربة (1) مع (2) و(1) مع (7).


#### ٢- تظهر التجارب خاصية ثير الإنزيم هيكسوكيناز، استنتجها.

### الإجابة النموذجية

#### الجزء الأول

##### ١- الشرح

يحفز الإنزيم هيكسوكيناز تفاعلاً ثانياً يتمثل في تحويل الغلوكوز إلى غلوكوز 6 فوسفات، وجزيء ATP.  
نظراً لاحواله على موقعين فعالين نوعين الأول خاص بجزيء الغلوكوز والثاني خاص بجزيء ATP.  
المعادلة الإجمالية للتفاعل:



##### نوع التفاعل:

تفاعل تحويل (فسفرة).

التجربة: تم تحويل الغلوكوز إلى غلوكوز 6 فوسفات عن طريق تثبيت مجموعة فوسفات (Pi) على جزيء الغلوكوز.

#### ٢- استخراج الأحماض الأمينية:

الأحماض الأمينية الدالة في تركيب الموضع الفعال الخاص بالغلوکوز هي: ثريونين (Thr 168)، ليزين (Lys 169)، أسياراتين (Asn 204)، حمض الأسبارتات (Asp 205) وحمض الغلوتاميك (Glu 256).

#### ٣- الاستنتاج:

عند بعض الأشخاص حساسية مفرطة للأشعة فوق البنفسجية (UV) التي توجد ضمن أشعة الشمس،

حيث تظهر على جلودهم بقع سوداء قد تتطور إلى سرطان جلدي ويعرف هذا المرض بخفاف الجلد.

١١٠

## علوم الطبيعة والحياة من الأسر

لعرض التعرف على سبب هذا المرض الروابي الخطير والنادر، نقدم المعطيات التالية:

**نصل الوثيقة 1:** يمثل معطيات عامة حول هذه الإصابة، أمّا جدول نفس الوثيقة فيمثل جزء من السلسلة غير الناتجة والجزء المواتق لها من تناول الأحماض الأمينية لدى شخص مريض.


النص: أثناء تضاعف الـ ADN اللازم لقسام خلايا العضوية، قد تطرأ بعض الأخطاء، وذلك باستبدال أو حذف أو تعويض نكليوتيد بأخر أو تشكيل روابط غير مرغوبة بين بعض النكليوتيدات فيها. غير أنه يوجد في نواة الخلية إzymات تصحح هذه الأخطاء، ومن بينها إنزيم XPA الذي يتشكل من 215 حمض أمينياً.

**الوحدة 03 دور البروتينات في التحفيز الإبرمي**

السلسلة المفه

تعرض خلايا جلدية من شخص سليم وأخر من شخص مريض بجفاف الجلد للأشعة فوق البنفسجية (UV) التي تسبب في ظهور ثانيات الثامين (Thymine) المتضمنة في نفس سلسلة الـ ADN.

في الزمن زه توقيع تعریض هذه الخلايا للأشعة (UV)، النتائج الحصول عليها مبينة في الشكل (أ) من الوثيقة (02) بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيوضح آلية عمل إنزيم XPA.



	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
مختبر																
معطر																
ADN																
XPA																
بروتين																
مختبر مريض																
71																
72																
73																
74																
75																
76																
77																
78																
79																
80																
81																
82																
83																
84																
85																
86																

الوثيقة (01)

- تعرف على البرنامج الذي قدم به جدول الوثيقة (01).
- اعطاء تالي نكليوتيدات الـ ARNm عند الشخصين وأغير جدوله للشفرة الوراثية انطلاقاً من معطيات الوثيقة (01).

**الجزء الثاني**

لعرض معرفة سبب ظهور الإصابة بمرض جفاف الجلد نقدم التجربة التالية:

CAA-GCA-AAA-ACA-GAG-AGG-GAU-GCU-GAU-AAA-CAC-AAG-CUU-AUA-ACC-AAA  
الشخص السليم  
- الشخص المصايب  
AGG-AUG-CUG-AUG-AUA-AAC-ACA-AGC-UUA-UAA

الطبعة الثانية

الجزء الثاني  
١-١. التحليل

يُمثل المُنْجِز

- في  $Z=0$ : نسبة الناينين المجاورة في كل من خلايا الشخص السليم والمصاب مرتفعة وتقدر بـ 0.1% نفس سلسلة الـ ADN.

- بعد ذلك، نسبة  $\text{I} = 1$  في خلايا الشخص السليم تنافص وتصل 0.02% بعد حوالي 24 ساعة وتبقي ثابتة في خلايا الشخص المصاب.

**بـ- الير عمل الإنزيم XPA** لقطع الـ ADN التي تحدث فيها خطأ.

تربيط الإنزيم APP بواسطة الموقع الفعال مع ثنائية التأمين المترابطة  $\alpha=\beta$  في سلسلة الأ-ADN لوجود تكامل ADN من جديد بواسطة روابط هيدروجينية وتعود قطعة الأ-ADN إلى حالتها الأصلية.

حدث خطأ على مستوى المورثة التي تشفّر لازيم XPA ويتيح عن تغييرها المورثي لازيم غير وظيفي لا يمكنه تصحيح الأخطاء التي تحدث جزئياً لا ADN.

العدد 02

من بين الجزيئات التي تُتركب أثناء التفاعل الالتهابي نجد وسائط الميسامين والسيتوكينات والبروتوكالاندين، تسبب هذه الأخيرة في توسيع الأوعية الدموية وارتفاع نفاذيتها مما ي يؤدي إلى ظهور أعراض غير مرغوب فيها من منها التهاب حاد (الآلام في تلك المنطقة).

بها من بينها التهاب حاد (المسمى بالتهاب المزاجي)، ينبع من تناول الأدوية التي تحتوي على دواء الإيبوبروفان أو الأسيتوفين للتخفيض من حدة الألم، ولمعرفة

**الجزء الأول** **التأثير هذه الأدوية على التفاعلات الالتهابية هنترج علبيت هذه المدرسة.**

- مثل الشكل (١) من الوثيقة (٠١) التفاعلات الأيضية المودية إلى ظهور جزئية البروتوكول العادي.

الشكل (أ) من الوثيقة (أ) التفاصيل أدناه موجزة

- يمثل الشكل (2) من الوثيقة (٠١) نتائج فياس الشاهد الموثقى بموجب

لهم بوجودك دواعيكم يتوبرون.

هذا بوجود دواء الإيبوبروفان.

## الإحابة المودجية

**الجزء الأول**  
ـ معادلة التفاعل  
 $O_2 + \text{بروتاغلادين} \rightarrow O_2 + \text{حمض الأرانبودين}$

ـ مقدار الفرضيات  
ـ 1: الدواء إيبوبروفان يغير (يحرّك) شكل الموضع الفعال للإzyme  $O_2$  ويُعَزِّز ارتباط الركيزة  
ـ 2: الدواء إيبوبروفان ينافس الركيزة (حمض الأرانبودين) على الموضع الفعال

**الجزء الثاني**  
ـ الحقائق من صحة الفرضيات  
ـ تشكل (1) و(2) من الوثيقة (02)

ـ من تشكل الدواء إيبوبروفان بيئة تشبه بيئة الركيزة، وبالتالي يرتبط بالموقع الفعال لوجود تكامل في نسبة الفراخة  
ـ بذلك ينكمش الدواء إيبوبروفان، فيقلل بذلك من فرصة ارتباط الركيزة الطبيعية ويُعَزِّز تشكل الناتج (بروتاغلادين)  
ـ ينكمش ارتباط الركيزة، فيقلل بذلك من اعراض الانهاب فتقل هذه الاعراض. وهذا ما يسمى بالتشييف الشافع  
ـ الذي ينكمش الفرضية الثانية التي تنصها: الدواء إيبوبروفان ينافس الركيزة (حمض الأرانبودين) على الموضع  
ـ الذي ينكمش من النشاط الإنزيمي.

**الجزء الثالث**  
ـ يركب الإzyme من عدد ونوع وترتيب محدد وراثياً من الأحماض الأمينية، تنشأ بين جذور بعضها روابط  
ـ يركب الإzyme من عدد ونوع وترتيب محدود وراثياً من الأحماض الأمينية، تنشأ بين جذور بعضها روابط  
ـ كيميائية (جسور ثانية الكربون)، شاردية، هيدروجينية ونحوذ الجذور الكارهة للماء، تؤدي إلى احتفاء

ـ تعالى لسلسلة الببتيدية وتأخذ بنية فراغية مميزة.  
ـ تحيي هذه البية على حرق، صغر منها على شكل نحويف أو حب يسمى الموضع الفعال، يحيي بالتفاعل


ـ تحيي مع الركيزة ويتراكب من عدد ونوع وترتيب محدود من الأحماض الأمينية، بعضها تحيي  
ـ تشكل موقع التنشيط، والأخرى تؤثر عليها وتحوّلها إلى ناتج أو أكثر وتشكل موقع التحفيز

ـ (أzyme) تكتبه شخصاً مزدوجاً باحتواه على موقع فعال يمكنه تبيّن مادة تفاعل معه وتحضر عن  
ـ يضر معن، وهذا ما يسمى بالشخصوص الوظيفي المزدوج للإzyme.

ـ التغرين 03

ـ تعب (يرقات دوراً هاماً في العضوية فهي تتوسط كل تفاعلات الأيض التي تحدث على مستوى الخلية،  
ـ (نهز هذه الأهمية تفتح عليك الدراسة التالية:

**الجزء الأول**  
ـ ينكمش الموليد الجديد من مرض يدعى مرض تخرّب الغليوكوزين من النوع 1 الذي تمتلك أعراضه في  
ـ نصـمـمـكـدـ (زيـادـةـ حـجمـهـ)ـ معـ قـصـورـ سـكـريـ حـادـ.ـ تـمـلـلـ الوـثـيقـةـ (01)ـ بعضـ تـفـاعـلـاتـ آـخـرـ الغـلـيـوكـوزـ  
ـ ليـ تـحدـثـ عـلـىـ مـسـنـوـيـ الـخـلـيـةـ الـكـبـدـيـ لـدىـ شـخـصـ سـليمـ.




ـ أكب معادلة التفاعل الذي يحفره الإzyme  $O_2$ .

ـ تخرج مركبتي نصر مما تأثير الإيبوبروفان على النشاط الإنزيمي.

**الجزء الثاني**  
ـ باستعمال برنامج الرسوب تم الحصول على الشكل (1) من الوثيقة (02) والذي يمثل تماذج جزيئية الإzyme  $O_2$  يوجد الركيزة الطبيعية والإيبوبروفان. أما الشكل (2) من نفس الوثيقة فيمثل رحماً تحظطضاً نصـمـمـكـدـ (زيـادـةـ حـجمـهـ)ـ معـ قـصـورـ سـكـريـ حـادـ.ـ تـمـلـلـ الوـثـيقـةـ (01)ـ بعضـ تـفـاعـلـاتـ آـخـرـ الغـلـيـوكـوزـ

ـ ينكمش الفرضية الثانية التي تنصها: الدواء إيبوبروفان ينافس الركيزة (حمض الأرانبودين) على الموضع



ـ باستدلال علمي، تتحقق من صحة إحدى الفرضيتين السابقتين.


**الجزء الثالث**  
ـ أبغز خلاصة تلخص من خلالها كيف تساهم بيئة الإzyme في تحصصه الوظيفي  
ـ انطلاقاً مما توصلت إليه، أبغز خلاصة تلخص من خلالها كيف تساهم بيئة الإzyme في تحصصه الوظيفي  
ـ المردود إيجاد مادة التفاعل ونوع التفاعل.



الحال المخلطي مرض نادر ولكنه الأكثر انتشاراً من بين الأمراض الأبوية. من أعراض هذا المرض الإعاقة الذهنية، ضعف البنية، البشرة والعينين والشعر تكون ذات لون فاتح. لغرض فهم هذا المرض وسببه وأصله تفتح دراسة التالية:

**النهاية الأول**  
البحث عن السبب الجزيئي للمرض تم التوصل أنه يتم في الجسم استهلاك الأحماض الأمينية بتدخل الإنزيم، فعلاً وجد أن الإنزيم فيتيل الاتين هيدروكسيلاز (PHA) يحفز تفاعل تحويل فيتيل الاتين إلى إيزوتان.

نتائج تناول بروتين (أ) يمثل تناول قياس كمية الفينيلalanine والثيوروزين في دم شخص مصاب بال بواس التخلقي وآخر سليم بعد تناول بروتين (ب) يمثل معطيات علمية تم التوصل إليها أثناء دراسة أسباب مرض بواس التخلقي.



الوثقة (٠١)

أ- اطلاقاً من أشكال الوثيقة (٠١)، قدم فرضية تفسر بها ظهور أعراض مرض ال بواس التخلقي.

تهدف تجربة تحديد السبب الحقيقي لظهور المرض نعرض أشكال الوثيقة (02)، يمثل الشكل (أ) نتائج قياس كمية الإنزيم فينيل الألانين هيدروكسيلاز في قطرات دم شخص مصاب بالبوال التخلقي وأخر سليم. بينما تما الشكل (ب) نتائج دراسة أجريت على الإنزيم PHA باستعمال البرنامج أناجان.

السلة الحية يتم نزع الغلوكوز من الغلوكوز-6-فوسفات بواسطة الإنزيم غلوكوز-6-فوسفاتاز (المتواجد في غشاء دهون الكارهة ومنها يتم تحريره في الشعيرة الدموية عن طريق الناقا

يتم نقل الغلوكوز إلى هياكل الخلية الجديدة وتبنيها بـ  $\beta$ -D-الغلوكون.

في كل من خلايا الكبد وخلايا العضلات الطرفية يتم نقل الغلوكوز إلى هياكل الخلية الجديدة وتبنيها بـ  $\beta$ -D-الغلوكون.

**ج- التحليل**

يعود تضخم الكبد إلى تراكم الغليكوجين في الخلايا الكبدية بسبب عدم تحمله ويعود الفحصون السكري بعد تضخم الكبد إلى تراكم الغليكوجين في الخلايا الكبدية بسبب عدم تحمله ويعود الفحصون السكري.

٣- اقتراح فرضيتين

- الفرضية ١: غياب نشاط الإنزيم غليكوجين فوسفوريلاز الذي يحول الغليكوجين إلى غلوكوز فوسفات.
- الفرضية ٢: خلل في وظيفة الإنزيم غلوكوز ٦ فوسفاتاز (الذي يعمل على تحويل الغلوكوز ٦ فوسفات إلى غلوكوز في تجوية شهـف).

**١- المعلومات المستخرجة**

في 80% من الحالات المدرسة يتم تحويل الغليكوجين إلى غلوكوز 6 فوسفات ودخول هذا الأخير على تجويف شهـف دون تعرضه إلى تفاعل نزع الفوسفور ومنه فإن المرض هنا يمكن في خلل على مستوى الإنزيم غلوكوز 6 فوسفاتاز ١.

20% من الحالات الباقية بتحلـل الغليكوجـين إلى غلوكـوز 6 فـوسـفات دون دخـول هـذا الـأخـير إـلى تجويف شـهـف وهذا يمكن الخلـل وبالتالي سـبـب المـرـض في إنـزـيم غـلـوكـوز 6 فـوسـفاتـاز ٢.

2- التحقق من صحة أحدى الفرضيتين  
 يعود أصل المرض في هذه الحالة إلى حدوث طفرة وراثية تمثل في استبدال القاعدة الأزوتية ( ) في الأليل الطبيعي بالقاعدة الأزوتية ( ) في الأليل الطافر وذلك على مستوى الثلاثية المشفرة للحمض الأميني رقم 83 فيظهر المستوي عوضاً عن الأرجينين مما يؤدي إلى تغير البنية الغراغية (شكل الموقع الفعال) للإنزيم غلوكوز 6 فوسفاتاز ( ) وبالتالي فقدان وظيفته.  
 إذن تتحقق الفرضية الثانية التي تنص على: خلل في وظيفة الإنزيم غلوكوز 6 فوسفاتاز ( ) الذي يعمل على تحويل الغلوكوز 6 فوسفات إلى غلوكوز في تجويف شرارة.

توقف البنية الفراغية وبالتالي الشخص الوظيفي للإتزيم على الروابط (روابط كهربائية، روابط شاردية...) التي تنشأ بين أحاضن الأمينة محددة بعدد ونوع وترتيب معين ومتوضعة بكيفية دقيقة (حسب الرسالة الوراثية)، تسمح لها تلك الروابط البيولوجية بتقريب تلك الأحاضن الأمينة في البنية الفراغية ثلاثة الأبعاد معطية شكلاً فراغياً مميزاً هو الموضع الفعال الذي يملي تكاملًا فراغياً وبنرياً مع مادة التفاعل. تغير تلك الأحاضن الأمينة يؤدي إلى عدم نشأة تلك الروابط فيفقد الإتزيم (الموضع الفعال) بنيته الفراغية ليصبح غير فعال.

**السلسلة المعاصرة**  
البروتينات في التحفيز الإنزيمي دور الشخص السليم قادر على هضم الفيتيل الائين والشخص المصاب غير قادر على ذلك.

٢- تقديمه فرضية غير وظيفي عند المرضى حدوث خلل وراثي (طفرة).

**الجزء الثاني** التحقق من صحة الفرضية

١- كمية الإنزيم PHA قبلة في دم الشخص المصاب مازنة بالشخص السليم. ويبيت التشكل (أ) أن غياب الإنزيم PHA بسبب حدوث خلل وراثي في مستوى الثلاثي 311 حيث استبدل بـ (ب) أن عدم عمل الإنزيم PHA سمح بارتفاع مستمر للـ Phe لعدم تحوله إلى Gly بمحض Gly وعلىه فإن عدم عمل الإنزيم PHA سمح بارتفاع مستمر للـ Phe لعدم تحوله إلى Gly وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المطروحة "إنزيم PHA غير وظيفي عند المرضى بسبب حدوث الطفرة".

٢- تحويل اعراض مرض البوال التخلقي

٢- تحويل الوثيقة (٠١) يبين ما يلي:

من خلال الـ Phe إلى Tyr وفق تفاعل إنزيمي.

يتحول الـ Phe إلى Tyr بنشاط الإنزيم PHA.

٢- تحويل الوثيقة (٠٢) يبين ما يلي:

من خلال الوثيقة (٠٢) يبين ما يلي: AAG بالثلاثي CCT عند الشخص المصاب سمح بانعكاس ذلك في مستوى بنية الإنزيم.

٣- تحويل شكلها يؤدي لضعف بنية الجسم.

ذكر في مقدمة التعرير ثلاثة أعراض هي:  
ذمة ذهنية: يعود سببها لارتفاع كمية Phe في الدم الذي يؤدي لتلف خلايا المخ ما يسبب الخفاض

المذكرة الذهنية لدى المرضى Mody-2.

ضعف البنية: عدم استهلاك Phe ونقص تركيز Tyr يدل على عدم استعمال الأحماض الأمينية الناجحة عن المرض بشكل جيد والتي تعتبر الوحدات الأساسية لتكوين البروتينات وهي الوحدات البنائية

للحاجة والتخلقي تشكلها يؤدي لضعف بنية الجسم.

لون البشرة والعيون والشعر فاتح: عدم عمل الإنزيم PHA يؤدي لعدم تشكيل التغوزين الذي يعتري

صدر مادة الميلانين المسئولة عن اللون وغياب الميلانين يؤدي لغياب اللون وهو ما يفسر اللون الفاتح

للبشرة والشعر.

**الجزء الثالث**


بعض الإنزيمات الوسائل الحيوية التي تسير مختلف التفاعلات التي تحدث في العضوية، وأي حل في أحد هذه

ينجر عنه تعطل وظيفة أو حتى مجموعة وظائف نظراً للارتباط الوثيق بين التفاعلات التي تقوم بتسييرها،

غياب نشاط PHA أدى لارتفاع تركيز Tyr بسبب الإعاقة الذهنية كما أدى لانخفاض تركيز Tyr بسبب

ضعف البنية وسبب أيضاً تغيراً في لون البشرة والشعر.

وعليه فالإنزيمات مهمة جداً للحفاظ على سلامة العضوية وضمان ثباتها ووحدتها.



الوثيقة (٠٢) - الشكل (أ)

١- تتحقق من صحة الفرضية المقترنة.  
٢- إذا علمت أن ارتفاع نسبة الفيتيل الائين في الدم يؤدي إلى تلف في خلايا المخ، باعتماد أنكرا

الوثيقين (٠١) و(٠٢) وباستدلال منطقي:  
- علل أعراض مرض البوال التخلقي المذكور في مقدمة التعرير.

**الجزء الثالث**  
ما توصلت إليه ومخالفاته، استخلاص أهمية الإنزيمات في الحفاظ على ثباتها ووحدة العضوية مقدماً  
الحلول الممكنة للتخلص من حدة هذا المرض.

**الإجابة الممزوجة**

**الجزء الأول**

١- التحليل

تحلل للمتحبين تغيرات كمية المحمضين الأمينيين الفيتيل الائين والتغوزين بدلالة الزمن حيث نلاحظ:  
بالنسبة للشخص السليم: ارتفاع كمية الفيتيل الائين بعد وجبة غذائية بليلة مباشرة ارتفاع كمية التغوزين،  
ثم تخفيف كمية الفيتيل الائين واستمر ارتفاع كمية التغوزين.  
بالنسبة للشخص المصاب: ارتفاع كمية الفيتيل الائين بعد وجبة غذائية بليلة مباشرة ارتفاع كمية التغوزين،  
ذلك يقاء كمية التغوزين ثابتة بشكل دائم.

السلسلة الفضية  
- اقتراح حلول للتحفيف من حدة المرض: هذا المرض وراثي ليس له شفاء نهائى ولكن يمكن علاجه  
باتباع حبة يتحسب فيها المريض تناول البروتينات وتعرضاها مواد أخرى قابلة للاستعمال يضافون  
تركتير Phe.

### الوثيقة 05

تؤدي الإنزيمات دوراً فعالاً في حياة الكائنات نظراً للوظائف العديدة التي تقوم بها، وتختلف إنزيمات  
باحتلاف المواد التي تؤثر فيها.  
قد يحدث خلال عملية الهضم عدة مشاكل نتيجة عدم تحمل بعض المغذيات، ندرس كمثال في  
الموضوع عدم تحمل النساء.  
تظهر عند شخص عادي من عدم تحمل النساء أعراض تتمثل في تشنجات على مستوى المعدة، الغثيان  
والألم في البطن، إنتاج مفرط للغازات، تقيؤ، إسهال... لفهم سبب المرض نقترح عليك هذه الدراسة  
نظير الوثيقة (01) بحث وكيفية تأثير الإنزيم أميلاز المتواجد في اللعاب على مادة التفاعل وشروط عمله

الوحدة 03: دور البروتينات في التحفيز الإيجي			
السلسلة الفضية			
الآنوب	محتوى الأنوب	خليل الأنابيب بمحلول فلوكالن مع التسخين	الآنوب
++	+++	0 + 15 دقيقة	0
+++	+++	النشاء + الأميلاز	1
-	-	المالتوز	2
-	-	السكروز + الأميلاز	3
-	-	النشاء + الماء	4

(-) غياب سكريات مرجعة (+) وجود سكريات مرجعة



الوثيقة 1 - الشكل د

باستغلال الوثيقة (01)، استخرج محضرات الإنزيم أميلاز، ثم اقترح فرضيات لنفسك بما عدم تحمل النساء  
عند بعض الأشخاص.

### الجزء الثاني

لفهم أعراض هذا المرض وعلاقته بحمض النساء ولتأكيد مدى صحة الفرضيات نقدم لك الوثيقة (02).  
ملاحظة: تم التمثيل بواسطة البرنامج أناجان.

- الأميلاز اللعبي عند شخص سليم: Amylose\_fonctionnel
- الأميلاز اللعبي عند شخص مصاب: Amylose\_patient



الوثيقة (1)

الوحدة 03: دور البروتينات في التحفيز الإنزيمي  
الجزء الثاني

شح سبب معانة بعض الأشخاص من عدم هضم النساء وتبيين صحة إحدى الفرضياتين يظهر البرنامج أنماjan أن هناك اختلافاً في حمض الأميني واحد رقم 58 في السلسلة البييدية حيث عند الشخص غير مصاب هو التريتوфан وعند المصاب هو الألانين. وهذا ما ينفي الفرضية الأولى التي تنص على غياب الأيميلاز لغياب المورثة. كما يظهر البرنامج راستوب أن الحمض الأمينيalanine (Ala) يقع في الموقع الفعال للأيميلاز، وأنه بعد عن الركيزة عكس التريتوфан الذي يظهر تقريراً ملائماً للركيزة.

عن الركيزة (ج) فيظهر أن الموقع الفعال يحمل موقعين، موقع ثبيت الركيزة وموقع تحفيز التفاعل. أما عن الشكل (ج) فيظهر أن الموضع 58 يدخل ضمن الأحماض الأمينية المسؤولة عن ثبيت الركيزة أم المسؤولة عن تحفيز تفاعل تفككها؟

يظهر جدول الوثيقة (02) مقارنة بين الإنزيمين:

في الحالتين عدد الأحماض الأمينية في الإنزيمين هو 496، الاختلاف الوحيد هو في الحمض الأميني رقم 85، كما تبين كذلك أن المسافة بين التريتوфан والركيزة هي 3.5 Å عند إنزيم الشخص السليم، بينما مسافة الألانين مع الركيزة هي 6.8 Å عند إنزيم الشخص المصاب، حيث بعد المسافة بين الحمض الأميني والركيزة يؤدي إلى عدم ثبيتها وبالتالي عدم إماهتها.

وإذا يؤكد صحة الفرضية التي تنص على أن الإنزيم غير وظيفي لوجود خلل على مستوى المورثة، فإن الإنزيم الأيميلاز يكتسب تأثير بدرجة الحرارة حيث يكون نشاطه أعظمياً في درجة 37°C.

**الجزء الثالث**

مصدر مرض عدم تحمل النساء هو حدوث طفرة على مستوى المورثة المسؤولة عن تصنيع الإنزيم أيميلاز، فالمورثة تشرف على تركيب البروتين (الأيميلاز) بإملاه تسلسل معين من النكليوتيدات تترجم إلى تسلسل محدد من الأحماض الأمينية في السلسلة البييدية الموجهة لتركيب إنزيم معين.

يتوقف الشخص الوظيفي للإنزيم على البنية الفرعية والتي تحدده الروابط الكيميائية (ثنائية الكبريت، شاردية، هيدروجينية وكارهة للماء) الناشئة بين أحاسيس أمينية محددة ومتواضعة بطريقة دقيقة في السلسلة البييدية حسب الرسالة الوراثية المشفرة خاصة تلك المشكلة للموقع الفعال.

علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

السلسلة الفضية	عدد الأحماض الأمينية	أيميلاز شخص سليم	أيميلاز شخص مصاب
حمض أميني رقم 58	496	496	496
مسافة الحمض الأميني رقم 58 عن الركيزة	Trp	Trp	Alanine
سرعة النشاط الإنزيمي	3.8 Å	6.8 Å	أنيسترون
الوثيقة 2 - الشكل د	1	0.005	وا

- باستغلال المطبات المفتوحة في الوثيقة (02)، اشرح سبب معانة بعض الأشخاص من عدم هضم النساء مع إثبات صحة إحدى الفرضيات.

**الجزء الثالث**

بناء على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومعلوماتك، أ简ز خلاصة بين فيها مصدر مرض عدم هضم النساء موضحاً العلاقة بين المورثة والموقع الفعال للإنزيم.

الإجابة المودعة

1- مميزات الإنزيم أيميلاز  
يظهر الشكل (أ) أن الإنزيم أيميلاز ذو طبيعة بروتينية، مستوى البنائي ثالثي، يحتوي على موقع فعال ذي متمكامل مع شكل الركيزة وهي النساء، وينشط تفاعل تفكك الركيزة إلى وحدات سكرية ثنائية ملائمة لها.  
يظهر الشكل (ب) أن نشاط الإنزيم يتأثر بدرجة الحرارة حيث يكون نشاطه أعظمياً في حوالي 37°C، وكلما ابتعدنا عن هذه القيمة نقص نشاطه حتى يتعدم.  
يظهر الشكل (ج) أن نشاط الأيميلاز يتأثر بدرجة pH الوسط حيث يكون نشاطه أعظمياً في درجة pH المثلثي، وكلما ابتعدنا عن هذه القيمة نقص نشاطه.

يظهر الشكل (د) بعض التجارب تظهر شروط عمله حيث:

التجربة (1): تجربة شاهدة.  
التجربة (2): تبين أن المالتوز من السكريات المرجعة محلول فهيلينغ وهو سكر ثالثي.

من مقارنة 1 مع 3: السكروز ليس من السكريات المرجعة محلول فهيلينغ وليس ركيزة للأيميلاز، إذن الإنزيم يخترق تفاعل إمامه النساء.

افتراض هرفيدين  
فرضية 1: غياب الإنزيم لغياب المورثة المسؤولة عن تركيبه عند هؤلاء الأشخاص.


فرضية 2: الإنزيم غير وظيفي لحدث خلل على مستوى المورثة المسؤولة عن تركيب الإنزيم عند هؤلاء الأشخاص.

يطلب التخصص الوظيفي للبروتينات في التحفيز الإنزيمي بنية فراغية محددة، وتدخل بعض العوامل الداخلية والخارجية وتؤدي إلى تغير البنية وبالتالي تغير الوظيفة.  
فهل في بعض الحالات الفيزيولوجية الغير في بيئة الإنزيم يتدخل هذه العوامل والذي يؤدي إلى تغير الوظيفة ضروري وحتمي وبالتالي يصبح من متطلبات العضوية؟

**الجزء الأول**

يتوارد الإنزيم غلوكوكيناز (GK) على مستوى خلايا الكبد، يحمل الغلوكوز الداخل إلى الكبد في الماء إلى غلوكوز-6-فسفات (G-6-P) لتخريمه على شكل غليكوجين. ينظم عملية التحويل بروتين تطبيقي GKRP داخل خلايا الكبد كما هو ممثل في الشكل (أ) من الوثيقة (01).

يوضح الشكل (ب) من الوثيقة (01) تغير وتأثير نشاط الإنزيم غلوكوكيناز في وجود وغياب البروتين GKRP.



الوثيقة (02)

بالنسبة من معطيات الوثيقة (02) وباستعمال الاستدلال العلمي فسر آلية تأثير الدواء GKA مبرزاً مدى صحة الفرضية المقترنة سابقاً.

**الجزء الثالث**  
بيان المعلومات التي توصلت إليها سابقاً قدم إجابة للمشكل المطروح في بداية التمرين.

**الإجابة النموذجية****الجزء الأول****1- المعلوماتين المستخلصتين**

يجد شيكلين للإنزيم:

- مرتبط بالبروتين GKRP أو حر على مستوى الأبيولي.

- الإنزيم بينيتين فراغيتين مختلفتين قبل الارتباط بالبروتين وبعد الارتباط به.

**2- التحليل**

يتمثل الشكل (ب) من الوثيقة (01) من حيث بيان تغير النشاط الإنزيمي للغلوكوكيناز (فسرة الغلوكوز)

بزيادة الغلوكوز في وجود وغياب GKRP حيث نلاحظ:


في وجود GKRP تزايد ضعيف للنشاط الإنزيمي (فسرة الغلوكوز) بزيادة الغلوكوز في الوسط وفي غياب

GKRP تزايد كبير للنشاط الإنزيمي (فسرة الغلوكوز) بزيادة الغلوكوز في الوسط.

نستنتج أن وجود GKRP يعرقل فسفرة الغلوكوز.

**3- الفرضية**

عمل الدواء على تثبيط عمل GKRP وبالتالي زيادة فسفرة الغلوكوز وبالتالي ينخفض من نسبة السكر في الدم.



الوثيقة (01)

1- استخرج معلوماتين أساسين من المعطيات الممثلة في الشكل (أ) الوثيقة (01) ثم حلل منحي الشكل (ب) من نفس الوثيقة.

2- إذا علمت أن الدواء GKA يستعمل لعلاج ارتفاع نسبة السكر في الدم عند بعض مرضى داء السكري. اقترح فرضية تفسر كيف يعمل هذا الدواء على خفض نسبة السكر في دم المصاب.

**الجزء الثاني**

لتحديد آلية عمل الدواء GKA نقترح عليك الوثيقة (02) حيث:

- يمثل الشكل (أ) سرعة نشاط الإنزيم GK بزيادة تركيز الغلوكوز.

- يمثل الشكل (ب) حالة الإنزيم GK في غياب وجود بروتين GKRP.

الجزء الثاني  
التفسير**الوحدة 04: دور البروتينات في الدفاع عن الذات**

## 1- جزء الدروس

## أ. مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة

يمنع العضوية بمنعطفين من وسائل الدفاع؛ مناعة طبيعية ومناعة مكتسبة، يختلفان عن بعضهما من حيث تخصيص لكتهما بتعاونان معاً للحفاظ على سلامة الجسم ونكماله.

## 1.1. مناعة طبيعية

مناعة فطرية وجاهزة للعمل منذ الولادة، ليست نوعية للمستضد لأنها منتمية ضد مختلف المستضدات، تنتقل وراثياً وتسمى أيضاً المناعة اللاذوعية. تشكل هذه المناعة الخطين الدفاعيين الأول والثاني للعضوية.

## أ. خط دفاعي أول، خارجي

- حماية فيزيائية: تتمثل في الجلد، الأغشية المخاطية الموجودة في المسالك التنفسية والبوليصة والتاسيفية، والأهداب في تحويف الأنف والقصبات.

- حماية كيميائية: تتمثل في العرق وإفرازات الغدد الدهنية، وتعتمد فاعليتها الثالثة للجراثيم على درجة حرارتها، يعمل الغلاف المخاطي للمسالك التنفسية والبوليصة والتاسيفية على شل نمو البكتيريا والفيروسات بفضل وسائل كيميائية متعددة كالبليوروزم وهو إنزيم حالاً يوجد في المخاط وفي معظم سوائل الجسم (مثل اللعاب والدموع...)

## ب. خط دفاعي ثانوي، داخلي

يشمل في الالتهاب وهو استجابة مناعية طبيعية ضد كل أشكال التعدى على العضوية. ودوره الدفاعي التوضعي وترميم الأنسجة المثلثة. يسببه جرح، غزو جرثومي، حريق... أهم مظاهره هي الاحمرار، ارتفاع الحرارة، الانتفاخ والألم حيث:

الاحمرار وارتفاع الحرارة: بسبب تعدد الشعيرات وارتفاع تدفق الدم مكان المرض.

الانتفاخ: بسبب خروج البلازمما لتسهيل انسلاط الكريات البيضاء.

الم: بسبب تجمّع النهايات العصبية التي تتأثر بوسائل الالتهاب والمادة التي يفرزها الجسم الغريب.

وتشمل التخلص من العناصر الغريبة بعملية البلعمة وفق المراحل التالية:

تثبيت: ثبت البالغة الجسم الغريب على غشاءها.

إحاطة: تشكل أرجل كاذبة تحيط بالجسم الغريب.

إندخال: تضع الجسم الغريب في فجوة وتدخله إلى الهيكل.

هضم: تفرز إنزيمات حالة (ليزوزمات) في حسيمات حالة (ليزوزمات) تندفع مع حويصل الاقتراض وتحرس الجسم الغريب.

إطراح: تطرح البقايا بظاهرة الإطراح الخلوي.

مثل الشكل (أ) من الوثيقة (02) شكل الإنزيم في وجود وفي غياب GKR<sub>P</sub> حيث يثبتت (يرتبط) مع الإنزيم الغلوكوكيناز في موقع غير الموقع الفعال (مادة غير تropic)، يعمل هذا الأخير على تغيير السيدة الفراغية الأصلية للإنزيم وخاصة الشكل الفراغي للموقع الفعال ويصبح غير مكمل بنيوياً لمادة الشافع (الغلوكوز) وبالتالي يمنع ارتباط جزءة الغلوكوز مع الإنزيم وتشكل معدنات إنزيمية (ES) وبالتالي عدم

حدوث تفاعل فسفرة الغلوكوز، لذلك تبقى نسبة السكر مرتفعة في الدم. من خلال الشكل (أ) من الوثيقة (02) والذي يمثل منحنٍ بيانٍ للتغيرات سرعة النشاط الإنزيمي للغلوكوكيناز بدلاً من تركيز الغلوكوز في وجود وفي غياب الدواء GKA حيث يبين أنه في وجود الدواء GKA تزداد سرعة النشاط الإنزيمي مقارنة بغيره.

ومنه يدل ذلك أن ثبت الدواء في مكان ارتباط GKR<sub>P</sub> (الدواء مادة منافسة للـ GKR<sub>P</sub>) يبقى الإنزيم محافظاً على بيته الفراغية الأصلية حيث يتشكل معدنات إنزيمية (ES) أي ارتباط الغلوكوز + 6% وبالتالي تتم عملية الفسفرة للغلوكوز تحويله إلى غلوكوجين وبالتالي تعديل نسبة السكر في الدم.

## الجزء الثالث

في بعض الحالات الفيزيولوجية التغير في بيئة الإنزيم يتدخل عوامل داخلية أو خارجية والذي يؤدي إلى تغير الوظيفة ضروري وحيثي ومن متصطلات المعرفة فروتين GKR<sub>P</sub> يضعف عمل الإنزيم غلوكوكيناز لكنه لا يخفض نسبة السكر في الدم إلا خاصاً كثيراً عند الأشخاص العاديين (ليسوا مرضى بداء السكري) مثلاً حدوث خلل من نوع آخر، كما أن تثبيط GKR<sub>P</sub> عند الأشخاص المرضى بالسكري قد يؤدي إلى علاجه.

**السلسلة الفقها**

**دور البروتينات في الدفاع عن الذات**

**غشاء هيوي**

**تركيب كيميائي**

يُذكر لغشاء الهيوي من بروتينات وفوسفوليبيدات (دسم فوسفوري).

بنية

يكون الغشاء الهيوي من طبقتين من الدسم الفوسفوري تقابل فيما بينهما الأقطاب الكارهة للماء. يتوضع لكوليسترون بين جزيئات الدسم الفوسفوري. يتحلل الطبقتين بروتينات ضمنية وتتوسط البروتينات المطحطة على السطوحين الداخلي والخارجي للغشاء. كما يتميز السطح الخارجي بامتداد سلاسل سكرية يربط بعضها مع بروتينات مشكّلة بروتينات سكرية (غликوبروتينات)، كما يرتبط بعضها بدسم فوسفوري مشكّلة دسم سكري (غликوليبيدات).

**رسم تخطيطي يوضح ما فوق بنية الغشاء الهيوي**

**ج- نموذج فسيفسائي مانع**

- الغشاء الهيوي ذو بنية فسيفسائية: يتركب من جزيئات مختلفة الأشكال والأحجام والطبيعة الكيميائية.

- الغشاء الهيوي مائع (بين السبولة والصلبة): مكوناته في حركة دائمة.

**علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء**

**2-1- مناعة مكتبة**

مناعة لا تنتقل وراثياً بل يكتسبها كل فرد بعد الولادة بعد تعريضه لمختلف المستضدات. تميز هذه المناعة بالتنوعية تجاه المستضد، فتستوي أيضاً المناعة النوعية. تشكل الخط الدفاعي الثالث وهي نوعين: خلطية تدخل ضد مستضدات مختلفة، تتوسطها المقاويات LB، وخلوية تدخل ضد الخلايا المصابة والسرطانية، تتوسطها المقاويات LT.

**2- جهاز مناعي**

يتكون الجهاز المناعي (المقاوي) من أعضاء، خلايا وجزيئات.

**2-1- أعضاء الجهاز المناعي**

يوجد نوعين من الأعضاء، مركبة تمثل في نخاع (نقى) العظام والغدة المعنقرة (تسوس). ومحبطة وهي طحال، عقد مقاواة، لوزتين وصفائح باير.

**2-2- خلايا الجهاز المناعي**

ثلاثة مقاويات (LT4، LB، LT8) والبالغات.

**2-3- جزيئات الجهاز المناعي**

تسعه جزيئات وهي: HLA، مستضدات الازم الردموية، TCR، BCR، جسم مضاد، أنتروكينات، بروفورين، مستقبلات غشائية للبالغات ومؤشرات الكفاءة المناعية CD4 وCD8.

**3- ذات ولادات**


يتميز الجهاز المناعي بقدرته على التمييز بين مكونات العضوية (الذات) والتسامح معها، وبين ما هو غريب عنها (اللالات) والتصدي لها.

**الذات:** بروتينات غشائية ناتجة عن التعبير المورثي للفرد، تمثل في جزيئات: معقد CMH، النظام ABO ونظام الريبوس، وممثل بطاقات الهوية البيولوجية للفرد.

**اللالات:** جزيئات غريبة عن العضوية، قادرة على إثارة استجابة مناعية، والتفاعل نوعياً مع تأثير الاستجابة قصد القضاء عليها.

**٤٤٤: دور البروبيوت في حماية من الألف إلى الياء**

**تجربة المعالجة بالإنزيم غليكوسيداز تظهر الطبيعة الكيميائية للجزيئات المحددة للذات.**



تجربة: تزيل خلايا المفاواة من فار، تعالجها بالإنزيم غليكوسيداز الذي يخرب البروتينات السكرية الغشائية، ثم تعيد حققها في نفس الفار.

ملاحظة: الخلايا البالعنة للفار ابتلعوا الخلايا المفاواة المحظوظة رغم أنها من نفس الحيوان، لأنها لم تعرف عنها.

نتيجة: الطبيعة الكيميائية للجزيئات المحددة للذات: بروتينات سكرية (غليكوبروتينات).

**٤- معقد التوافق النسيجي CMH**


بروتينات غشائية مسؤولة عن تحديد الذات تسمى عند الإنسان بالـ HLA، تشرف على تركيبها مجموعة من المورثات تدعى مورثات الـ CMH. يوجد نوعان من الـ CMH هما CMHII و CMHIII.

ستضادات غشائية ذات طبيعة غликوبروتيبية تحديد الذات، يوجد منها صنفان مختلفان في البنية والوظيفة والواحد في الخلايا. الـ HLA I يتواجد على سطح غشاء كل خلية العضوية ذات نواة، والـ HLA II يتواجد على سطح غشاء الخلايا العارضة والخلايا LB.

- بنية الـ HLA: يتركب من سلسلتين بيتيدتين، جزء منها ثابت مرتبط بغشاء الخلية، والجزء الآخر متغير يحتوي على موقع البيتيد المستضدي، ويرتبط به جزء سكري.

**علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء**

**٤٤٥: تجربة التجيج الخلوي تظهر أن الغشاء الهيولي مائع.**



٥ دقيقة: أجسام مضادة مخلوقة بالأحمر مرتبطة ببروتينات غشائية للإنسان

٤٠ دقيقة: أجسام مضادة مخلوقة بالأحمر مرتبطة ببروتينات غشائية للفار

تجربة: تدمج خلتين مختلفتين ببنية خاصة، مثلاً خلية فار وخليه إنسان، بحيث تكون البروتينات الغشائية لأحد الخلتين مرتبطة بأجسام مضادة مخلوقة بلون معين، والبروتينات الغشائية للخلية الأخرى مرتبطة بأجسام مضادة مخلوقة بلون آخر.

ملاحظة: بعد اندماج الخلتين، توزع اللونة بالتناظر حول الخلية الكبيرة الهيجينة الناتجة عن اندماج الخلتين.

نتيجة: مكونات الغشاء الهيولي تتحرك باستمرار، فهو مائع (ليس بالصلب ولا بالسائل).

**٥- الكلورة المناعية**

تعتمد على استعمال أجسام مضادة مخلوقة، أي مصبوغة بمادة كيميائية تصدر إشعاعاً عند تعريضها لضوء خاص.

تستعمل لتحديد مقر جزيئات معينة في العضوية، حيث ترتبط بها هذه الأجسام المضاد الخاصة بها.

٣- جزيئات غشائية محددة للذات الجزيئات الغشائية المحددة للذات ذات طبيعة غликوبروتيبية، ويوجد منها ثلاثة أصناف: معقد التوافق النسيجي CMH، محددات الهرم المدعوية A، B، O، محدد عامل الريزوس D.

**بـ مؤشرات الزمرة الدموية**

افتقار الدم على صفيحتين زجاجتين، يضيف للأولى مصل يحتوي على أجسام مضادة ضد A، مع فقرة من الدم على صفيحتين زجاجتين، يغير أربعةاحتمالات:

- إما حدث ارتصاص (تجمع الكريات الحمراء (ك د ح) مع الصد A فقط تستخرج أن الزمرة [A]).

- إما حدث ارتصاص مع الصد B فقط فإن الزمرة [B].

- إما حدث ارتصاص مع الصد A والصد B فإن الزمرة [AB].

- إما يحدث ارتصاص مع الصد A ولا الصد B فإن الزمرة [O].


**نماذج الزمرة الدموية**

الزمرة [A]: تحمل ك د ح المستضد الغشائي (A) وبختوى المصل على الجسم المضاد (صد B).


الزمرة [B]: تحمل ك د ح المستضد (B) وبختوى المصل على (صد A).

الزمرة [AB]: تحمل ك د ح المستضدات (A و B) ولا يحتوى المصل على (صد A) ولا (صد B).

الزمرة [O]: ك د ح لا تحمل أيًا من المستضدتين A و B، وبختوى المصل على (صد A) و (صد B).


**تلزيم الدم**

للمريض أنه عدم تلاقي نفس المستضد الغشائي للشخص المرضى (المانع) مع الأجسام المضادة الممثلة له والمتواجدة في بلازما المستقبل، علماً أن الأجسام المضادة المتواجدة في دم المرضى ذات تأثير نقل ك د ح فقط.



- المنشآ الروابي لـ HLA: مورثاته محملة على الصبغيين رقم (6) و (15) بحيث:  
الصبغي رقم (06) يحمل المواقع (A B C) بما مورثات يشرف كل منها على تركيب السلسلة  $\alpha$  لـ HLAII.  
ويعمل كذلك المواقع  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$  يشرف على تركيب السلاسل  $\alpha$  و  $\beta$  لـ HLAII.  
الصبغي رقم (15) يحمل المورثة التي تشرف على تركيب السلسلة  $\beta_{1m}$ .

- ميزات مورثات الـ CMH: تتميز بعدد كبير من الأنجلات ولا توجد ميادة بينها، بالاعتماد على هذه الميزات مورثات الـ CMH يفترض نوع الـ HLA، ورفض الطعام.



#### ٤٤ دور البروتينات في الدفاع عن الذات

##### ١٠٤ دور المصلدر الوراثي للزمرة الدموية المختلفة

يُعود إلى اختلاف في البيلات المورثة التي تقع على الصبغي رقم 9 وهذه المورثة لها ثلاثة بيلات  $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3$  حيث:  
تعد مورثات الزمرة الدموية هي عبارة عن جزيئات من طبيعة غликوبروتينية، تتشكل هذه الجزيئات انتلاقاً من مادة طلائعية حيث يتم تثبيت سكريات عليها فيما بعد، يؤمن تثبيت هذه الأخيرة وبتأثير متتالي لإنزيمات طلائعية عن تعديل مورثي لمورثتين:  
مورثة تقع على الصبغي 19 ولها البيلان  $\alpha^1$  و  $\alpha^2$  حيث:  
يشرف البيلان  $\alpha^1$  على تركيب إنزيم وظيفي يعمل على تثبيت الغلاكتوز على المادة طلائعية وينجم عنه المؤشر  $\alpha^1$  أو ما يعرف بالمستضد 0.

البيلان  $\alpha^2$  لا يركب أي إنزيم وبالتالي لا يثبت أي شيء على المادة طلائعية.  
مورثة تقع على الصبغي 9 ولها 3 بيلات هي  $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3$  حيث:

يشرف البيلان  $\alpha^1$  على تركيب إنزيم وظيفي يثبت (N-أستيل غالاكتوزامين) على المؤشر  $\alpha^1$  ، النمط الظاهري المرتبط بهذا البيلان يظهر على سطح كذب ليشكل زمرة دمومية A  
يشرف البيلان  $\alpha^2$  على تركيب إنزيم وظيفي يعمل على تثبيت الغلاكتوز على المؤشر  $\alpha^2$  نمطه الظاهري يشكل زمرة دمومية B .

البيلان  $\alpha^3$  لا يركب أي إنزيم وبالتالي لا يثبت أي شيء على المؤشر  $\alpha^3$  نمطه الظاهري هي الزمرة الدموية 0.  
يشرف البيلان  $\alpha^1$  و  $\alpha^2$  على تركيب الإنزيمين اللذان يثبتان كل من (N-أستيل غالاكتوزامين والغلاكتوز) على مؤشران مختلفين في نفس الكربيرية الدموية الحمراء وينتج عنه زمرة دمومية AB .

##### النطط الوراثي والنطط الظاهري لصفة الزمرة الدموية


النطط الوراثي		النطط الظاهري
٥٦		٤٤ أنماط
A O	A A	[A] الزمرة
B O	B B	[B] الزمرة
A B	//	[AB] الزمرة
//	O O	[O] الزمرة

فرد هجين، متماثل العوامل، مختلف الواقع (في صفة الزمرة الدموية)

جـ عامل الريزووس  
محدد عامل الريزووس (Rh) بروتين سكري غشائي يسمى المستضد D.

#### علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

##### السلسلة المختصرة




##### خطط بين حالات التوافق بين المعطى والمستقبل للدم

- مقارنة بين مستضدات الزمرة الدموية: بروتينات سكرية، تشتهر في قاعدة سكرية قليلة التعدد تركب من حمض سكريات بسيطة، وتختلف في السكر السادس بحيث يكون في المستضد A أو N أستيل غالاكتوزامين (NAGA)، وفي المستضد B الغلاكتوز (GAL).

إذن نوع السكر السادس للقاعدة السكرية يحدد نوع المستضد، وبالتالي نوع الزمرة.

##### وثيقة بين المثنا الوراثي للزمرة الدموية




## السلسلة الفعلية اختبار نظر الريزووس

نضع قطرة من الدم على صفيحة زجاجية ونضيف لها مصل يحتوي على أجسام مضادة ضد D. يوجد احتكاكين:

- إذا حدث ارتصاص فإن الشخص موجب الريزووس ( $Rh^+$ ).
- إذا لم يحدث ارتصاص فالشخص سالب الريزووس ( $Rh^-$ ).

**التحديد الوراثي لعامل الريزووس**  
لمورثة المسؤولة عن عامل الريزووس عمولة على الصيغ رقم واحد (1) ولها أليلين فقط. أليل سائد ( $Rh^+$ ) يشفر للمستضد D وأليل متاح ( $Rh^-$ ) لا يشفر لأي بروتين مستضدي.

**نقل الدم**  
يمكن نقل الدم من شخص سالب الريزووس إلى شخص موجب الريزووس، ولا يمكن العكس.



عامل الريزووس للزمرة الدموية

في حالة امرأة حامل سالبة الريزووس، وجيئتها موجب الريزووس لأنه ورث المستضد D عن أبيه. أثناء الولادة الأولى، يمكن أن تعبر كريات دم حمراء من المولود إلى أمها، فيحيطها على استجابة مناعية وتركيب أجسام مضادة ضد D. خلال الحمل المولادي، تعبر هذه الأجسام المضادة ضد D المشيمة وتحدث ارتصاصا مع كريات دم الجنين، مما يؤدي إلى إصابة بغير الدم، وربما غير طبيعي أو حتى الموت.

وللحقيقة من هذه الحالة، تخنق الأم مباشرة بعد الولادة بأجسام مضادة تُخرب كريات الدم الحمراء موجبة الريزووس التي عبرت إليها من الجنين.

ملاحظات

- 1- **المستضد الغشائي HLA** صفة من صفات العضوية، وكذلك المستضدات A, B وD للزمرة الدموية. ولكنها صفات تظهر على المستوى الجزيئي وليس على مستوى العضوية مثل صفة لون العيون أو لون البشرة.
- 2- ارتصاص كريات الدم الحمراء استجابة نوعية ذات وساطة خلطية.

## وحدة 04: دور البروتينات في الدفاع عن الماء

### 4. مولد الضد

عصر مجهر (جزيء أو كائن حي دقيق) غريب عن العضوية (يختلف عنها وراثياً)، يحيطها على استجابة بياعية، ويفتاعل نوعياً مع ناتج الاستجابة قصد التخلص منه.

يحي مولد الضد كذلك: مستضد (فتح الضاد)، توكتسين (سم)، جسم غريب، عامل مرض. مولد الضد في الغالب عبارة عن جزيء ضخمة بروتوبية أو سكر متعدد، وتوجد أنواع أخرى تذوب في السائل خارج الخلوي مثل السموم التي تفرزها البكتيريا.

#### 4.1. محدد مولد الضد

الجزء من مولد الضد الذي تعرف عليه المستقبلات الغشائية للخلايا المناعية والأجسام المضادة.

يتمثل خصائص مولد الضد في:

- مولد الضد يمكن أن يحمل عدة محددات.

- نفس مولد الضد يمكن أن يحمل محددات مختلفة.

- نفس المحدد يمكن أن يتواجد في مستضدات مختلفة.

#### 4.2. أنوكسين

هو توكتسين معاعي، فاقد لسميته (غير مرض) ومحتفظ بخصوصيته كمول الضد، أي قدرته على تخريض الجهاز المناعي، يستعمل كلقاح. تحصل عليه بمعالجة التوكسين بالحرارة والفورمول وهي مادة تستخلص من البكتيريا وتستعمل لتصنيع اللقاحات.

#### 5. استجابة خلطية

##### 5.1- مثلاً للمقاويات LB

تشكل الخلايا LB في ثني العظام الأحمر، وتكتسب كفاءة المناعية فيه بتركيب مستقبلات غشائية تتمثل في جزيئات الـ BCR وهي أجسام مضادة غشائية.

##### 5.2- انتقاء المقاويات LB

تحتوي العضوية على عدد كبير من الخلايا LB تحمل مستقبلات غشائية BCR مختلفة (سائل) ومتماثلة في نفس الخلية. عند دخول المستضد للعضوية تتفرق نسيلة من LB التي تحمل BCR بتكامل بيوبها مع محددات المستضد.

##### آلية الانتقاء النسييلي للمقاويات LB

ثم الانتقاء النسييلي (الانتخاب اللمي) في ثلاث مراحل:

- التعرف والتثبيط: عند دخول المستضد للعضوية تُتنقى (اختيار، تُشَحِّب) له (مجموعه) من المقاويات LB التي تحمل مستقبلات غشائية BCR تتكامل بيوبها مع محدداته فترتبط به وتشتبه.

- التكاثر: تتنقس المقاويات المنشطة وتتكاثر بحيث كل خلية تنتج نسيلة من المقاويات المنشطة.

- الشابير: تُسابِر بعض السائل المقاويي إلى خلايا بلازمية (بلاسموسيت) مفقرة لأجسام مضادة ضد المستضد الذي نشطتها، وبعض الآخر إلى خلايا ذاكرة LBm لما دور في حفظ المناعة.

**مرحلة 3:** بعد تعریض كل الفئران فـ 2، فـ 3 وفـ 4 للأشعة X وحقنها بـ GRP، الفئران فـ 2 المحقونة ستر بخلايا لمقاولية من الفار 1 تنتج نوعين من الأجسام مضادة ضد GRP وهذه GRP المحقونة لا المحقونة بلمقاوليات حرة من الوسط 1 تنتج أجساماً مضادة ضد GRP فقط، أما الفئران المحقونة بخلايا حرة من الوسط 2 تنتج أجساماً مضادة ضد GRP فقط، موك الصد يتنافى الخلايا المقاولية ويشطها على التكثير والتمايز إلى خلايا بلازمية متاحة للأجسام مضادة.


### 3. خلية بلازمية

#### a. مصدر الخلية البلازمية

تنتج الخلية البلازمية من تمايز الخلية LB بعد تعریفها على المستضد (تحسیبها) وتشطیتها وتصاعفها، يحدث ذلك في الأعضاء المفاواة الخبيثة.

#### iii. تجربة تظهر مصدر الخلايا البلازمية.

نود حقن الأنتوكسين (x) في الخنزير البندي، ثم نقوم بحساب عدد المقاوليات LB والخلايا البلازمية في العينين من اللذوقين ترکیز الأجسام مضادة ضد الأنتوكسين (x) المحرّة في دم هذا الحيوان، النتائج المعصل عليها استناداً في الرسمة التالية:



العلاقة بين كمية الأجسام المضادة في المصل  
وعدد الخلايا LB في العقد المفاواة وعدد الخلايا البلازمية

#### b. تحليل

يتضح في الرسمة العلاقة بين كمية الأجسام المضادة في المصل وعدد الخلايا المقاولية البلازمية في المصل المقاول، وهذا يدل على أن الخلية LB تترکیز الأجسام المضادة ضد الأنتوكسين بجهیز.


المرحلة 1: تکثیت عدد وترکیز كل من الخلايا LB والأجسام المضادة والخلايا البلازمية ضد قيمة منخفضة.

المرحلة 2: على ترکیز الأجسام المضادة ثابتًا ضد نفس القيمة وكانت عدد الخلايا البلازمية، أما عدد الخلايا التي تتقدّم معه.

المرحلة 3: تکثیت ترتیجياً إلى أن وصل إلى أعلى قيمة تقدر بـ 15000 خلية / مل.

المرحلة 4: انخفاض عدد الخلايا LB وارتفاع عدد الخلايا البلازمية إلى أن تصل إلى 15000 خلية / مل.

#### تجربة تظهر الانقاء النسيلي للمقاوليات



تبين أن موك الصد يتنافى الخلايا المقاولية التي تتفاعل معه المرحلة 1 و 2: نلاحظ تکثیت وراثات في الشكلين أ وب رغم اختلاف الجسم الغريب، وبقاء مجموعة من الخلايا المقاولية الأخرى حرة وهذا يدل على أن الخلايا المقاولية LB كثيرة ومتعددة، ونوع موك يتنافى الخلايا التي تتفاعل معه.

السنة العاشرة

العرجنة

المرحلة ٤: تلاحظ فيها الخفافض تركيز الأحشام المصابة، مما يزيد من انتشار العدوى بين الأفراد.

٢٧


**بـ- تعنى الخلية اللازمية**

محمد سعير، هبولي كييف، أحدهما كولي عديدة ومنظورة، شبكة هبولي عامة نامية، ميتوكوندريليات وحوصلات إفرازية كثيرة، نواة قصبة، غشاء هبولي متوج، وهذا يدل على أنما تنشطة في تركيب الـ *N*-سترات.

أجسام مضادة

بروتينات مناعية من نوع 8 غلوبولين، تتميز بالتنوعة مع المستضد الذي حرض إنتاجها. الإظهار هذه الخاصة تستعمل تقنية الانتشار المناعي (أوشتزلون).

التجربة أوشتراكوفي تظهر خاصية النوعية للأجسام المضادة



نلاحظ هبوط الاقرارات بعد 1-2% في المائة، مما يشير بالوعة مع المستند الذي حرض على إنتاجها.

نحو ٣٠٪ من تحريرات SAB يدل على ارتباط الأسلحة الضارة التي يحتويها مصل الأربض مع الحزرة ١ مع SAB الموجود في مصل التور في الحزرة ٤، أي تشكل معقدات مناعية كذلك.

أرجو منكم من تعلموا مني أن تذكروا في كل خطوة أوجه الخط وينزل ذلك على عدم ارتباط الأحجام المضادة التي يحتويها معاً


السلسلة الفرعية مقدرات مناسبة

إن، الحرفيات الدوافعية تتميز بالتنوع ضد المستهدفات التي حرمت على إنتاجها، الحبوب المضاد

يكون من أربعة سلاسل يتهدية، سلسلتين خفيتين وسلسلتين ظاهرتين. تصل سلاسل التفهيم فيما بينها وبالسلاسل الخفيفة بواسطة أربعة حسوز ثالثة الكروبيت. تحتوي السلاسل على منطقة متغيرة ومنطقة ثابتة.

تعدى الجسم المضاد على موقعين لتشييد المحددات المستضدية، يتشكل كلاهما من خمائين السلاسل الخفية والتقبيلية للمساواة المترتبة. كما يحتوى على موقع لتشييد على المستقبلات الفشائية النوعية للحلالها الناتجة يوجد في بداية السلسليتين التقبيلتين في الجزء الثابت.

لستقبل العثماني للمقاومة LB له نفس بنية الجسم المضاد على شكل حرف Z. يترك من سلسليتين متصلتين ترك كل منها من حوالي 450 حمض أميني وسلسلتين خفيفتين متصلتين ترك من حوالي 200 حمض أميني. السلسلة مرتبطة بمحسور ثانية الكربون. يرتبط الجزء بالغشاء المبوبلي آخر، الثابت من السلاسل الثقلية حيث ينبعض طرفيها في المبوبلي.



سے تھوڑی بڑی الحجم افلاز

#### ■ تحارب الكشف عن الأجسام المضادة (البروتينات)


- تفاعل بيوري:** نضيف للمصل كبريتات النحاس  $\text{CuSO}_4$  والصودا  $\text{NaOH}$ , فيظهر لون بنفسجي.  
**تفاعل الأصفر الأحمر:** نضيف للمصا حمض الازوت  $\text{HNO}_3$  مع التسخين، فيظهر لون أصفر.

**السلسلة الفرعية****علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء**

- المصلقة المتميزة للجسم المضاد تتركب من حوالي مائة (100) حمض أميني.
- الجسم المضاد الذي تفرزه الخلية البلازماوية يماثل تماماً الجسم المضاد المناعي **BCR** لفنس الخلية **L.B.**
- يوجد حسدة (05) أنواع من الأجسام المضادة، تتركب كلها من نفس الوحدة (Y)، وتختلف في عدد الوحدات، وطول السلاسل الثانوية والحقيقة، وهذه الحسدة الكرياتية، وهي:
  - حسدة مضاد **IgG**: يحكون من وحدة واحدة ٢، يمثل ٦٧% من الأجسام المضادة المنصلية.
  - حسدة مضاد **IgA**: الثاني من حيث الكمية، ينحكون في التصل من وحدة واحدة ٢ وفي الإفرازات من وحدتين ٢ مرتضبيين، يفرز أساساً مع الإفرازات الخارجية: الدمع، اللعاب، المucus، المخاط.
  - حسدة مضاد **IgM**: الثالث من حيث كمية في المصل، تفرز الخلايا البلازماية في بداية تكاثرها ويكون من ارتباط حسدة (5) ووحدات ٢. يوجد منه نوع غشائي (**BCR**).
  - حسدة مضاد **IgD**: كميته قليلة جداً في المصل، ينحكون من وحدة واحدة ٢. يتواجد أساساً على غشاء الخلية **L.B** حيث يمثل **BCR**. دوره في المصل لم يوضح بعد.
  - حسدة مضاد **IgE**: الأقل كمية في المصل. ينحكون من وحدة واحدة ٢، يفرز في نفاعلات فروط الحساسية.

**5-5. معقد مناعي**

هو الارتباط النوعي للجسم المضاد بالمستضد الذي حرض على إنتاجه لوجود تكامل بيوي بين موقع التكثيف ومحدد المستضد.




رسم تخطيطي يمثل كثيبة نشكل المعقد المناعي

**أ. أنواع المعقدات المناعية**

- ارتصاص: ارتباط أجسام مضادة مع مستضدات غير منحلة (كريات دم حمراء، بكتيريا، فيروسات...).
- توسيب: ارتباط أجسام مضادة مع مستضدات منحلة (بروتينات، سكريات...).
- تشكيك المعقدات المناعية يعدل من نشاط المستضدات فقط (تعيها، تمنع تكاثرها وانتشارها وتبيّنه) حتى تتدخل السالعات وتختفي منها.

**السلسلة الفرعية****رحلة (04) دور بروتينا في جسم من الماء****ب. التخلص من المعقد المناعي**

- ينحصر النهائي من المعقد المناعي بواسطة عملية البلعمة والبلعمة وفق المراحل التالية:
  - تكثيف: يشتت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية التوعية للبلعوميات الكثيرة بواسطة موقع التكثيف في الجزء الثالث للجسم المضاد لوجود تكامل بيوي.
  - إبعاد: تحيط الخلية البلعومية المعقد المناعي بأرجل كاذبة.
  - إدخال: يتشكل حويصل افتراضي يحوي المعقد المناعي.
  - هضم: تحرير المعقد المناعي بالإلتزمات الحالة التي تصيبها الليبروزومات في حويصلات الافتراض.
  - إطرح: تطرح البقايا بظاهرة الإطراف الخلوي.




رسم تخطيطي يمثل مراحل تحرير المعقد المناعي

**غريب المعقد المناعي بتدخل عناصر المُتّهم**

عنصر المُتّهم هي حوالي 20 بروتيناً تُركب في الكبد وتتوارد في مصل الدم بشكل خامل، وبعد تشكيل المعقد المناعي تنشط بارتباط أحدها على موقع خاص به في الجسم المضاد، ويؤدي ذلك إلى تشكيل معقد الهجوم الغشائي **CAM** الذي يشكل قنوات في الغشاء الخلوي للمستضد. تسمح هذه القنوات (الثقوب) بدخول كميات كبيرة من الماء إلى الخلية المستضدية مسببة انفجارها بصفة طولية بسبب دخول الماء والأملاح عبرها.

هي استجابة مناعية لا تتم بتدخل الأجسام المضادة وإنما تتضمن الخلايا البالعنة والخلايا المقاوية T التي تفرز جزيئات متعددة استجابة لمولد الضد.

### تجربة تظهر الاستجابة الخلوية ضد عصيات كوخ (BK)




### المراحل التجريبية والملاحظات

- حقن حيواناً بـ BCG، فيكتسب مناعة ضد عصيات كوخ الممرضة.
- نقل الخلايا المقاوية من هذا الحيوان المحسن إلى آخر غير محسن يكتسب مناعة ضد الـ BK.
- نقل العصيل من هذا الحيوان المحسن إلى آخر غير محسن لا يكتسب مناعة ضد الـ BK.
- النتيجة: نوع الاستجابة ضد عصيات كوخ هي مناعة ذات وساطة خلوية.

- عصيات كوخ (BK) بكتيريا عصوية (شكلها متغراول) تسبب مرض السل (الدرن)، تصيب الرئتين أساساً (الجهاز التنفسى) ويمكن أن تصيب بعض الأعضاء الأخرى.
- عصيات كالميت وغيران (BCG): عصيات كوخ مضعفة وغير ممرضة (أنانوكسين). وهي اللقاح الذي تأخذه مباشرة بعد الولادة للوقاية من مرض السل.

1-6- منشأ الخلايا LT واكتساب كفافتها  
تشكل الخلايا المقاوية LT في نخاع العظام وتسمى خلايا طلائعية (لا تحمل TCR). تاجر إلى الغدة السعوية (الثيموسية) لتنامي حيث تركب مستقبلات غشائية نوعية تسمى TCR. يوجد في الغدة خلايا



(تم تخطيطي مثل مراحل الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلطية)

عارضة (CPA) مسؤولة عن عملية الانتقاء، تعرّض على سطح غشائتها بيتايدات الذات رفقة جزيئات الـ HHLAI، ويوجد احتمالين:

- يحدث انتقاء إيجابي للخلايا التي تحقق الشرطين التاليين: يُعرف TCR على HLA ولا يُعرف على بيتايدات الذات. هذه الخلايا تتضاع وتصبح مؤهلة مناعياً، وهاجر من الغدة السعوية إلى الأعضاء المُقاومة لتنتحق بالدفاع عن العضوية.

- انتقاء سلبي للخلايا التي لا تتحقق أحد الشرطين السابقيين أو كليهما: لا يُعرف TCR على HLA أو يُعرف على بيتايدات الذات. ترسل إليها إشارة موت فتموت بظاهرة الانتحار الخلوي. نسبة الخلايا المُنتفقة إيجابياً حوالي 5%.

وأنواع الخلايا المؤهلة مناعياً:

- LT8: تُعرف على HLAI وتحمل مؤشر CD8، لها تسمى كذلك TCD8.

- LT4: تُعرف على HLAII وتحمل مؤشر CD4، وتسمى كذلك TCD4.

المُؤشرات CD4، CD8 جزيئات ذات طبيعة غликوبروتينية.

تشمل الخلايا المُقاومة (كريات بيضاء) في نفسي العظام انطلاقاً من خلايا جذعية مثل كل الخلايا المدعومة، المُقاومات التي تبقى في نفسي العظام وتواصل نضجها في تصريح المُقاومات بالية LB، والتي تهاجر نحو البيموس تصريح المُقاومات تائية (LT)، ونوع ثالث يبقى في الدم ويصبح القائمة الطبيعية (NK) وتتدخل في المناعة الطبيعية.

#### 6- انتقاء فليل الخلايا LT8


انتقاء المُقاومات LT الذي يتم داخل البيموس لاكتسابها الكفاءة المناعية. أما هذا الانتقاء فيتم في الأعضاء المُقاومة الخيشية لتعريف الخلايا LT على اليبيد المستضدي وحيثها على استجابة نوعية ذات وسادة حلوية.

#### آلية انتقاء الخلايا LT8

تعرض الخلية المصابة محمد المستضد اليبيدي رفقة الـ HLAI على سطح غشائتها ويسى معقد عديد المستضد، كما أن الخلايا العارضة تعرّض هنا المعقد كذلك. ويتم انتقاء ملة من الخلايا LT8 التي تحمل مستقبلات غشائية (TCR) تكامل بنيوا مع الـ HLAI ومعدد المستضد في نفس الوقت، وهذا ما يعرف بالتعرف المردود. يؤدي التعرف المردود إلى تشريح الخلايا للتنفس، فتكاثر ويتمايز بعضها إلى خلايا سامة LTc والعوض الآخر إلى خلايا ذاكرة LT8m.

#### ٣- تحرير تظاهر مصدر الـ LTc.

يُعرف التعرف على أصل الخلايا التائية السمية LTa لخضن خلايا LT8 في وجود خلية مصابة محرضة بعد 40 ساعة من العرض تحصل على خلايا لها القدرة على الشناط السمي قادر على تخريب خلايا مصابة. تقتل الوظيفة التالية تطور بعض الطواهر الخلوية التي تطرأ على LT8 مع مرور الزمن إنما زرعها في وسط يحتوي على خلايا مصابة.



#### ٤- التفسير

معنى استخراج ADN: بمجرد انتقاء الخلايا LT8 ذات المستقبلات المُواهبة (TCR) من طرف مواد الضد تتشعّط الخوارث التي تحكم في بناء مستقبلات الأنترولوكينيات فتنفس ARNm مضر تركيب البروتين: هي البروتينات التي تنتج عن ترجمة الـ ARNm السابق والتي تتشكل منها مستقبلات الأنترولوكينيات لتصبح LT8 المحسنة تملك مستقبلات الأنترولوكينيات.

معنى التثليل الخلوي: يعبر عن التحوّلات العميقية التي تتعرض لها LT8 المحسنة لكي تتمايز إلى LTc من أجل ذلك تحدث ظواهر عديدة أهمها:

- استغلال الخلايا للدخول في الانقسام تضاعف الـ ADN الخاص بها (معنى تضاعف الـ ADN)
- تتعرض لسلسلة من الانقسامات الخيشية المتزايدة فتكاثر (معنى الانقسام الخيشي المتزاوي)
- تُخلى في نفس الوقت جزيئات البروفورين التي تخزنها في حويصلات هيلولية تتحول إلى سمية LTc (معنى اكتساب السمية)

#### ٥- الاستخلاص

##### ٣-٦. تمايز صنف من الخلايا LT8 المتميزة بالمؤشر CD8

###### أ- التخلص من الخلايا المصابة

- شروط تخريب الخلايا LTc للخلايا المصابة
- الخلايا مصابة بنفس الفيروس الذي انتقى المُقاومات LT8 ونشطها لتمايز إلى LTc.
- الخلايا المصابة والخلايا LTc من نفس الفرد (تحمل نفس الـ CMH).

■ تجربة المعالجة بالفيروس LCM تظهر شروط تخريب الخلايا المصابة من طرف الـ **LTC**  
تجربة: تؤخذ سلالتين من الفيروس 1 و 2 مختلفي النوع (MH), تعامل السلالة 1 بفيروس LCM الذي يصيب الخلايا العصبية، بعد سبعة أيام تؤخذ خلايا لمذكرة من النوع (LTC) من طحال الفار 1 وتنتقل إلى أربعة أو سطاط مختلطة الشروط التجريبية ونتائجها ممثلة في الجدول.


الوسط 1: علبة يترى بها خلايا عصبية للفار 1 مصابة بفيروس LCM	نسبة 90% من الخلايا العصبية خربت	LTC
الوسط 2: علبة يترى بها خلايا عصبية للفار 1 غير مصابة	عدم تخريب الخلايا العصبية	LTC
الوسط 3: علبة يترى بها خلايا عصبية للفار 2 مصابة بفيروس LCM	عدم تخريب أي خلية عصبية	LTC
الوسط 4: علبة يترى بها خلايا عصبية للفار 1 مصابة بفيروس آخر	عدم تخريب أي خلية عصبية	LTC

- ❖ شروط تخريب الخلايا العصبية من طرف الـ **LTC**:
  - الخلايا المصابة والخلايا LTC من نفس السلالة (ممثلة بالـ CMH).
  - الخلايا المصابة بنفس الفيروس الذي حرض على إنتاج الخلايا LTC.

#### بـ- آلية تخريب الخلية المصابة

- تخرب الخلايا LTC الخلايا المصابة في مرحلتين:
- التعرف للزدوج: تعرف الخلايا LTC بواسطة الـ TCR على الـ HLAI ومحدد مولد الصد المعروضين (اللدينين) على غشاء الخلية المصابة.

- التخريب: يثير تماس الخلايا المقاوية LTC مع المستضد خلال التعرف المزدوج إفراز بروتين البروفرين بعض الإنزيمات الحالة. يشكل البروفرين ثقوباً في أغشية الخلايا المصابة تؤدي إلى انحصارها بضدية حلولية.




بالرغم من أن خلايا الجهاز المناعي قادرة على إنتاج الملايين من المستقبلات الغشائية المختلفة إلا أن نفس الخلية تحمل مستقبلات غشائية متماثلة.

**رسالة 04: دور البروبيوتات في الدفاع عن الذات**

- ١- تقوية الخلايا المناعية
- ٢- إخلايا البالغة


تم تنشيط الخلايا المخانية بافتراضها للمستضد وعرض محدوداته رفقة الـ HLAI والـ HLAI على سطح غشائتها. ثم تفرز الأنترلوكين HLII لتنشيط الخلايا المخافية LB وLT4 و LT8 وجذب الـ LT8 على المحدد المعروض مع الـ HLAIII تعرفا مزدوجا، كما تجذب الـ LT8 لتعرف على المحدد المعروض مع الـ HLAI تعرفا مزدوجا كذلك. يؤدي التعرف المزدوج إلى تنشيط الـ LT4 و LT8 لتركب ببتيدات الأنترلوكين 2.



LTh لغات - 2-7

تم تحفيز الخلايا المناعية LB و LT بواسطة الخلايا المعاوية المساعدة LT4 من تمايز الخلية LT4 .  
تم تحفيز الخلايا LT4 من تمايز الخلية LT4 .  
تم تحفيز الخلايا LT4 الدور المحوري في الاستجابة المناعية النوعية الخلطية والخلوية لأنها تحفيز الخلايا LB و LT4 .  
النتيجة على التكاثر والتمايز .  
أ: إكزات أنها الأنتلوكين 2 (IL2) .


**النوكرون 2** حزبنة كيميائية ذات طبيعة غليكوبروتينية.  
تم تأثيرها، الخلية LT4 تحتكر في مقدار (قوة) الاستجابة وتبطئها بعد التخلص من المستضد، لذا تختفي الاستجابة النوعية.



رسم تخطيطي يمثل مراحل الاستجابة المنساوية النوعية ذات الوساطة الخلوية

### ٣) تجربة ماربروك تظهر التعاون بين الخلايا المناعية

الخلايا المنفذة للأجسام المضادة عدد $7 \times 10^5$ من خلايا الـT	السلسلة الفعلية المؤديحة في	الخلايا المنفذة للأجسام المضادة	
		الغرس العلوية	الغرس السفلية
960	T + B	1	
72	B	2	
1011	B	3	T



**تجربة وملاحظة:** في وجود خلايا لعقوبة LB و LT4 محسنة بنفس المستضد على تماشٍ مباشر، أو مفصولة بغشاء ثقلي للجزيئات، تُحرز كمية كبيرة من الأجسام المضادة.

- في وجود الخلايا LB المحسنة منفردة، تُحرز كمية قليلة جدًا من الأجسام المضادة.

**نتيجة:** إنتاج أجسام مضادة بكمية كبيرة يتطلب التعاون بين الخلستان LB و LT4.

### ٧- آلة التحفيز

بعد تعرف الخلايا LB و LT4 للموئل مناعياً على محددات المستضد، تُنشط وتُركب على أغشيتها مستقبلات غشائية خاصة ، IL2. تُحرز الخلايا LT4 النشطة لا IL2 الذي يحفز تكاثرها لتشكل ملة من LT4 المنتمية، يشارب بعضها إلى LT1 مفرزة لا IL2 وبعض الآخر إلى LT4m ذاكرة، يرتبط لا IL2 بمستقبلاته الغشائية النوعية للخلايا LB و LT8 و يكتنفها على التكاثر و الشمارب إلى خلايا بلازمية و LTc على الترتيب وخلايا ذاكرة.

**دور الخلايا المناعية:** العارضة: التحسس، LT4: التحفيز، LB و LT8: التنفيذ.

### التشييه المزدوج

يجب أن تُنشط الخلايا المقاومة LB و LT4 و LT8 و LTc تشييضاً مزدوجاً لكي تتكاثر وتساير وتحدث استجابة مناعية:

- التشييه الأول (التحسيس): يتمثل في تعرف الخلايا LB و LT على محدد المستضد.

- التشييه الثاني (التحفيز): يمثل في ارتباط الأنترلوكين مستقبلاته النوعية على غشاء LB و LT.

### ٨- اختيار نمط الاستجابة المناعية

يوجد نوعين من الخلايات المستهدفة للمستضدات وهو ما يحدد نمط الاستجابة المناعية.

يتمثل في جزيئات منحلة في المصل أو كائنات دقيقة ذات تكاثر خارج خلوي.

استجابة خلطة لأن المستضد يتنقّل له من LB فينشطها لتكاثر وتساير إلى بلازموسين.

**النوع الثاني:** محددات مستهدفة داخلية للأشارة.

هي بسيطات تتركب داخل نوعين من الخلايا:

**السلسلة الفعلية**

٤- دور البروتينات في الدفاع عن الذات


- خلايا مصابة بفيروس: ترکب بروتينات فيروسية لأن الفيروس يحرر فيها مادة الوراثة (ARN أو ADN).
- خلايا سرطانية: ترکب بسيطات غريبة عن العضوية تمثل في محددات ذات HLA غير طبيعية (ذات بغيرة).

هذا النوع من المحددات يولد استجابة خلوية. تعرض الخلايا الفيروسية أو السرطانية محددات المستضد ليجدي رفقه الـ HLAI فتشط الخلايا LT8 وتساير إلى LTc.

بعض المستضدات تثير الاستجابتين الخلطية والخلوية في نفس الوقت. مثلاً: يغزو العضوية فيروس أو بكتيريا ويسري في المصل فيحصل الخلايا LB و LTc ويشير استجابة خلطية، ثم يغزو الخلايا فيثير استجابة خلوية.

توجد الخلايا المقاومة في الدم واللمف والأعضاء المقاومة الخبيثية فقط. بينما المستضدات تصيب مختلف أنسجة العضوية، فكيف تلتقي المقاوميات بالمستضدات دائمًا؟

أحد أنواع الخلايا البالعنة تسمى المتغصنة تواجد في الأنسجة، تقوم باقتناص وبلعة المستضدات ثم فاجر إلى العقد المقاومة وتحول إلى خلية عارضة، تعرّض محددات المستضد للبحث على استجابة مناعية ضده.




١.٩ الفيروس VIH

يكون غشاء الفيروس من طبقة  
بروتينية تخللها وسفليدية  
نهاية جزء منها ضمبي يدعى  
gp41 والآخر، الآخر مرتبط به على  
سطح الخارجي يسمى gp120.  
يوجد بداخله محفظتين بروتينيتين  
(P17 و p24/25)، كما يحتوي على  
سلسلة ARN، إنzym الاستنساخ  
المكسي وإنzym الإدمان.


بـ- الخلايا المستهدفة للفيروس VIH

يُحدث الفيروس الخلايا المقاومة LT4 لوجود تكامل بنوي بين المستقبل الغشائي CD4 للخلايا LT4 وبمثيل المستضد الفيروسي (gp 120) للفيروس.

غشاء الخلية المصابة غير مستوي حيث تظاهر عليه تبرعمات غشائية عديدة تعود إلى تطور الفيروس داخل الخلية ثم خروجه منها عن طريق التبرعم.



التكامل النموي بين gp120 و CD4



تتم دورة حياة الفيروس VIH داخل الخلية T4 في ثمانية (08) مراحل:

- ثبيت: يثبت الفيروس على المستقبل الغشائي CD4 للخلية T4 بواسطة البروتين gp120.
- دخول: تدخل مكونات الفيروس إلى الخلية T4 بواسطة البروتين 41 gp الذي ينفتح.

- تخليص من المحفظة: يفرغ الفيروس محتواه في الجلوبول.

- نسخ عكسي: ينسخ ADN انتلاقاً من ARN الفيروس بفضل إنزيم الاستنساخ العكسي.

- اندماج: يندمج ADN الفيروس ضمن ADN الخلية بفضل إنزيمات الإدماج الفيروسية.

- ترجمة: تُترجم مورثات الفيروس إلى ARNm يترجم إلى مكونات الفيروس.

- تجميع وترقّم: تتحمّل مكونات الفيروس وتحاطب بقطعة من الغشاء الظهاري خلال التبرعم مشكلة فيروساً جديداً.

- تحرير: تتحرر الفيروسات.

دور مكونات الفيروس في إصابة الخلية LT4

- gp 120: ارتباط الفيروس VIH بالمستقبل الغشائي CD4 للخلية T4.


- gp41: دمج غشاء الفيروس مع غشاء الخلية المستهدفة.

- ARN: يحمل المعلومات الوراثية الخاصة ببروتينات الفيروس.

- إنزيم الاستنساخ العكسي: نسخ ADN الفيروسي إلى ADN فيروسي داخل الخلية المصابة.

- إنزيم الإدماج: دمج ADN الفيروس مع ADN لـ LT4.

**ملاحظة:** VIH فيروس ارتجاعي (فيهري) لأن مادته الوراثية ARN بدلًا من ADN.



### السلسلة الفضفاضة

#### 3-9. مراحل الإصابة بالفيروس VIH

تم الإصابة بالفيروس VIH في ثلاث مراحل.

##### 1- مرحلة الإصابة الأولى

مدتها قصيرة تغير من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر، تتميز بارتفاع كبير في شحنة الفيروس (عدد نسخ ARN) في ملليلتر من بلازما الدم) وتنقص عدد المقاوميات LT4.

بعد الإصابة مباشرة، تهاجم الفيروسات الخلايا LT4 وتتكاثر فترتفع شحنة الفيروس وتنقص عدد الخلايا LT4.

يتسبّب الجهاز المناعي وتنشط الخلايا T4 وتتكاثر وتتمايز إلى LT4 فترتفع عددها بعد أسابيع تنشط الخلايا LT8 التي تعرف على الخلايا T4 المعاكسة فترتفع عدد الخلايا LTc بشكل كبير، كما تنشط الخلايا T4 الخلايا LB الحساسة فتتكاثر وتتمايز إلى خلايا بلازما تفرز الأجسام المضادة ضد gp120 في نهاية هذه المرحلة.

في بداية هذه المرحلة الشخص المصاب يحمل الفيروس ولكن مصله سلي أي لا يحتوي على أجسام مضادة ضد gp120.


##### بـ- مرحلة الترقب (الإصابة بدون أعراض)

مدتها طويلة قد تصل 15 أو 20 سنة، تتميز بارتفاع بطيء في شحنة الفيروس، وتنقص عدد LT4. في هذه المرحلة، الجهاز المناعي لا يزال وظيفياً، فالخلايا Th تنشط الخلايا LT8 وLB وتتكاثر وتتمايز إلى خلايا سامة تقضي على الخلايا T4 المعاكسة وهذا ما يفسّر وجود كمية كبيرة من الخلايا LTc وتنقص الخلايا T4 تدريجياً، وتتمايز LB إلى بلاموسوست متحركة للأجسام المضادة فتشبّط الفيروسات وهذا ما يفسّر وجود الفيروس بكثافة قليلة.

في هذه المرحلة الشخص المصاب ذو مصل إيجابي، أي يحتوي على الأجسام المضادة ضد البروتين الغيرoshi (gp120).

##### جـ- مرحلة العجز المناعي (السيدا)

تتميز بارتفاع حاد في شحنة الفيروس، وانخفاض عدد الخلايا LT4 إلى أقل من 200 خلية في ملليلتر. في هذه المرحلة، يصبح الجهاز المناعي غير وظيفياً لأن عدد الخلايا LT4 يصبح أقل من 200 خلية في ملليلتر وهذا العدد لا يكفي لتنشيط الخلايا المناعية LT8 وLB فتنقص بدورها بشكل سريع، وبالتالي ترتفع شحنة الفيروس وتتصبح العضوية عرضة لأي مستضد يهاجمها مسبباً الأمراض الانتهازية.



لا يستطيع الجهاز المناعي القضاء على الفيروس لأسباب ثلاثة:

- يميز الفيروس VIH بكثرة الطفرات على مستوى البروتين gp120 (عدد المستهد)، وكلما افترزت هذه أجسام مضادة يغير بنبيه ولا يمكن الارتباط وتشكل معقدات مناعية.
- يتخلّق الفيروس من الخلايا المصابة إلى الخلايا السليمة.
- تخرب أغشية الخلايا المصابة على البروتينات الغيرoshi (gp120 و gp41) وتلعب دور الفيروس وتنقل العدوى للخلايا السليمة.

نوع الاستجابة المناعية ضد الفيروس VIH: خلطية خلوية في نفس الوقت.

**فصلة**

يشمل دور البروتينات في الدفاع عن الذات في:

**التمييز بين الذات واللادات:** بفضل جزيئات غشائية بروتوبينية، تعارف خلايا العضوية وتنقص بنساء مناعي فيما بينها وترفض كل ما هو غريب، تمثل هذه الجزيئات في المستضدات الغشائية: HLA، مستضدات الزمرة الدمعوية A وB ومستضد عامل البزلوس-D.

**العمر على المستضدات:** بواسطة مستقبلات غشائية نوعية ذات طبيعة بروتوبينية تمثل في الـ BCR والـ TCR.

**المؤشرات غليكوبروتوبينية:** تمثل في الـ CD4 والـ CD8.

**الاتصال بين الخلايا المناعية:** تتحصل الخلايا المناعية لتحسين بعضها يوجد المستضد والتحفيز على تكاثر وتنمية بواسطة مبلقات كيميائية ذات طبيعة غليكوبروتوبينية تسمى السبوتكتينات (الأنترولكتينات IL2، IL1).

**الخلاص من المستضدات والخلايا المصابة:** بواسطة جزيئات ذات طبيعة بروتوبينية تمثل في الأجسام المضادة أو التي تشكّل معقدات مناعية تثبت على مستقبلات غشائية بروتوبينية على غشاء البلاعم ليتم تخفيض منها، أو بواسطة بروتينات البروفورين التي تخرب الخلايا المصابة.


## ١٠- جزء التمارين

## نماذج عن التمارين الأول

## ٥١- التمرين ٥١

يتوقف الانتقاء النسيلي للمفاويات على مصدر الببتيد المستضدي المقدم من طرف الخلايا العارضة، وبالتالي يتحدد نمط الاستجابة المناعية النوعية.

للتعرف على تغطى الاستجابة تُفتح الوثيقة التالية:



١- سم العناصر المرقمة من ١ إلى ٦، ثم تعرف على المحتلين نوع وغطى الاستجابة أ وب.

٢- اشرح دور ومصدر المستضد في انتقاء المفاويات وتتحدد نمط الاستجابة المناعية النوعية انطلاقاً من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

## الإجابة النموذجية

## ١- تسمية العناصر


١- بروتين فيروسي، ٢- مولد ضد مستدخل، ٣- معقد HLAI - بيتيد مستضدي، ٤- معقد II - HLAI، ٥- مولد ضد، ٦- LTc، ٧- T4، ٨- الخلية (S)، ٩- خلية مصابة بفيروس، ١٠- الخلية (U) - عارضة (CPA).

نمط الاستجابة (أ): خلوية، نمط الاستجابة (B): خلطية.

٢- الشرح

يوجد نوعين من المستضادات ونوع المستضد يحد نمط الاستجابة المناعية.

النوع الأول: المستضادات الخارجية للمنشأ (مستدخلة)



- قائم تعرضاً للذات والالذات ثم قارن بين الجزيئات المميزة لكل زمرة دموعية.
- بالاعتماد على معطيات الوثيقة ومكتسباتك:
- أكتب نصاً علمياً تشرح فيه سبب اختلاف النمط الظاهري على المستوى الخلوي في نظام (ABO).

## ٥٤- دور البروتينات في الدفاع عن الذات

يتمثل في جزيئات منحلة في المصل أو كائنات دقيقة ذات تكاثر خارج خلوي. هذا النوع يعرض استجابة خلطية.

إن المستضد ينقى له من LB فينشطها لتكاثر وتنما إلى بلازموسيت.

النوع الثاني: مستضادات داخلية المنشأ

هي بنيات تتركب داخل نوعين من الخلايا:

- خلايا مصابة بفيروس: تركب بروتينات فيروسية لأن الفيروس يحرر فيها مادته الوراثية (ARN أو ADN).

- خلايا سرطانية: تركب بنيات غريبة عن العضوية تتمثل في محددات ذات HLA غير طبيعية (ذات متغيرة).

هذا النوع من المستضادات يولد استجابة خلوية. تعرض الخلايا الفiroسية أو السرطانية محددات المستضد الببتidi

رقة (HLAI) فتشط الخلايا LTc وتنما إلى LTc.

## ٥٢- التمرين ٥٢


عمل الخلايا الحية عدة جزيئات غشائية مميزة للذات من بينها مؤشرات نظام (ABO) الذي يميز كريات الدم الحمراء التي تشكل مستضادات يُشفّر لها همزة محمولة على الصبغى رقم 09 عند الإنسان. ظهر هذه المورثة بثلاث أليلات (١٠ ، ١١ ، ١٢) بحيث ١٠ و ١١ مائلتان بالنسبة لـ ١٢ المتوجة بينما بين ١٠ و ١٢ غياب السادة.

قائم معطيات الوثيقة المولالية معلومات حول المؤشرات الغشائية في نظام (ABO).

سبب اختلاف النطاط الظاهري على المستوى الخلوي في النظام (ABO) وراثي، وهو اختلاف إيلات المورثة المحملة على الصبغي رقم 09 المنشورة لمؤشرات الزمرة الدموية، بحيث تتنج عن هذه الإيلات 04 أنماط ظاهرية تتمثل في الزمرة الدموية الأربع A، B، AB، و O.

### كـ التمرين 03

تقوم اللعوبات بنشاطات مختلفة لحماية العضوية بما تملكه من جزيئات بروتينية غشائية خاصة.  
مثال الوثيقة التالية بعض نشاطات خلية بالاعة.



### الوثيقة

- تعرف على مختلف الجزيئات الغشائية السطحية للباعلة.
- استخرج من الوثيقة النشاطات التي تقوم بها الباعلة.
- اشرح في نص علمي دور مختلف الجزيئات الغشائية في قيام الباعلة بوظائفها المختلفة.

### الإجابة النموذجية

- 1- الجزيئات الغشائية السطحية للباعلة (CMHII) والـ CMHIII والمستقبلات النوعية للجزء الثابت للجسم المضاد.
- 2- نشاطات الباعلة

- لعمـة المـعـقد المـنـاعـي
- تقديم البيـتـيـدـالـسـتـضـدـي
- لـعـمـةـالـمـسـتـضـد
- 3- نص علمي

دور مختلف الجزيئات الغشائية في قيام الباعلة بوظائفها المختلفة للبروتينات؟

تعمل البالعات نوعين من البروتينات الغشائية السطحية لها دور مختلف في الاستجابة المناعية.  
المجزئات المحددة للذرات CMHII و CMHIII: تقوم بواسطتها الباعلة بعرض المحدد المستضدي لتتعرف عليه المقاوميات LT، وتعرفا مزدوجا حيث تعرف LT8 على CMHII و LT4 على CMHIII.

- 1- تعريف للذرات والذادات: مجموع الجزيئات المحددة وراثياً وأخもملولة على السطح الخارجي لأنشـةـ خـلـاـيـاـ العـضـوـيةـ.
- يـصـطـلـحـ عـلـيـهاـ يـعـقـدـ الـ CMHـ،ـ النـظـامـ ABOـ وـنـظـامـ الـ رـيزـوسـ (Rhـ،ـ وهـيـ ثـنـيـ بـطاـقةـ الـ مـوـرـةـ الـ بـيـبـولـوـجـيـةـ لـلـفـردـ.
- تعـرـيفـ الـ ذـاـذـاتـ:ـ مـجمـوعـ الجـزـيـئـاتـ الغـرـيـبةـ عـنـ الـ عـضـوـيـةـ وـالـقـادـرـةـ عـلـىـ إـثـارـةـ اـسـتـجـابـةـ منـاعـيـةـ وـالـفـاعـلـةـ نوعـاـ مـعـ تـائـجـ الـ اـسـتـجـابـةـ لـلـفـضـاءـ عـلـيـهـاـ.

### المقاومة

تـشـلـ الـ وـثـيقـةـ مـعـلـومـاتـ عـنـ الـ مـؤـشـراتـ الـ غـشـائـيـةـ فـيـ الـ نـظـامـ ABOـ لـتـعـرـفـ عـلـىـ الفـرقـ بـيـنـهـاـ.

### أوجه الشابه

- جـزـيـئـاتـ غـلـيـكـوـبرـوـتـيـنـةـ مـعـلـوـمـةـ عـلـىـ غـشـائـيـةـ كـرـيـاتـ الدـمـ الـحـمـراـءـ.
- تـشـرـكـ فـيـ سـلـسـلـةـ سـكـرـيـةـ قـاعـدـيـةـ تـرـكـبـ مـنـ 5ـ سـكـريـاتـ بـسيـطـةـ.

### أوجه الاختلاف

- المستضد H: السلسلة السكرية القاعدية لا تحتوي على وحدة سكرية سادسة.
- المستضد A: السلسلة السكرية القاعدية تحتوي على الوحدة السادسة N أستيل غالاكتو أمين.
- المستضد B: تحتوي الجزيئـةـ المـحدـدةـ لـلـزـمـرـةـ عـلـىـ الـ وـحدـةـ السـادـسـةـ غالـاكـتوـزـ.

نـسـتـتـجـ أنـ نـوـعـ الـ وـحدـةـ السـادـسـةـ (ـالـسـكـرـ السـادـسـ)ـ يـحدـدـ نـوـعـ الـ جـزـيـئـةـ (ـالـمـسـتـضـدـ)ـ الـمـيـزةـ لـلـزـمـرـةـ الدـمـوـيـةـ.

### 2- نص علمي

تحـلـ الـ خـلـاـيـاـ الـ حـيـةـ جـزـيـئـاتـ غـشـائـيـةـ مـيـزةـ لـلـذـادـاتـ مـنـ بـيـنـهـاـ مـؤـشـراتـ الـ نـظـامـ (ABO)ـ.ـ هـذـهـ الـ مـؤـشـراتـ عـبـارـةـ عـنـ بـرـوـتـيـنـاتـ مـيـزةـ لـكـرـيـاتـ الدـمـ الـحـمـراـءـ وـيـتـنـجـ عـنـهـاـ أـرـبـعـ أـنـماـطـ ظـاهـرـيـةـ تـسـمـيـ الـ زـمـرـةـ الدـمـوـيـةـ.ـ فـيـاـ هوـ سـبـبـ اختـلاـفـ النـطـاطـ الـظـاهـرـيـ علىـ الـ مـسـتـوىـ الـ خـلـوـيـ فـيـ الـ نـظـامـ (ABO)ـ؟ـ

بـلـاتـ إـيلـاتـ (Aـ،ـ Bـ،ـ ABـ،ـ Oـ)ـ بـعـيـتـ 1ـ،ـ 2ـ،ـ 3ـ،ـ 4ـ سـائـدـتـانـ بـالـنـسـبـةـ لـ10ـ الـمـنـتـجـيـةـ وـلـاـ توـجـدـ سـيـادـةـ بـيـنـهـمـاـ.

الـنـظـامـ ABOـ،ـ وـغـيرـ الـأـنـماـطـ الـوـرـائـيـةـ الـثـالـثـيـةـ وـالـأـنـماـطـ الـظـاهـرـيـةـ الـنـاجـيـةـ عـنـهـاـ:

ـ إـذـاـ كانـ النـطـاطـ الـوـرـائـيـ (IIIـ)ـ أوـ (IVـ)ـ،ـ يـتـنـجـ عـنـ التـعـيـرـ الـمـوـرـيـ إنـزـيمـ Aـ وـظـيفـيـ يـقـومـ بـرـيطـ Nـ أـسـتـيلـ غالـاكـتوـزـ علىـ الـ مـسـتـضـدـ Hـ الـمـكـونـ مـنـ بـرـوـتـيـنـ وـسـلـسـلـةـ سـكـرـيـةـ قـاعـدـيـةـ وـيـتـشـكـلـ الـمـسـتـضـدـ الـغـشـائـيـ Aـ الـمـيـزـ لـلـزـمـرـةـ الدـمـوـيـةـ Aـ،ـ وـالـزـمـرـةـ الدـمـوـيـةـ طـنـاـ الفـردـ هيـ [A]ـ.

ـ إـذـاـ كانـ النـطـاطـ الـوـرـائـيـ (IIIـ)ـ أوـ (IVـ)ـ،ـ يـتـنـجـ عـنـ التـعـيـرـ الـمـوـرـيـ إنـزـيمـ Bـ وـظـيفـيـ يـقـومـ بـرـيطـ غالـاكـتوـزـ عـلـىـ الـ مـسـتـضـدـ Hـ وـيـتـشـكـلـ الـمـسـتـضـدـ الـغـشـائـيـ Bـ الـمـيـزـ لـلـزـمـرـةـ الدـمـوـيـةـ Bـ،ـ وـالـزـمـرـةـ الدـمـوـيـةـ هيـ [B]ـ.

ـ الـغـشـائـيـ Aـ وـالـإنـزـيمـ Bـ يـتـشـكـلـ الـمـسـتـضـدـ الـغـشـائـيـ Bـ،ـ وـالـزـمـرـةـ الدـمـوـيـةـ طـنـاـ الفـردـ هيـ [AB]ـ.

ـ إـذـاـ كانـ النـطـاطـ الـوـرـائـيـ (Vـ)ـ،ـ يـتـنـجـ عـنـ التـعـيـرـ الـمـوـرـيـ إنـزـيمـ غيرـ وـظـيفـيـ وـيـتـعـلـمـ كـرـيـاتـ الدـمـ الـحـمـراـءـ الـمـسـتـضـدـ الـغـشـائـيـ Hـ الـمـيـزـ لـلـزـمـرـةـ الدـمـوـيـةـ 0ـ،ـ وـالـزـمـرـةـ الدـمـوـيـةـ هيـ [O]ـ.


**السلسلة الفضية**

- المستقبلات الغشائية النوعية ل نهاية الجزء الثابت من الجسم المضاد: بواسطتها تثبت البالغة المعدن المنشاعية ليعتمدتها والتخلص منها.

بفضل هذه الجزيئات الغشائية البروتينية تساهم البالعات في التعرف على المستضد واقصائه.

**بر التمارين 04**

**ثامن العضوية بعض المستضدات**  
يؤدي إلى تركيب جزيئات دفاعية تعمل على إقصائها، إلا أن بعضها مثل عصبان الكراز المفرزة للتوكسين (سم) قد تنسق في مومها، مما جعل الإنسان ينفك في مساعدة عضوته للتصدي مثل هذه المستضدات المميتة بتصنيع الفحاحات.



يمثل الشكل (أ) صورة جزئية دفاعية، بينما يمثل الشكل (ب) نتائج المعايرة الدورية لكمية الجزيئات الدفاعية في مصل شخص مصاب.

١- أ- تعرف على الجزيئة الممثلة في الشكل (أ)، ثم منها برسم تخطيطي عليه كافة البيانات.

ب- سُم الظاهرة الناتجة عن ارتباط جزيئات الشكل (أ) بعصبيات الكراز ثم حدد أهمية هذا الارتباط.  
ج- حدد ما يميز الاستجابة الثانية من الشكل (ب).

٢- بين في نص علمي كيف يؤدي اللقاح إلى مساعدة العضوية في التصدي للمستضدات المميتة كعصبيات الكراز، انطلاقاً من الوثيقة ومعلوماتك.


**الإجابة النموذجية**

١- أ- التعرف على الجزيئة  
جسم مضاد.  
تمثيلها برسم تخطيطي

ب- تسمية الظاهرة

الارتصاص (تشكل العقد المناعي).  
أهمية هذا الارتباط: يربط تكاثر البكتيريا وانتشارها وإفرازها للمواد السامة وجمعها كي يسهل التخلص منها بعملية البلعمة.

ج- ما يميز الاستجابة الثانية  
من خلال الشكل (ب) نلاحظ أنه بعض  
الاستجابة الأولى بالمستضد ظهرت الأجهزة



اسم تخطيطي مثل نسبة الجسم المضاد

**الوحدة 04: دور البروتينات في الدفاع عن الذات**

لضادة بعد حوالي أسبوع. بينما بعد الإصابة الثانية بنفس المستضد فقد كانت الاستجابة مباشرة في نفس اليوم.

وكذلك، كمية الأجسام المضادة في الاستجابة الأولية قليلة وتقدر بـ ١ و.ب. بينما في الاستجابة الثانية وهي كبيرة وتقدر بـ ٣ و.ا.

والتالي الاستجابة الثانية تميز بالسرعة والفعالية مقارنة بالاستجابة الأولية.


**٢- نص علمي**

منذ الولادة، تحرى عدة تلقينات لإكساب العضوية مناعة ضد العوامل المرضية، فكيف يؤدي اللقاح إلى مساعدة العضوية على التصدي للمستضدات؟

عند دخول مولد ضد للعضوية للمرة الأولى، تتعاون الخلايا المنشاعية وتسنجي ضده باستجابة خلطية أو خلوكس، مما جعل الإنسان ينفك في مساعدة عضوته للتصدي مثل ذلك. بعد تناولها إلى  $LTh_{17}$  مفرزة للأنتروكين 2. تتميز هذه الخلايا إلى خلايا بلازما (و.) وتفرز جزيئات دفاعية وتتخلص من المستضد، كما يتمايز بعضها إلى خلايا ذاكرة. ولكن هذه الاستجابة الأولية التي تنتهي عن العامل الأول بالمستضد تكون ضعيفة وبطيئة تدوم لأسابيع وأحياناً لأشهر، فيشكل المستضد خطراً على العضوية، مثل عصبان الكراز التي تفرز سماً قاتلاً يؤدي إلى الموت.

إنفاقي هذا الخطير، يتم حقن العضوية بأناتوكسين (مثل الأناتوكسين التكروزي) وهو توكسين قادر على قدرته الأساسية ومحافظة بقدره المستضدية، فيبحث العضوية على استجابة مناعية مُسيّبة ليتم تركيب خلايا ملغوية ذاكرة  $LBm$ ،  $LT4m$ ،  $LT8m$  تتميز بمدة حياة طويلة تقدر بالسنوات. وفي حالة العامل الثاني ينبع المستضد (الاستجابة الثانية) تتدخل الخلايا الذاكرة وتتمايز مباشرة إلى خلايا منفذة للاستجابة ( $LTh_17$ )، خلايا بلازما ( $LTh_17$ ) تقوم بإنتاج مكثف للعناصر الدافعية وتتخلص من المستضد في وقت قصير وبشكل تعالى. وهكذا تكون العضوية قد أكتسبت مناعة (حصانة) ضد هذا التوكسين.

يشمل التلقيح في حقن العضوية بأناتوكسين أو مولد ضد غير فعال يكتب العضوية مناعة دائمة أو طويلة المدى، وتصبح قادرة على رد فعل سريع وقوى عند التعرض مع الجسم الغريب.

**بر التمارين 05**

دخول بعض المستضدات إلى العضوية يحرضها على إنتاج جزيئات متخصصة مصدرها خلايا الجهاز المناعي.  
لعرض معرفة دور بعض هذه البروتينات إليك الوثيقة الممثلة شرعاً من الرد المناعي.

أ- أسماء جزيئتين (س) و(ع)، ضع عنواناً مناسباً للوثيقة.  
ب- قدم رسمًا تخطيطياً تفسيراً لما قللته الوثيقة بحمل كافة السمات.

ج- حدد خط الرد المناعي المقصد، على.

د- باستعمالك للوثيقة وتوظيفاً لمعلوماتك وضح أن التعرض من النوعي للجزيئات (ع) مرتبط بتنوع الجزيئات (س)، ممراً دور الجزيئات (ع).

لبحث عن الإصابة الفيروسية في العضوية، يبحث في الدم عن وجود أجسام مضادة موجهة ضد فيروسات.

نرج في نص علمي كيف أن المصل الإيجابي هو نتيجة لإصابة فيروسية وكيف تسمح الأجسام المضادة بالمقاومة ضد الفيروسات.

### الإجابة الممدوحة

#### نص علمي

تعرف إيجابية المصل على أنها وجود أجسام مضادة نوعية في الدم (حالة الإصابة بالVH كمثال). لكن يكون المصل الإيجابي نتيجة لإصابة فيروسية؟ وكيف تسمح الأجسام المضادة بالمقاومة ضد الفيروس؟

#### أ- إيجابية المصل نتيجة لإصابة فيروسية

عند الإصابة تتنقل العضوية عدداً كبيراً جداً من نسيلات المقاويات B (LB) القادرة على التعرف على جميع أنواع العناصر الغشائية (المستضدات). عند دخول الفيروس للعضوية يتم التعرف على محدداته لاستهدافه بواسطة أجسام مضادة غشائية (BCR) التي تحملها واحدة أو العديد من نسيلات المقاويات (حيث لم يتم يغزوها هذا الفيروس من قبل). بعد هذا التعرف (الانقسام النسيلي) يفضل تدخل المقاويات LB يتم تشطيط هذه النسيلة المتقدمة لتكاثر وتنما إلى خلايا بلازمية مفرزة للأجسام المضادة النوعية هو نتيجة لإصابة

بـ الكشف عنها بواسطة اختبارات الدم المختلفة.

وجود الأجسام المضادة في المصل مؤشر على حدوث استجابة مناعية نوعية ذات وسادة حلية.

#### بـ الأجسام المضادة المقاومة ضد الفيروس

ونظر الجسم المضاد بالمستضد ارتباطاً نوعياً نتيجة التكامل البيني بين محددات المستضد وموقع ثبيت خارج مما على مستوى الجسم المضاد (تشكيل معقد مناعي). يؤدي تشكيل المعقد المناعي إلى إبطال تفعيل المستضد.

ثم التخلص من المعقّدات المناعية بعملية البلعمة، حيث يثبت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية

التي تتخلص من المعقّدات المناعية بعملية البلعمة، حيث يثبت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية كثافة

عند دخول المستضد إلى العضوية فإنه يتغير ملء من الخلايا المقاوية كذلك بمستقبلات غشائية كثافة

(BCR) بينما مع محدداته، هذه المستقبلات عبارة عن أجسام مضادة غشائية. تُشطط الخلايا LB المتقدمة

وتتكاثر وتنما إلى خلايا بلازمية تدخل الخلايا البالعنة والخلايا LT4. تفرز الخلايا البلازمية أجساماً

مضادة مائلة للأجسام المضادة الغشائية وتتكامل بدورها مع نفس المستضد الذي حضر على إنتاجها.

ترتبط الأجسام المضادة نوعياً مع المستضدات التي حضرت على إنتاجها مشكلة معقّدات مناعية تبطل

تفعيل المستضدات وتوقف انتشارها وتمنع تكاثرها وتسرع عملية البلعمة مما يؤدي إلى القضاء على

فيروسات أخرى ممكّنة: اللقاحات والعلاج الكيميائي.


### الإجابة الممدوحة

#### 1- تسمية الجزيئتين

س- مولد ضد، ع- جسم مضاد.

عنوان مناسب للوثيقة: ثليل ثلاثي الأبعاد للمعقد المناعي.

#### بـ رسم تخطيطي تفسيري



#### رسم تخطيطي مثل المعقد المناعي

#### ج- تحدد الرد المناعي

رد مناعي نوعي ذو وسادة حلية.

التحليل: العناصر المقدمة للاستجابة تتمثل في أجسام مضادة تسرى في الدم والممف (الخلط).

#### 2- التوضيح

يشير كل مستضد تحديداً مستضد مختلف، وتحمي الخلايا المقاوية كذلك بمستقبلات غشائية كثافة ومتعددة.

عند دخول المستضد إلى العضوية فإنه يتغير ملء من الخلايا المقاوية كذلك بمستقبلات غشائية كثافة

(BCR) بينما مع محدداته، هذه المستقبلات عبارة عن أجسام مضادة غشائية. تُشطط الخلايا LB المتقدمة

وتتكاثر وتنما إلى خلايا بلازمية تدخل الخلايا البالعنة والخلايا LT4. تفرز الخلايا البلازمية أجساماً


مضادة مائلة للأجسام المضادة الغشائية وتتكامل بدورها مع نفس المستضد الذي حضر على إنتاجها.

ترتبط الأجسام المضادة نوعياً مع المستضدات التي حضرت على إنتاجها مشكلة معقّدات مناعية تبطل

تفعيل المستضدات وتوقف انتشارها وتمنع تكاثرها وتسرع عملية البلعمة مما يؤدي إلى القضاء على

## بـ التمرن 07

يتفاعل الجهاز المناعي بمجرد ظهور غير المضدية من مصدر خارجي (مثل البكتيريا والفيروسات) أو داخلي. على مستوى العضوية يتدخل نوعان من التفاعلات المناعية، استجابة مناعية فطرية (طبيعية) مثل التفاعل الانهابي واستجابة مناعية مكسبة (نوعية). تدخل الماكروفاخ في كلا النوعين من الاستجابة، ولتوضيح ذلك الـ *الوثيقة* الآتية.



- 1- تعرف على مراحل البلعمة ثم حدد ماذا يمثل كل شكل من الشكلين (أ) و(ب).
- 2- اعتماداً على ما ورد في الوثيقة ومعلوماتك وضح في نص علمي كيف تدخل الماكروفاخ في التفاعل الانهابي ثم في التفاعل المناعي المكسبة.

## الإجابة النموذجية

## 1- مراحل البلعمة

- 1- الشتيت 2- الإاحتاطة 3- الاقتناص 4- الهضم 5- الإطراح .
- يمثل الشكل (أ) رسم تخطيطي لمراحل البلعمة خلال التفاعل الانهابي .
- يمثل الشكل (ب) رسم تخطيطي لمراحل بلعمة المعدن المناعي .


## 2- نص علمي

تشارك الماكروفاخ في الدفاع عن الذات في كلا النوعين من التفاعلات المناعية، الفطرية والمكسبة. فما هو دور الماكروفاخ في كل منها؟

1- عمل الماكروفاخ في التفاعل الانهابي

التفاعل الانهابي هو أول آلية تتدخل عندما يهاجم العامل المرضي الحاجز الطبيعي. تواجد الماكروفاخ في معظم الأعضاء.

تعرف الماكروفاخ بفضل مستقبلاتها الغشائية على جزيئات أو أجزاء منها الحمولة على سطح العامل المرضي كالبكتيريا والفيروسات. آليات التعرف ليست نوعية.



## بـ التمرن 08

نوع من مرض المقاويات **T** السامة (LTC) وتحضر مع خلايا مصابة بفيروس . الملاحظة الجهرية ممثلة في **الوثيقة المقابلة**:

- انطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعارفك، اختر الإجابة الصحيحة لكل مجموعة من المقترنات.
- أـ المقاويات **T** السامة (LTC) هي:
  - ـ خلية متخصصة تتدخل خلال الاستجابة المناعية النوعية (المكسبة).
  - ـ خلية غير متخصصة تتدخل خلال الاستجابة المناعية اللا نوعية (الفطرية).
  - ـ خلية غير متخصصة تتدخل خلال الاستجابة المناعية النوعية (المكسبة).

السلسلة الفقهيةعلوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

(B) للمقاويمات T السامة (LTC) هي خلايا متقدمة مصادرها:

- أ- تمايز المقاويمات B . ب- تمايز المقاويمات T CD4 . ج- غاز للمقاويمات T CD8 . د- تمايز الخلية

البلازمية (البلاسموسين).

() على إثر الاتصال الخلوي الممثل في الوثيقة للمقاويمات T تدمر الخلية المستهدفة:

- أ- عن طريق البلعمة . ب- عن طريق تشكيل معقد مناعي . ج- عن طريق تحرير جزيئات بروتينية . د-

عن طريق جذب البلاسموسين.

2- وضع في نص علمي كيفية ظهور المقاويمات T السامة في العضوية بعد الإصابة بفيروس.

الإجابة المودجة1- اختيار الإجابة الصحيحة

(A) أ ، ب (ج ، ج).

2- نص علمي

المقاويمات السامة هي خلايا متقدمة في الاستجابة المناعية النوعية تكون غير متواجدة قبل الإصابة

بالفيروس. فكيف تظهر هذه الخلايا بعد الإصابة بفيروس؟

المقاويمات LTC المتواجدة قبل الإصابة تحمل مستقبلات غشائية قادرة على التعرف على المستضد.

كل نسبة من LTC تحمل نوعاً واحداً من مستقبلات TCR قادر على التعرف على مستضد محدد.

يوجد الآلاف من نسillas LTC تختلف عن بعضها في TCR.

تشكل الخلايا LTC انطلاقاً من LTC نتيجة تعامل مناعي ينولد نتيجة الإصابة بفيروس. ستتعرض لمزيد

هذا التفاعل المناعي الذي أدى إلى ظهور (تشكل) LT.

أ- مميزات المقاويمات LTC

الـ LTC المتواجدة قبل الإصابة تحمل مستقبلات غشائية قادرة على التعرف على المستضد.

كل نسبة من LTC تحمل نوعاً واحداً من المستقبلات T (TCR) قادر على التعرف على مستضد محدد.

يوجد الآلاف من نسillas LTC تختلف عن بعضها البعض بواسطة مستقبلها الغشائي TCR.

ب- التعرف على المستضد بواسطة LTC

مثل كل المقاويمات T، LTC تعرف على المستضدات فقط عندما يتم عرضها على سطح خلية الجسم.

بواسطة جزيئات الـ CMH (HLA عند الإنسان).

الخلايا المقعدة للمستضد البيني للمقاويمات T هي خلايا عارضة للمستضد (CPA). وهي الخلايا

البالغة التي تتبع الفيروس وتخصمه جزئياً وتعرض أجزاء بيضاء للمستضد على سطحها مرفقاً بالـ CMH.

تنقل هذه الخلايا العارضة إلى العند المقاويمية المجاورة لمكان الإصابة.

على مستوى هذه العند المقاويمية يتم انتقاء (انتخاب) LTC التي تحمل مستقبل غشائي TCR قادر على

التعرف المزدوج على المعقد CMH - بيتد مستضدي.

ملاحظة: تعرف LTC كأنذلك على المعقد CMH - بيتد مستضدي المقدم من قبل الخلايا المصابة.

السلسلة الفقهيةوحدة: دور البروتينات في الدفاع عن الذاتج- التعاون بين المقاويمات LT4 و LT8


(+) التي تحمل مستقبلات غشائية نوعية قادرة على التعرف على المعقد CMH - بيتد مستضدي لفترة بواسطة CPA يتم انتخابها وتتماثل وتتماثل إلى LTC المفرزة لرسائل كيميائية تتمثل في الأنتروكينات.

تحت تأثير الأنتروكينات (الأنتروكين 2) تشغيل LTC المنسحبة، يؤدي ذلك إلى تكاثرها وتغييرها إلى LTC، يشمل هذا التمايز ظهور جزيئات البروفرين والإنزيمات الحالة مما يكسبها القدرة على تخريب الخلايا المستهدفة (المصابة بالفيروس).

خصائص التفاعلات المناعية تؤدي إلى إنتاج قوي من الخلايا المقاومة السامة LTC انطلاقاً من عدد صغير من المقاويمات LT8. تعمل LTC على تخريب الخلايا المصابة وبالتالي تحد من تكاثر الفيروس.

به التصريح 09

تتميز الأغشية الخلوية للعضوية بجزيئات مميزة ونوعية تحدد الطبيعة البيولوجية أو ما يعرف بالذات. ولهذا الفرض من الدراسة تعطي الوثيقة التالية:



- نظم في جدول البيانات المرقمة في الوثيقة من حيث: التسمية، الطبيعة الكيميائية، المثنا الوائلي، مفر التواجد، النظام الذي تنتهي إليه بالتحديد والزمرة التي تتبعها كل خلية.
- من خلال معطيات الوثيقة ومعلوماتك شخص في نص على سبب اختلاف الأنماط الظاهرة للأشخاص

الإجابة المودجة1- تنظيم البيانات في جدول

الخلية (ج)	الخلية (ب)	الخلية (أ)	النسمة
(4): مستضد غشائي A	(3): مستضد غشائي B	(2): مستضد غشائي H	الطبعة الكيميائية للثنا الوائلي
غشاء كريات الدم الحمراء	بروتين D	بروتين C	مفر التواجد
نظام ABO	غشاء كريات الدم الحمراء	الصيغي رقم 1	نوع النظم
A <sup>+</sup>	B <sup>-</sup>	Rh <sup>+</sup>	الزمرة الدموية
		0 <sup>+</sup>	

كـ التمرين 01

النـاعة هي جمـوع الآليـات الفـيـرـيـولـوـجـيـة التي تحـافظ على سـلـامـة العـضـوـيـة. وـلـكـنـ في بعض الأـحـيـانـ قدـ يـفـقدـ الجـهاـزـ المـنـاعـيـ قـدرـتـهـ عـلـىـ الدـافـعـ عـلـىـ الذـاـتـ نـتـيـجـةـ حدـوثـ اـضـطـرـابـاتـ منـاعـيـةـ.

الجزء الأول

بـنـ الشـكـلـ (أـ)ـ مـنـ الوـثـيقـةـ (01)ـ ثـلـاثـةـ أـمـراضـ Eـ،ـ Fـ وـ Gـ مـرـتـبـةـ بـعـزـزـ منـاعـيـ وـاـضـطـرـابـ لـكـلـ مـرـضـ.

الاضطراب المناعي للسبب له	المرض المرتبط بالعجز المناعي
تكاثر عشوائي للكريات البيضاء	E
غير ناضجة في مستوى نقي العظام (سرطان نقي العظام)	Leucemie
نقص كبير في إنتاج المقاويات B والخلايا البلازمية	F
عدم توفير الصاب على غدة سعوية أو امتلاكه على غدة سعوية بدالية (غير وظيفية)	Agammaglobulinemie
(Syndrome Di George)	G

الشكل (أ)

العليل	تأثير الاضطراب المسبب له على الاستجابة المناعية:		المرض
	الخلوية	الخeline	
			E
			F
			G

الشكل (ب)

الوثيقة (01)

لـتـصـادـاـ عـلـىـ مـعـطـيـاتـ الشـكـلـ (أـ)ـ وـمـعـارـفـكـ،ـ أـكـمـلـ جـدـولـ الشـكـلـ (بـ)ـ مـسـتـعـداـ الرـمـوزـ التـالـيـةـ:  
الـعـلـةـ (ـ)ـ فـيـ حـالـةـ التـأـثـيرـ السـلـيـ لـلـإـضـطـرـابـ المـنـاعـيـ عـلـىـ الـاسـتـجـابـةـ المـنـاعـيـةـ.  
الـعـلـةـ (+)ـ فـيـ حـالـةـ دـعـمـ التـأـثـيرـ السـلـيـ لـلـإـضـطـرـابـ المـنـاعـيـ عـلـىـ الـاسـتـجـابـةـ المـنـاعـيـةـ.

الجزء الثاني

نـظرـ بـعـضـ حـالـاتـ العـزـزـ المـنـاعـيـ زـرـعـ نـقـيـ العـظـامـ،ـ وـلـجـنـجـبـ رـفـضـ الـخـلـاـيـاـ الـلـوـرـوـرـعـةـ يـتمـ إـجـراءـ اختـبارـ  
الـتـوـلـقـ النـسـيـجـيـ الـذـيـ يـتـجـلـيـ فـيـ عـزـلـ مـلـقاـويـاتـ الـمـرـشـ للـتـرـعـ وـمـعـالـجـهـاـ مـادـةـ تـكـاثـرـهـاـ ثـمـ وـضـعـ هـذـهـ  
الـمـلـقاـويـاتـ فـيـ وـسـطـ زـرـعـ يـحـتـويـ عـلـىـ مـلـقاـويـاتـ الـشـخـصـ الـمـرـشـ لـلـرـعـ.ـ تـبـيـنـ الـوـثـيقـةـ (02)ـ نـتـائـجـ تـبـعـ  
نـظـرـ عـلـدـ الـمـلـقاـويـاتـ فـيـ وـسـطـ الزـرـعـ خـلـالـ إـحـدـيـ حـالـاتـ إـجـراءـ هـذـاـ الاـختـبارـ.

تـسـتـهـلـ الذـاـتـ فـيـ بـحـثـ عـنـ جـزـيـئـاتـ الـغـشـالـيـةـ الـتـيـ تـسـتـهـلـ إـلـىـ أـنـظـمـةـ مـعـيـنـةـ مـثـلـ النـظـامـ ABOـ وـالـنـظـامـ Rhـ حيثـ  
يـحـمـلـ كـلـ شـخـصـ أـحـدـ هـذـهـ جـزـيـئـاتـ وـالـتـيـ تـعـطـيـ تـفـرـداـ بـيـولـوـجـيـاـ.ـ فـمـاـ هـوـ سـبـبـ إـخـتـلـافـ هـاهـهـ الـأـنـماـطـ؟ـ  
غـيـرـ فـيـ النـظـامـ ABOـ أـربـعـ أـنـماـطـ ظـاهـرـيـةـ تـمـثـلـ فـيـ:

الـزـمـرـةـ الـدـمـوـيـةـ (A)ـ:ـ تـسـتـهـلـ بـوـجـودـ مـسـتـضـدـ غـشـائـيـ منـ نوعـ Aـ يـمـثـلـ فـيـ قـاعـدـةـ سـكـرـيـةـ قـلـيلـةـ التـعـدـدـ يـضـافـ  
إـلـيـهـ جـزـءـ سـكـرـيـ مـمـثـلـ فـيـ غـلـاكـتوـنـ بـتـدـخـلـ الـإـنـزـيمـ Aـ الـمـشـفـرـ بـمـوـرـةـ مـحـمـولةـ عـلـىـ الصـبـغـيـ رقمـ 9ـ يـمـضـطـنـ وـرـاثـيـنـ إـمـاـ 1418ـ أـوـ 1410ـ.

الـزـمـرـةـ الـدـمـوـيـةـ (B)ـ:ـ تـسـتـهـلـ بـوـجـودـ مـسـتـضـدـ غـشـائـيـ منـ نوعـ Bـ يـمـثـلـ فـيـ قـاعـدـةـ سـكـرـيـةـ قـلـيلـةـ التـعـدـدـ يـضـافـ  
إـلـيـهـ جـزـءـ سـكـرـيـ مـمـثـلـ فـيـ غـلـاكـتوـنـ بـتـدـخـلـ الـإـنـزـيمـ Bـ الـمـشـفـرـ بـمـوـرـةـ مـحـمـولةـ عـلـىـ الصـبـغـيـ رقمـ 9ـ يـمـضـطـنـ وـرـاثـيـنـ إـمـاـ 1418ـ أـوـ 1410ـ.

الـزـمـرـةـ الـدـمـوـيـةـ (AB)ـ:ـ تـسـتـهـلـ بـوـجـودـ مـسـتـضـدـنـ غـشـائـيـنـ منـ نوعـ Aـ وـBـ يـمـثـلـ فـيـ قـاعـدـةـ سـكـرـيـةـ قـلـيلـةـ التـعـدـدـ يـضـافـ  
إـلـيـهـ وـرـاثـيـ 1418ـ.


الـزـمـرـةـ الـدـمـوـيـةـ (O)ـ:ـ تـسـتـهـلـ المـادـةـ Hـ أـيـ الـقـاعـدـةـ سـكـرـيـةـ قـلـيلـةـ التـعـدـدـ بـدـوـنـ إـضـافـةـ أـيـ مـسـتـضـدـ لـغـيـابـ  
الـإـنـزـيمـ Aـ وـBـ،ـ وـلـمـ غـطـ وـرـاثـيـ وـاحـدـ هوـ 1410ـ.

أـمـاـ فـيـ النـظـامـ Rhـ فـيـ وـجـودـ مـسـتـضـدـ غـشـائـيـ Dـ يـكـونـ النـطـمـ الـظـاهـرـيـ S~al~a~ Rh~+.ـ بـشـفـرـ لـهـ مـوـرـةـ مـحـمـولةـ عـلـىـ الصـبـغـيـ رقمـ 1ـ عـنـ الـاـنـسـانـ وـلـمـ أـلـيـلـ،ـ  
وـالـأـلـيـلـ الـمـوـجـبـ سـالـدـ عـلـىـ الـأـلـيـلـ السـالـ.

إـنـ اـخـلـافـ الـأـنـماـطـ الـظـاهـرـيـ رـاجـعـ لـوـجـودـ أـوـ غـيـابـ بـعـضـ مـحـدـدـاتـ مـسـتـضـدـ فـيـ النـظـامـ ABOـ أـوـ عـلـىـ  
مـسـتـوـيـ النـظـامـ Rhـ وـالـتـيـ تـمـدـدـهـاـ أـنـوـاعـ مـنـ الـإـنـزـيمـاتـ الـتـيـ تـشـفـرـ طـاـئـلـاتـ ذاتـ سـيـادـةـ فـيـهاـ (Aـ وـBـ وـOـ).


الإجابة النموذجية

التحليل	تحكملة الجدول			تأثير الاضطراب المسبب له على الاستجابة المناعية	المرض		
	الجزء الأول		نوعية المقاومة				
	الخلوية	الطبيعية					
لأن الكريات البيضاء خاصة الماكروفاج تلعب دوراً أساسياً في الاستجابة المناعية بتنوعها: في الاستجابة المناعية الطبيعية (اللانوعية): يتمثل دورها في ابتلاع المستضدات وهمضها (ظاهرة البلعمة)، كما أنها تفرز وسائل كيميائية (وسائل الالهاب) في الاستجابة المناعية النوعية: تلعب دور الخلية العارضة للبكتيريات المستضدية المرفقة بـ HLA كما تفرز الأنترلوكين 1 المنشط للمقاويات الحسّنة. هذه الخطوة ضرورية لتحسيس وتنشيط المقاويات LT4، LT8 و LB وانطلاق الاستجابة المناعية بتنوعها الخلطية والخلوية.	-	-	-	E			
لأن البلازموسوميت الناتجة عن تمثيل LB المنشطة هي المسؤولة عن إنتاج وإفراز العناصر المتفايدة في الاستجابة المناعية ذات الوساطة الخلطية وهي الغلوبولينات المناعية (الأجسام المضادة).	-	+	+	F			
لأن الغدة السعوية (البيموسية) هي من الأعضاء المناعية المركبة، تلعب دوراً أساسياً في الاستجابة المناعية بتنوعها، فهي مقر نضج المقاويات T4 و T8 أي اكتسابها لكتامة مناعية.	-	-	+	G			
تلعب LT4 دوراً محورياً في الاستجابة المناعية النوعية الخلطية والخلوية من خلال إنتاجها وإفرازها لميلفات كيميائية تتمثل في الأنترلوكينات (خاصة الأنترلوكين 2).	-	-	+	H			
تشتمل الخلايا LT و LB ذات الكفاءة المناعية بواسطة الأنترلوكينات المفرزة من طرف LTb فتكاثر LB وتمثيل إلى خلايا بلازمية (تدخل في الاستجابة المناعية ذات الوساطة الخلطية) وتتكاثر LT8 وتمثيل إلى خلايا سامة LTc تتدخل في الاستجابة المناعية ذات الوساطة الخلوية.	-	-	+	I			



1- فسر نتائج الوثيقة (02).

قصد تحديد الشخص الأكثر تلاؤماً نسبياً مع طفل مصاب بعجز مناعي ويحتاج لزرع نقي العظام، من بين خمسة مرشحين للزرع تم توزيع المقاويات الطفل المصاب بالعجز المناعي على ستة أوساط اختبار. أحد الأوساط (الوسط 2) ظل كشاهد (يضم مقاويات الطفل فقط) والأوساط الخمسة الأخرى أضيفت لكل منها مقاوايات أحد المرشحين للزرع، وذلك بعد معالجتها بمادة تكبح تكاثرها. وبين الوثيقة (03) مقاوايات الطفل المصاب بالقصور المناعي في كل واحد من الأوساط الستة.



2- استدل بمعطيات الوثيقة (03) لتحديد الوسط الذي يحتوي على مقاوايات الشخص الأكثر تلاؤماً نسبياً مع الطفل المعنى.

3- اقترح علاجاً يحد من خواص مضاعفات أسباب القصور المناعي الذي يعاني منه المرضى المصابين بالأمراض المذكورة في بداية التعرير.

## 1- التفسير

خلال الساعات الأولى من بداية التجربة (20 ساعة)، نلاحظ ثبات في عدد المقاويم الشخص 7 لعدم قدرتها على التكاثر بسبب كبح تكاثرها بالادة المستعملة في المعالجة، موازاة مع ذلك، يبقى كذلك عدد مقاوميات الشخص X ثابت لعدم شروعها في عملية الانقسام. هذه الفترة توافق مرحلة التعرف على المستضد (المقاوميات الشخص 7) والتشبّث.

بعد 20 ساعة من التجربة، يرتفع عدد مقاوميات الشخص X ليصل إلى 3 وحدة اعتبارية بعد يومين من بداية التجربة. يعود ذلك لتكاثرها نتيجةً تغييرها عن طريق الأنترلوكينات المفرزة من قبل LT. بالمقابل يبقى عدد مقاوميات الشخص 7 ثابت بعد يوم و12 ساعة، بعد هذه المدة نلاحظ تناقصاً في عددها ويعود ذلك لتخريبيها بواسطة السموم (الغروفين والإنتامات الحالة) المفرزة من قبل المقاوميات المنفذة النوعية (LTc) للشخص X، حتى تخفي تماماً (تخريبياً جيداً) في اليوم الثاني.

## 2- الاستدلال

يكون تكاثر المقاومات الطفل أكبر في الوسط 5 بليبيا الوسطين 6 و1، ويكون هذا التكاثر أقل في الوسطين 3 و4 مقارنة مع أهمية تكاثر المقاومات في الوسط 2 (الشاهد).

تكاثر المقاومات الطفل في الوسط 2 عادي لغياب خلايا (مستضدات) محضة على التكاثر (عدم حدوث استجابة مناعية ذات واسطة خلوية). أما في الأوساط 5 و6 و1 فإن المقاومات المضادة للوسط عملت على تحبس وتخريض مقاومات الطفل التي تعرف على هذه المقاومات كمولادات الضد، فتتولد استجابة مناعية.

إن اختلاف في أهمية تكاثر المقاومات الطفل (قوة الاستجابة المناعية)، فالأقرب نسبياً للمقاومات الطفل تولد استجابة مناعية أقل فعالية (تكاثر ضعيف للمقاومات).

إذن الوسط 3 هو الوسط الذي يحتوي على مقاومات الشخص الأكثر توافقاً نسبياً (CMH) مع مقاومات الطفل المعنى حيث أن شدة تخريض مقاومات الطفل كانت الأضعف في هذا الوسط.

## 3- المقترن علاج

العلاجات المقترنة التي تحد من مخاطر مضاعفات أسباب القصور المناعي الذي يعاني منه المرضى المصابة بالأمراض المذكورة في بداية التمرين.

## Syndrome Di George

يمكن أن يشمل العلاج عملية زراعة أنسجة الغدة السعوية أو زراعة نخاع العظم أو زراعة الخلايا الجذعية أو زراعة بعض خلايا الدم التي تكافح الأمراض.

## Agamaglobulinemie

حقن المريض بمختلف الأجسام المضادة التي لا يستطيع الجسم انتهاجها بنفسه. استخدام المضادات الحيوية للحد من الالتهابات يقدر الإمكان ومنع حدوث مضاعفات خطيرة للأمراض المختلفة.

## Mرض Leucemie (سرطان الدم)

- العلاج الكيميائي والإشعاعي. - زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية.


## كـ التمرين 02

يتطلب الدفاع عن الذات آليات مناعية مختلفة تؤدي فيها البروتينات أدواراً هامة، ولمعرفة بعض هذه الأدوار نقترح ما يلي:

يشكل فيروس الانتماب الكبدي (HBV) الذي يسبب تغصن الخلايا الكبدية مشكلاً صحياً عالياً حسب تصنيف المنظمة العالمية للصحة (OMS). من أجل التوصل إلى تحديد الآليات المناعية المتدخلة في القضاء على هذا الفيروس نقترح الدراسة التالية:


## الجزء الأول

يقدم الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة (01) على التوالي نتائج معايرة تركيز الغلوبولينات المناعية في المصل وعد الخلايا اللعماوية في طحال شخصين (أ) و (ب) أصياً بفيروس الانتماب الكبدي بحيث تمثل الشخص (أ) للشفاء بعد بضعة أسابيع من الإصابة في حين تطلب شفاء الشخص (ب) تدخل طبياً.



- 1- باستغلال نتائج الوثيقة (01) وباستدلال منطقي، فسر تمثل الشخص A للشفاء مقتراحاً علاجاً مناسباً للشخص B.

**الجزء الثاني**  
للكشف عن نمط آخر من الاستجابة المناعية ضد فيروس الانهاب الكبدي آلية حدوثها، فتخرج عليك معطيات الوثيقة (02). في أواسط (1)، (2) و(3) يدرس تأثير خلايا المقاومة مأخوذة من شخص مصاب بالانهاب الكبدي على خلايا كبدية مأخوذة من الشخصين أ وب. وهو يكمل التجربة ونتائج الشخص المجهري لعيات مأخوذة من كل وسط مبينة في الوثيقة (02).



- 1- بالاعتماد على الوثيقة (02) على العبارات التالية:  
أ- المناعة ضد فيروس الانهاب الكبدي خلوية.  
ب- الخلايا المقاومة LT المستعملة في التجربة مأخوذة من الشخص أ.

- ج- يتطلب تغريب الخلايا المصابة من طرف LT تعرفا على الشخص أ.  
د- يتطلب تغريب الخلايا من طرف LT تعرفا على CMH (HLA) هذه الخلايا.

- 2- إن تغريب الخلايا المصابة من طرف الخلايا LT في الوسط (1) تعرفا على البيض المستضدي.  
خطيطة وظيفية آلية تغريب الخلايا المصابة في الوسط (1) يتطلب تدخل بروتينات. بين رسومات

## الإجابة النموذجية

الجزء الأول  
التفسير  
(أ)

- **عند الشخص أ:** بعد سبعة أيام من إصافته بالفيروس HBV نلاحظ ارتفاع نسبة الغلوبولينات المناعية ضد HBV ليبلغ ذروتها (3) بعد 14 يوماً من الإصابة، ثم تنخفض بعد ذلك إلى أن تكاد تنتهي بعد اليوم 21 من الإصابة.

- **عند الشخص ب:** نلاحظ أن نسبة الغلوبولينات المناعية في دمه تبقى متعدمة.  
**الشكل (ب)**

- **عند الشخص أ:** نلاحظ أن عدد LB وTA في قيم عادية مقارنة مع الشخص العادي.  
- **عند الشخص ب:** نسجل لديه نقصاً كبيراً في عدد الخلايا LB بينما عدد الخلايا LT في قيمها العادية. بين شكل الوثيقة (01) أن سبب عدم إنتاج الغلوبولينات المناعية عند الشخص ب يعود لتناقص حاد في عدد نسائال LB ناتج عن ذلك عدم إقصاء المستضد.

بما تنتج عضوية الشخص أ الغلوبولينات المناعية لوجود المقاويات B و T لديه، ترتبط هذه الجزيئات نوعاً بالمستضد HBV مشكلة معقدات مناعية تعمل على إبطال مفعوله ثم إصافاته بتسهيل بلعمته بواسطة البليغيات.

**العلاج المقترن للشخص ب:** يمكن الحصول نوعي يحتوي على غلوبولينات مناعية نوعية موجهة ضد HBV (مصل يؤخذ من شخص مصون ضد هذا الفيروس).

الجزء الثاني  
1- تعليل العبارات

## أ- المناعة ضد فيروس الانهاب الكبدي خلوية.

LT المأخوذة من الشخص المصابة بالـ HBV قادت بتحبيب الخلايا المصابة إذن هي LTc ما يدل على أن المناعة خلوية.


ب- **الخلايا المقاوية LT المستعملة في التجربة مأخوذة من الشخص أ.**

الخلايا LT المستعملة في التجربة قادت بتحبيب خلايا الشخص أ المصابة بالـ HBV ولم تغرب خلايا الشخص ب المصابة بنفس المستضد مما يدل على أن الخلايا LT المستعملة في التجربة مأخوذة من الشخص أ وليس من الشخص ب لأن تأثير LT نوعي.

ج- يتطلب تغريب الخلايا المصابة من طرف LT تعرفا على CMH (HLA) هذه الخلايا.

في الوسط (1): الـ LTc خربت خلايا الشخص أ المصابة بالـ HBV ولم تغرب خلايا الشخص ب المصابة بنفس المستضد مما يدل على تعرف الخلايا LT على HLA خلايا الشخص أ أي خلايا نفس الذات وعدم تعرفها على HLA الشخص ب رغم إصافتها أي يجب أن تكون LTc والخلية المصابة من نفس الفصيلة النسبية (لها نفس الـ CMH).

- السلسلة الفعلية**
- عدم تحرير خلايا LT من طرف LTc على البيبتيدي المستضد.
  - في الوسط 1: الـ LTc خرب خلايا الشخص المقاومة لنعرفها على البيبتيدي المستضد المعروض على سطح الخلية المقاومة بواسطة الـ CMH.
  - في الوسط 3: عدم تحرير الخلايا غير المقاومة دليل على عدم تعرف الخلايا LT على البيبتيدي الذائي الذي تعرضه الخلايا السليمة بواسطة الـ CMH ما يدل على ضرورة تعرف الـ LT على البيبتيدي المستضد.
  - التبين برسومات تخطيطية




### التمرين 03

بعد التلقيح رهاناً مهماً بالنسبة للصحة العمومية، فهو يؤدي إلى اكتساب مناعة ضد بعض الأمراض المعدية. لدراسة الآليات المفترضة لتأثير عملية التلقيح نقدم المعلميات الآتية:

#### الجزء الأول

تبين الوثيقة (01) تطور كمية الأجسام المضادة ضد التوكسين حسب الزمن بعد العدوى البكتيرية المسؤولة عن مرض الكراز والمفرزة للتوكسين عند شخص غير ملечен ضد هذا المرض (الشكل أ) وعند شخص آخر ملечен ضد هذه (الشكل ب).



184

- رسالة 04: دور البروبيكتات في الدفاع عن الذات
- قارن بين رد فعل الشخص الملتقط والشخص غير الملتقط ضد بكثيرها الكراز.
- الجزء الثاني
- تحت يموعنان من الفران A وبكريات حمراء خروف (GRM) في المرة الأولى (اليوم 0).
- بعد 30 يوماً من الحقن، حقنت فران الجموعة A، GRM للمرة الثانية، بينما حقنت فران الجموعة B بكريات حمراء لأرنب (GRL)، تعتبر GRL مولدات ضد بالتنية للفران.
- يأخذ كل يومين طحال فار من كل مجموعة من أجل تحديد عدد البلازميات المفرزة للأجسام المضادة (عدد GRM) بالنسبة لفران الجموعة A. عدد كل من البلازميات المفرزة للأجسام المضادة ضد (GRL)، وللاميات المفرزة للأجسام المضادة ضد GRM بالنسبة لفران الجموعة B. تقدم الوثيقة (02) الناتج لعمل عليها.

حقن ثان: حقن GRM										حقن أول: حقن GRM					فران الجموعة A									
فران الجموعة A										فران الجموعة B					فران الجموعة B									
42	40	38	36	34	32	30	8	6	4	2	0	70	100	300	500	850	180	1	20	90	15	3	0	
الشكل (أ)																								

حقن ثان: حقن GRL										حقن أول: حقن GRM					فران الجموعة B										
فران الجموعة B										فران الجموعة A					فران الجموعة A										
42	40	38	36	34	32	30	8	6	4	2	0	3	10	20	95	75	2	0	0	0	0	0	0	0	0
الشكل (ب)																									

الوثيقة (02)

- 1- استنتج خصائص الاستجابة المناعية للذين تكشف عنهم نتائج التجربة المبينة في الوثيقة (02). علل إجابتك.
- 2- تقدم الوثيقة (03) مراحل الاستجابة المناعية النوعية ضد مولد ضد معين داخل الأعضاء المقاومة الثانوية.

السلة الفنية

**السلسلة الفضية** التحليل  
**خاصية الناشرة:** عند المجموعة A، نلاحظ أن عدد الخلايا البلازمية المفرزة للأجسام المضادة ضد GRM مرتفع عند الحقن الثاني بنفس مولد المضاد مقارنة مع الحقن الأول.  
**خاصية الوعية:** عند المجموعة B، نلاحظ أن الحقن الأول، GRM لم يسمح بارتفاع عدد البلازميات المفرزة للأجسام المضادة ضد GRL، عند الحقن الثاني، GRL، لكن مولد الضد في الحقن الأول (GRM) يختلف عن الضد في الحقن الثاني (GRL).

#### **A. تفسير الاستجابات المناعية عند المجموعة A**

في النصال الأول بمولد الضد GRM، يتم انتقاء المقاويات B النوعية فتكابر وتمايز إلى بلازميات مفرزة GRM مضادة ضد GRM ومقاويات LBm ذاكرة.

الاتصال الثاني بنفس مولد الصد، يحدث تشويط سريع لعدد كبير من المقاومات الذاكرة النوعية، ونقوم بإنتاج فوري لعدد كبير من الال framas الت نوعية ضد هذا المولد الصد (استجابة فورية وقوية).  
تشويط الاستجابة المتناسبة عند المجموعة B

بـ. تفسير الاستجابات المترادفة عند المجموعة B

ـ الانصال الأول بمولد الضد يتم انتقاء المقاويات **8** النوعية فتكاثر وتمايز إلى إلزاميات مفرزة أحجام مضادة ضد **GRM** وملقاويات ذاكرة.


بالاتصال الثاني مولد ضد مختلف (GRL) لا يتم تنشيط المحفاويات الذاكرة النوعية لـ GRM بل يتم تنقية لها أخرى من المحفاويات B نوعية لـ GRL تخضع لنفس مراحل الاستجابة الأولية تكون استجابة اباعية بطيئة وضعيفة ضد GRL.

التمرين 04


لربما بعض مظاهر الاستجابة المناعية ضد فيروس الزكام، تفتح للعديد من الآليات:

الجزء الاول

ارتفاع تعفن فirosoxi مرتبط باستجابة التهابية على مستوى مخاطية الأنف والحنجرة. من بين أعراضه رئيسية سيلان الأنف، ألام الحنجرة، الصداع إضافة إلى الحمى. تقدم الوثيقة (01) نتائج تتبع بعض نتائج الفيزيولوجية عند شخص أصيب بالركام، خلال مدة 11 يوماً مطلوبة للتعفن.



- حل النزاع الممثلا بالوثيقة (٠١).



- باستغلال معطيات الوثيقة (03) فسر الاستجابة المناعية لقرآن المجموعة A (الشكل أ للوثيقة 2) والمجموعة B (الشكل ب للوثيقة 2).

الإجابة النموذجية

الجزء الأول

مقدمة

- أوجه التشابة: إنتاج أجسام مضادة ضد التوكسين الذي تفرزه بكتيريا الكثراز عند كل من الشخص الملقح والشخص غير الملقح.

وجه الاختلاف: تظهر الاستجابة المناعية بعد 7 أيام من العدوى عند الشخص غير الملحق فيما تظهر الاستجابة المناعية بشكل فوري بعد العدوى عند الشخص الملحق.


ستنتج أن الشخص الملقح عصى ضد سمية الكزان. **الجزء الثاني.**

الجزء الثاني


١- استنتاج

**خاصيتنا الاستجابة المداعية: الذاكرة والتوعية.**

علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء  
تم تتبع نطور كل من عدد المقاويات  $T_0$  السامة على مستوى الريتين، وتركيز فيروس الزكام في الدم بذرياع الزمن عند فرمان مصابة بفيروس الزكام، النتائج الحصول عليها موضحة في الوثيقة (02).



يقدم الشكلين (ب و ج) من الوثيقة (03) رسومات تخطيطية تلخص آلية تدخل كل من الأجسام المضادة والمقاويات  $T$  الفاتلة ضد فيروس الزكام.



بالاستعارة بمعلومات الوثيقتين (02 و 03) ومعلماتها، بين باستدلال علمي كيفية تخلص العضوية من فيروس الزكام مستناداً إلى الاستجابة المناعية المتدخلة ضده.

### الإجابة المنموجية

#### الجزء الأول التحليل

- بالنسبة لأعراض الاستجابة الالتهابية: تزايد أهميتها مباشرة بعد العدوى لتصل قيمة قصوى في اليوم الثاني، لتنخفض بعد ذلك إلى أن تختفي في اليوم التاسع.
- بالنسبة لتركيز الفيروس في الدم: يرتفع بشكل سريع ليصل إلى قيمة قصوى في اليوم الثاني، ويختفي فيها حتى اليوم الخامس ليبدأ بالتناقص بعد ذلك إلى أن ينعدم في اليوم التاسع.

السلسلة النصية  
الجزء الثاني  
دور البروتينات في الدفاع عن الذرات  
بالنسبة لتركيز الأجسام المضادة في الدم: قبل اليوم الخامس كان تركيز الأجسام المضادة متعدماً، وبطريقاً من هذا اليوم بدأ في الارتفاع تدريجياً.  
يُستنتج أن فيروس الزكام يعرض استجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلطية تؤدي إلى إقصائه.

#### الجزء الثاني بيان دليل الوثيقة (02)

في بداية الإصابة، عدد المقاويات  $T_0$  جداً منخفضاً وتركيز الفيروسات في الدم في قيمة قصوى.  
ارتفاع التدريجي لعدد المقاويات  $T_0$  يقابل انتفاض تركيز الفيروسات تدريجياً في الدم. دليل على حدوث استجابة خلوية ضد فيروس الزكام أدت إلى التخلص منه تدريجياً.  
تناقص عدد المقاويات  $T_0$  على إثر انتفاض تركيز الفيروسات في الدم. دليل على انتفاض شدة الاستجابة بعد انتفاض تركيز الفيروس

#### بيان دليل الوثيقة (03)

بين الشكل (أ) أن الأجسام المضادة ترتبط بالفيروسات لتشكل معقدات مناعية تمنع تأثير هذه الفيروسات وتسهل بعلمتها. كما يبين أن الخلايا البالغة تحمل على سطح غشائها مستقبلات نوعية خاصة بالأجسام المضادة.

بين الشكل (ب) أن المقاويات  $T$  السامة تعرف، بواسطة المستقبل  $TCR$ ، على الخدد المستضدي للفيروس المعروض بواسطة جزيئات الـ CMH-I (التعريف المزدوج)، وتفرز البروفرين والإزيمات الحالة، مما يؤدي إلى موت الخلايا المعقنة بالفيروس. إذن يثير فيروس الزكام العضوية على توليد استجابة مناعية ذات وساطة خلوية لأنها تم بواسطة المقاويات  $T_0$ .

ونستنتج أن الاستجابة المناعية ضد فيروس الزكام نوعية ذات وساطة خلطية وخلوية في آن واحد.

### كثير التعبير 05

رفعت المحاولات الأولى لزرع الأعضاء عند الإنسان إخفاقات كبيرة حيث لوحظ في حالات كثيرة تدمير الغضروف أو التسريح المزروع. لتحديد بعض مظاهر وأسباب رفض زرع الأعضاء نقدم المعلومات الآتية:

#### الجزء الأول

أثبتت دراسة حول نسبة نجاح عمليات تعليم الجلد حسب درجة القرابة بين الشخص المعطي والشخص الشهي والتي ترتبط بدرجة تلاؤم جزيئات الـ CMH-I تقدم الوثيقة (01) نتائج هذه الدراسة:

الصلة القرابة	الأيات معقد CMH-I	المتحركة	التطعيم	قبول جسم الشهي للطعم	عدد حالات رفض جسم الشهي للطعم	عدد حالات	عدد حالات
توأمان حقيقيان	تطابق الأيات	ـ	ـ	ـ	0	23	23
وجود صلة القرابة	تشابه بعض الأيات	ـ	ـ	ـ	31	31	62
بدون صلة القرابة	اختلاف مهم في الأيات	ـ	ـ	ـ	12	0	12

#### بيان دليل الوثيقة (01)

الجزء الأول  
التحليل

يُنبع أن الـ CMH مسؤولة عن نجاح أو فشل عمليات زرع الطعم.

الجزء الثاني

- ١- تبيين أن الاستجابة المناعية ذات وسائط خلوية  
 ينال للأرب ٨١ الذي زرعت له قطعة جلدية لأرب من السلالة A (شاهد)، تسجل رفض الطعام  
 بعد مرور ١٢ يوما.

ينال للأرب ٨٢ الذي زرعت له قطعة جلدية لأرب من السلالة A وتلقى خلايا المقاومة من الأرب  
 تسجل رفض الطعام بعد مرور أربع أيام يعني أسرع من الأرب الشاهد.

ينال للأرب ٨٣ الذي زرعت له قطعة جلدية لأرب من السلالة A وتلقى مصلًا مأخوذًا من الأرب  
 (شاهد)، تسجل رفض الطعام بعد مرور ١٢ يوما مثل الأرب الشاهد.

إن المقاومة للأرب ٨١ أدت إلى تسريع رفض الطعام من طرف الأرب ٨٢ على عكس المصل الذي  
 يؤثر على سرعة رفض الطعام من طرف الأرب ٨٣ وبالتالي المناعة المتدخلة في رفض الطعام تنتقل عن  
 خلايا المقاومة وليس عن طريق المصل.

الاستجابة المناعية ذات وسائط خلوية.

٢- آلية تدمير، **T** لخلايا النسيج المزروع المختلف وراثياً  
 تعرف المقاويات **T** على خلية الزرع الأجنبي المخالف وراثيا مع إفراز محتوى الโฮبريلات (البرفوريون  
 لتراث الحال).

شكل جزيئات البرفوريون قنوات بروتينية على مستوى الغشاء السيتو بلازمي خلية النسيج المزروع.  
 يحول الماء والإنتيمات الحالة إلى خلية الطعام غير قنوات البرفوريون ثم موت الخلية الأجنبية بصدمة

التمرين 06

مرض فيروسي واسع الانتشار، لفهم بعض آليات مقاومة الجسم لهذا المرض وتحديد الصعوبات التي تعيّن الباحثين لإنجاح لقاح فعال ضده، نقترح المطابيل الآتية:



جزء الاول

النهاية

١- حلول (٢٠١٩) لـ (٢٠٢٠) لـ (٢٠٢١)

الجزء الثاني

آخر بيت بريان ميدوار تقارب تعليم الجلد على سلالات اراب حنطة وزراعة اراتب من سلالة A وزراعة A1 وB2 وB3 من السلالة B، النتائج الحصول عليها ممثلة في الشكل (١) من الوثيقة (٥٢). لنفس النوع (٥٣).




- ١- باستعمال معطيات الوثيقة (٠٢)، بين أن الاستجابة المناعية المتدخلة في رفض الطعم ذات وسائط خلوية.



٢- باستعمال معطيات الوثيقة (٠٣)، بين كيفية تدخل المعقليات  $T_c$  في تدمير خلايا السرطان التزويرية المختلفة وزراثياً.

السلة النفعية  
ضد A، والحقنة الثانية تحتوي على مولد ضد A ومولد ضد B. بين الشكل (أ) من الوثيقة (01) من الألف إلى الثاني عشر.

ولفهم بعض آليات الاستجابة المناعية الموجهة ضد فيروس الزكام تم تبع تطور تركيز كل من فيروس الزكام والأجسام المضادة له واللمفاويات، السامة في دم شخص تعرض للعدوى بهذا الفيروس، ويقدم الشكل (ب) من نفس الوثيقة النتائج المحصلة.



- قارن بين تركيز الأجسام المضادة الموجهة ضد مختلف المحددات المستضدية لفيروس الزكام، في دم هذا الشخص، في سن الثانية وفي سن الخامسة.
- اطلاقاً من مقارنة ببنبي السلالتين 1 و 2 لفيروس الزكام الممثلة في الوثيقة (02)، ومن إجابتكم على لسؤال السابق، بين أن التلقيح ضد السلالة 1 لفيروس الزكام لا تحمي الجسم من خطورة الإصابة بالسلالة 2 من هذا الفيروس.



- حلل النتائج الممثلة بالشكلين (أ) و(ب).

### الجزء الثاني

في بداية كل فصل خريف يلجم بعض الأشخاص إلى حقن لقاح ضد فيروس الزكام، على عكس بعض اللقاحات الأخرى التي تستعمل مرة واحدة في حياة الإنسان. لفهم ضرورة استعمال لقاح جديد ضد الزكام كل سنة أجريت معايرة نسبة الأجسام المضادة الموجهة ضد مختلف المحددات المستضدية لفيروس الزكام في دم شخص في مرحلتين من عمره:

- المعايرة الأولى في سن سنتين عند اتصاله لأول مرة بالسلالة 1 من فيروس الزكام، يقدم الشكل (أ) للوثيقة (02) نتيجة هذه المعايرة.

- المعايرة الثانية: في سن خمس سنوات عند اتصاله بسلالة جديدة من فيروس الزكام (السلالة 2) يقدم الشكل (ب) من الوثيقة (02) النتائج المحصلة:

السلة الفعلية  
تظهر فيروسات الزكام في الدم ابتداء من اليوم الثاني ويرتفع تركيزها حسب الزمن، ينخفض إلى أن يتضمن في اليوم العاشر.

- تظهر المقاوميات  $LT_4$  في الدم ابتداء من اليوم الثاني ويرتفع تركيزها حسب الرزن، ثم ينخفض إلى أن تختفي في اليوم الرابع عشر.  
- ابتداء من اليوم الرابع تظهر الأجسام المضادة في الدم ويرتفع تركيزها حسب الزمن، ثم يستقر.  
نستنتج أن الاستجابة المناعية نوعية ذات وساطة خلطة ذات وسائل خلوية وذلك لتدخل الأجسام المضادة والمقاوميات  $LT_4$ .

## الجزء الثاني 1- المقارنة

بالنسبة للأجسام المضادة ضد المحددات المستضدية A و) نلاحظ ارتفاعها في تركيزها عند الاتصال مع السلالة 2 مقارنة بالاتصال مع السلالة 1.

- بالنسبة للأجسام المضادة ضد المحددات المستضدية B و D نلاحظ انخفاضها في تركيزها عند الاتصال مع السلالة 2 مقارنة بالاتصال مع السلالة 1.  
نستنتج أنه بالنسبة للمحددات المستضدية A و) يكشف الاختلاف الملاحظ عن خاصية الذاكرة المناعية.

## 2- التبيين


- محددات مستضدية مشتركة A و)، اختفاء المحددin B و ظهور المحددin المستضديين E و F.  
- عند الاتصال بالسلالة 2 أظهر الجسم استجابة ثانية بالنسبة للمحددات المستضدية E و F لأنها لم يسبق له التعرف عليها.  
إذن فالتنقية ضد السلالة 1 لا يعنى الجسم من السلالة 2 (استجابة نوعية).

## بعض التمرين 07

يتطلب تجربة عملية التطعيم الجلدي وزرع الأعضاء وجود تلاقي نسيجي بين المعطي والمستقبل. لفهم بعض آليات الاستجابة المناعية المتدخلة في رفض الطعام، نقترح المعطيات التالية:

## الجزء الأول


نقدم الوثيقة (01) ظروف ونتائج تعليم الجلد عند فرمان تنتمي إلى سلالات مختلفة: السلالة A (الفأر A1 وB1) والسلالة B (الفأران B1 وB2) والسلالة C (الفأران N) طافرة (بدون غدة سمعية منذ الولادة: فرمان  $nudes$ ).



- باستغلالك لمعطيات هذه التجارب استخرج معيلاً أجابتكم، الشرط الضروري لقبول الطعام عند فرمان عافية وخصوص وطبيعة الاستجابة المناعية المتدخلة في رفض الطعام.

## الجزء الثاني

تم استخلاص خلايا الطعام من فار معطي من سلالة D ووسماها بالكريوم المشع (CR) الذي ينفذ داخل خلايا الطعام ويثبت على بروتيناتها ويتم تحريمه عند تدمير هذه الخلايا، توضع الخلايا الملوسة في أربعة أوساط زرع ملائمة ثم تضاف إليها خلايا مناعية مستخلصة من فار متلق من سلالة E. تعطى الوثيقة (02) ظروف هذه التجربة، وتعطى الوثيقة (03) نتائج قياس كمية الكريوم المشع CR المحرر في كل وسط.



الوثيقة (02)

ملاحظة: نشير إلى أن جزيئات CD4 ترتبط بجزئيات CMHIII.

1- باستغلالك لمعطيات هذه التجربة، فسر النتائج الحصول عليها في كل وسط.

### السلسلة الثانية

- 2- في حالة زرع بعض الأعضاء يتم مساعدة جسم المثلي على قبول الطعام بإخضاعه لعلاج مادة السكلوسبيرون التي تتكب تركيب الأنترولوكين 2 من طرف المقاويبات LT4، وكذا مستقبلات الأنترولوكين 2 المتواجدة على غشاء المقاويبات LT4 و LT8.
- 3- وضع كيغ يودي علاج المثلي بمادة السكلوسبيرون إلى مساعدة جسمه على قبول الطعام.

### الإجابة النموذجية

#### الجزء الأول

##### شروط قبول الطعام

وجود تماثل نسيجي بين الفار المعطى والمستقبل: تماثل CMH.

التعديل: رفض الطعام في حالة فرمان من سلالات مختلفة وقبول الطعام في حالة فرمان من نفس السلالة ( التجربتان 1، 2 )

##### - خصائص الاستجابة

ال النوعية، التعديل: مقارنة بين مدة الرفض في التجربتين 3 و 5.

الذاكرة، التعديل: مقارنة بين مدة الرفض في التجربتين 3 و 2.

##### - طبيعة الاستجابة المناعية المتدخلة

نوعية ذات وسائل خلوية، التعديل: تدخل المقاويبات T ( التجربة 4 : الفرمان nudes ).

#### الجزء الثاني

##### التفصير

##### - الوسط 1: شاهد.

##### - الوسط 2: تخريب كمية ضعيفة من ( ۳ ) في الوسط مماثلة للشاهد نفس ذلك بأن T8 و T4 لوحديهما

غير كافية لتدمير خلايا الطعام.

- الوسط 3: تخريب كمية كبيرة من ( ۵ ) ( 280 UA ) معناه تدمير مهم لخلايا الطعام نفس ذلك بضرورة وجود تعاون خلوي بين T8 و T4 وبالعميات الكبيرة لتدمير خلايا الطعام.

- الوسط 4: تخريب كمية ضعيفة من ( ۳ ) في الوسط مماثلة للشاهد بعد كبح دور CMH-II أي عدم تدمير خلايا الطعام. إذن قبول الطعام لأنه لا CMHII دور في عمل الماكروفاوج وحدوث التعاون المناعي.

##### 2- التوضيح

المعالجة بالسيكلوسبيرون تعمل على كبح تركيب IL2 من طرف T4 ومستقبلاتها من طرف T4 و T8 مما يؤدي إلى عدم تنشيط T4 و T8 أي عدم تأثير T8 إلى T4 ومنه عدم تدمير خلايا الطعام ( قبول الطعام ).


### ك التمرير 08

#### لإبراز بعض مظاهر الاستجابة المناعية النوعية المرجحة ضد البكتيريات الممرضة المفرزة للسموم، نقترح

##### المطعيات الآتية:

##### الجزء الأول

تحت معايرة كمية مولد الصد ( السم ) والأجسام المضادة ضد السم عند شخص إثر تعرضه لعدوى ي Sikorina ممرضة، تقدم الوثيقة ( ۱ ) النتائج الحصول:




### ملخص النتائج (۰۱).

#### الجزء الثاني

حيث قاربسم X وفي الأيام المولالية للحقن تم قياس عدد المقاويبات B ( LB ) والبلازماز ( P ) في كل ml من الدم، بالإضافة إلى معايرة الأجسام المضادة ضد X الحرة ( Ac )، النتائج الحصول عليها مبينة في الشكل ( ۰۲ ) من الوثيقة ( ۰۲ ).

من أجل تحديد الشرط الضروري لإنتاج الأجسام المضادة ضد X، تم حقن الفرونان X ثلاث جموعات من الفرمان من نفس السلالة: المجموعة ۱ عادي، المجموعة ۲ مستصلقة الغدة السعوية والمجموعة ۳ خضعت لانقسام الغدة السعوية ثم حققت بمقاويبات مأخوذة من المجموعة ۱، بعد ۱۵ يوماً، أخذ المصل من شفouettes اللات ووضع مع السم X. الظروف التجريبية والنتائج الحصول مقدمة في الشكل ( b ) من نفس الوثيقة.



- باستغلال النتائج المبينة في الشكل ( ۱ ) من الوثيقة ( ۰۲ )، فسر تطور العناصر المتدخلة في الاستجابة المناعية.
- فسر النتائج المبينة في الشكل ( b )، ثم استنتج الشرط الضروري لإنتاج الأجسام المضادة ضد السم X.

الجزء الأول  
التحليل

- مثال الوثيقة (01) من حيثيات بداية تغير عن تغيرات كمية الأجسام المضادة (و !) ومولدات الضد بدلاً عنه عدد الأيام حيث نلاحظ:
- بعد العدوى ترتفع كمية مولد الضد (السمين) لتصل قيمة قصوى (4 و ) في اليوم الرابع وتعود بعد ذلك للاختصاص تدريجياً إلى أن تندفع في اليوم الرابع عشر.
  - قبل اليوم الرابع كانت كمية الأجسام المضادة متعدمة لترتفع بعد ذلك ببطء إلى حدود اليوم الـ 12 حيث تبلغ 1 و بعد ذلك تتزايد وتزداد الارتفاع وتصل إلى 8 و في اليوم الـ 16.
  - يستنتج أن طبيعة الاستجابة المناعية نوعية خلطية نظراً لتدخل الأجسام المضادة.

الجزء الثاني  
التفسير

- حقن السم X يؤدي (بعد فترة التشتيف) إلى تنشيط وتكاثر المقاويات B وبالتالي يرتفع عددها.
- تتشكل البلازميات ويتزايد عددها على إثر تمايز بعض المقاويات B.
- وبعد تشكلها تفرز البلازميات الأجسام المضادة التي يتزايد تركيزها في الدم تدريجياً.

## 2- تفسير النتائج التجريبية

التجربة 1: أثبتت فران المجموعة 1 الأجسام المضادة النوعية ضد السم X، في المصل، التي ترتبط بالسم فتشكل المعدن المناعي لضخ المقاويات T4 ومساعدتها على التمايز إلى خلايا بلازمية مفرزة للأجسام المضادة.

التجربة 2: غياب الغدة السعفية عند فران المجموعة 2 أدى إلى عدم نضج مقاواياماً (LT)، وبالتالي لم يتمكن المقاويات B من التمايز إلى بلازميات تنتج الأجسام المضادة النوعية ضد السم X، وهكذا لم يتشكل المعدن المناعي.

التجربة 3: تمكنت فران المجموعة 3 من إنتاج الأجسام المضادة ضد السم، والتي شكلت معدناً مناعياً مع السم، لأنها حقنت بالخلايا المقاوية الناضجة للمجموعة 1 والتي عوضت غياب الغدة السعفية لديها.


## الشرط القصوري لإنتاج الأجسام المضادة

وجود مقاويات T4 ناضجة تساعد على تنشيط المقاويات B وتقايزها إلى بلازميات مفرزة للأجسام المضادة.

ملاحظة: يمكن قبول التعاون الخلوي بين المقاويات B و T.

بعض الأجسام المضادة بفعالية بالقضاء على الأجسام الغريبة، ومع التقدم البيوتكنولوجي استعملت بهم مناعي لكافحة سرطان الثدي. وكيف تتدخل الأجسام المضادة في القضاء على هذا النوع من السرطان.

الجزء الأول (أ) من الوثيقة (01) نتائج قياس كمية البروتين الغشائي Her2 عند توعين من الخلايا بـA حيث أخذت كمية A مأخوذة من ثدي مصاب والخلايا سرطانية من نوع آخر، بينما يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة عدد هذه الخلايا السرطانية بعد سبعة أيام من الحضن علماً أن عدد الخلايا في بـA تحرير كأن متساوية بالنسبة للتوعين من الخلايا.



## بيان تنتائج الوثيقة (01):

- استخرج علاقة البروتين Her2 بتطور الخلايا السرطانية للثدي.
- قدم فرضية بين طريقة علاجية للحد من تكاثر خلايا سرطان الثدي.

## الجزء الثاني

لتأكيد من صحة الفرضية المقترحة، أجريت سلسلة من التجارب حيث وضع النوعان من الخلايا السرطانية A و B في أوساط مختلفة، الشروط والتنتاج موضحة في الجدول (أ) للوثيقة (02). بينما يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة العلاقة بين البروتين Her2 والجزيئية تراستوزوماب (جسم مضاد مطرور مخبرياً) كما في الشكل (ج) من الوثيقة (02) تطور عدد الخلايا السرطانية A بدلاً من الزمن قبل وبعد معالجتها.

## الأجابة الموجبة

## السلسلة الفرعية

**الجزء الأول**  
١- علاقة البروتين Her2 بتطور الخلايا السرطانية للثدي  
استغلال نتائج الوثيقة (٠١)

يوضح الشكل (أ) أن كمية البروتين الغشائي 2 Her تزداد بشكل كبير في خلايا سرطان الثدي (A) مقارنة بالخلايا السرطانية (B).

ويوضح الشكل (ب) أن عدد خلايا سرطان الثدي (A) تكاثر أكثر بثلاثة أضعاف من الخلايا السرطانية (B) في نفس المدة الزمنية.

لذلك: البروتين الغشائي 2 Her يعزز خلايا سرطان الثدي على التكاثر.

٢- اقتراح فرضية  
ينتاج أجسام مضادة خصريا ضد البروتين الغشائي 2 Her ترتبط بها وتعيق تكاثر خلايا سرطان الثدي (إلاعاج بالاستئصال).

## الجزء الثاني

## تحليل

يتل الجدول الشروط التجريبية وعد الخلايا السرطانية الناتجة بحسب:

- لوسيط ١: في وجود الخلايا (A) منفردة، يتكاثر عددها بشكل كبير (يتناسب 600 مليون خلية).

- لوسيط ٢: في وجود الخلايا (A) وجزيئية تراستوزوماب بتركيز 2 ملغم/مل، تكاثر الخلايا (A) بشكل أقل (يتناصف 200 مليون خلية).

- لوسيط ٣: في وجود الخلايا (A) وجزيئية تراستوزوماب بتركيز 20 ملغم/مل، تكاثر الخلايا (A) بشكل قليل (يتناصف 50 مليون خلية).

- لوسيطين ٤ و ٥: في وجود الخلايا B منفردة أو مع إضافة تراستوزوماب، يتناصف عدد قليل من الخلايا (20 مليون خلية).

يُنتهي أن جزيئية تراستوزوماب تثبّط تكاثر الخلايا السرطانية للثدي (A) ولا تؤثر على الخلايا السرطانية (B).

## ٣- تفسير



من الشكل (أ): جزيئية تراستوزوماب هي جسم مضاد تم تركيبه خصريا يتكون من جزء بشري وجزء حيواني، يرتبط على جزيئتين من البروتين الغشائي 2 Her على مستوى موقع التثبيت لوجود تكامل بيولوجي ويشكل العقد المناعي، فيتوقف عمل البروتين 2 Her على تحفيز الخلية ويتوقف تكاثرها.

من الشكل (ب): بعد تشكيل المعقادات المناعية يتناقص عدد الخلايا السرطانية، ثم تتدخل البالعات للخلص من المعقادات المناعية بعملية البلعمة التي تتم وفق أربع مراحل (تثبيت، إحاطة، إدخال، هضم) حتى يتم التخلص من الخلايا السرطانية تماما.

## تعميل صحة الفرضية

الفرضية المقترحة صحيحة لأن استعمال الأجسام المضادة المصنعة خصريا (تراستوزوماب) ضد البروتين الغشائي 2 Her فعال في تثبيط تكاثر خلايا سرطان الثدي.

الشروط التجريبية	الوسط	عدد الخلايا السرطانية (بالمليون)
خلال (A) + حرارة (Trastuzumab) ٢ ملغم/مل	١	٦٠٠
خلال (A) + حرارة (Trastuzumab) ٢٠ ملغم/مل	٢	٢٠٠
خلال (A) + حرارة (Trastuzumab) ٢٠٠ ملغم/مل	٣	٥٠
خلال (B)	٤	٢٠
خلال (B) + حرارة (Trastuzumab) ٢٠ ملغم/مل	٥	٢٠



١- حل النتائج الموضحة في الجدول (أ) من الوثيقة (٠٢).

٢- فسر آلية تأثير الجزيئية تراستوزوماب على الخلايا السرطانية باستغلالك لمعطيات الشكلين (ب) و(ج) من الوثيقة (٠٢) معللا صحة الفرضية المقترحة.

٣- قدم مقترحا حول إمكانية استغلال نتائج هذه الدراسة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

بين من خلال ما سبق ومعلوماتك أنجذب خلاصة تبين فيها كيف تدخل الأجسام المضادة في القضاء على الأجسام الغريبة عموماً وخلايا سرطان الثدي على وجه الخصوص.

الصلة الثالثة  
3- تقديم اقتراح

الفلورة المناعية: تُشتمل الأجسام المضادة (تراستوزوماب) مفروضة ضد البروتين 2 Her، ظهور الأشعة حول بعض خلايا الثدي دليل على أنها خلايا سرطانية.

الجزء الثالث

الجسم المضاد مسؤول عن التخلص من المستضد في المرحلة الثالثة من مراحل الاستجابة الخاطئة وهي مرحلة التنفيذ أو التخلص من المستضد.

الأجسام المضادة المساعدة تفرزها الخلايا البلازمية المحشية بالمستضد، ترتبط به لوجود تكامل ببوبي بين موقع ثبات محدد للمستضد في الجسم المضاد وعدد المستضد، فتشكل معقدات مناعية تُثْبِتُ تكاثر المستضد وتفتح التشاره وتحمّلها ليتم القضاء عنه عن طريق عملية البلعمة.

كما يمكن استعمال الأجسام المضادة المصوّبة مثقباً (تراستوزوماب) في علاج سرطان الثدي، حيث يرتبط هذا الجسم المضاد بالبروتين الغشائي المسؤول عن تكاثر الخلايا السرطانية فيبيط تكاثرها بشكل معقد مناعي معها ليتم التخلص منها بواسطة البالعات، وهكذا يتم علاج سرطان الثدي.


ترتبط الأجسام المضادة النوعية بالمستضد وتشكل معه معقدات مناعية تمنع تكاثره وانتشاره ليتم التخلص منه عن طريق عملية البلعمة.

## التعريف 02

يعمل الجهاز المناعي في الحالة الطبيعية على تحرير الخلايا السرطانية بتدخل عناصر مناعية جزئية وخلوية. تُنظّم الخلايا الورمية في المراحل المتقدمة للسرطان إلإفلاتات من الجهاز المناعي، فتقىق ذلك الذان القدرة على مقاومة المرض.

الجزء الأول

مثل الوثيقة (01) آلية تأثير الخلايا المناعية وشروط اخراج خلايا الورم.




## الوثيقة (01)

- خَيَّدَ دور الخلايا المناعية المتدخلة في الاستجابة المناعية ضدّ الخلايا السرطانية الممثلة في الوثيقة (01).
- اقترح فرضيتين لتفصيل إفلات بعض الخلايا السرطانية من الجهاز المناعي.

الجزء الثاني

للتخلص من الأورام يلجأ الأطباء إلى اختبار طرق علاجية، من بينها الطريقتان الموضحة في الوثيقة (02).



## الوثيقة (02)

تتجه عجز الجهاز المناعي على تحرير الخلايا السرطانية في الحالة الطبيعية أو الحالة العلاجية، تُنْظِّم سلسلة التجارب المبينة في الشكلين (أ) و(ب) للوثيقة (03).

للحاجة (1): أنْكِنْ بِقَبَّيَاتٍ خاصَّةٍ تُخْبِرُ أجْسَامَ مَضَادَةً بِالْأَخْضَرِ ضِدَّ HLA I وأُخْرِي مَفْلُوْرَةً ضِدَّ الْبَيْضَدِ الْمُسْتَضَدِيِّ خَلَايَا الْوَرَمِ، أَضْيَقَتْ هَذِهِ الْأَجْسَامُ مَضَادَةً لَوْسَطَيْنِ (أ) و(ب) بِحِيثِ:

- يُبَطِّلُ (أ) بِهِ خَلَايَا وَرَمِيَّةً أَخْدَثَتْ مِنْ وَرَمِ حَدِيثَ غَيْرِ مَقاوِمَةٍ لِـ TIL.
- يُبَطِّلُ (ب) بِهِ خَلَايَا وَرَمِيَّةً أَخْدَثَتْ مِنْ وَرَمِ في مَرْحَلَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ مَقاوِمَةٍ لِـ TIL نَزْمَ طَبَابَ (X).

للحاجة (2): تُؤْزِعُ خَلَايَا LTc مَاخُوذَةً مِنْ الْوَرَمِ مَعَ الْخَلَيَّيْنِ الْوَرَمِيَّيْنِ (X) و(Y).

للحاجة الجهرية التحصل عليها بعد نفس المدة الزمنية مماثلة في الشكل (ب) للوثيقة (03):

التتابع				
وجود فلورة حمراء على سطح غشاء خلايا الورم	وجود فلورة حمراء في الوسط	وجود فلورة حضراء على سطح غشاء خلايا الورم	وجود فلورة حضراء في الوسط	(+) وجود فلورة (-) غياب فلورة
++++	+	++++	+	(أ) لوسط (أ)
+	++++	-	+++++	(ب) لوسط (ب)

(+): وجود فلورة (-): غياب فلورة

الشكل (أ)

الجزء الثاني  
مع تبيين الفرضيات الأكثروجاهة

١- **القصص**  
 بـ (أ) للاحظ وجود فلورة خضراء وحمراء كبيرة على سطح غشاء خلايا الورم. يفسر ذلك بأن خلايا الورم تعرض البيتيد المستضد لرفقة الـ HALI على سطح غشائتها فاركتعنت بها الأجسام المضادة لفلورا. ثم تعرفت عليها الخلايا **Tc** مزدوجاً وقامت بشربها (لم تفلت من الجهاز المناعي).  
 بـ (ب) الحاوي خلايا ورمية أخذت من ورم في مرحلة متقدمة.


في الوسط، وجزء كبير في الوسط. يفسر بأن خلايا الورم لا تتعرض لـ HLAI والبيئة المُستهدفة على سطح الخلايا، فلم تُعرف عليها الخلايا LTc (أفتلت من الجهاز المناعي).

**طريقة الأولى:** تعتمد على الحقن المشكك لـ  $\text{IL-2}$  والذي يسمح برفع عدد المنشاويات في الدم. فزيادة  $\text{IL-2}$  يكفي لتخریب كل الخلايا السرطانية للورم الصغير الذي لم تفطر خلاياه بعد آلية الإدارات. **النظام المناعي**، لذلك يعطي العلاج بهذه الطريقة نتائجاً جيدة ومتغيرة الورم.

**طريقة الثانية:** حقن  $\text{IL-1}$  بأعداد هائلة يسمح باختفائه الورم قبل أن تقللت الخلايا الورمية وتُصبح مثارمة.

، تكون الطريقتان العلاجيتان ناجعتين (فعالتين) إذا أكتشف المرض في بداية الإصابة (أيام حديثة زيرة)، بينما لا تكون فعالة إذا أكتشف المرض في مرحلة متقدمة نتيجة ظهور الحالات السرطانية المقاومة

**سبحة الوقاية:** إجراء فحوصات طبية دورية للكشف المبكر عن الورم قبل أن يتضخم وبصعب علاجه.



الشكل (ب)  
الوثقة (03)

باستغلاله لمعضيات الوئيدين (02) و(03):

- 1- قيَّمت إفلاطون عدم إفلات الخلايا الورمية من الجهاز المناعي الطبيعي مُثِّلِّاً دور البروتينات في ذلك بـ بين الغرضية الأكْثَر وجاهة.
- 2- استنتج بأن التدخل العلاجي غير فعال دوماً ضد السرطان ثم قدم نصيحة وقائية لتفادي تطور هذا المرض.

الجزء الثالث

لخيص في مختلف مراحل الاستجابة المناعية ضد الخلايا السرطانية اعتماداً على مكتباتك ومتغيرات المعلومات التي توصلت إليها من هذه الدراسة.

لأجابة التمهذجية

الجزء الأول

دور الخلايا المداعبة

- **الخلية العارضة (CPA):** بلغمة الخلية السرطانية وهضمها جزئياً وعرض بيتاً لها المستضدية رفقة لـ HLAII على سطح غشائها، وكذلك إفراز الأنترلوكين 1 (IL1) لتشييط الخلايا LT4 و LT8 التي تحمل مستقبلات غشائية TCR تتكامل بنيوياً مع المعقد بيتاً - HLA.
- **الخلية LT-CD4:** تعرف على المعد (بيتاً مستضدي - HLAII) المعروض من طرف الخلية العارضة (تعرف مزدوج)، فتشييط وتتكاثر وتنما إلى LTh مفرزة لأنترلوكين 2 الذي يمحق الخلايا LT4 و LT8 على لكتايز والتنما إلى خلايا LTc و LTh على الترتيب.


لني تشكل ثقوب على غشاء الخلية السرطانية وتخرجاً بصمة حلولية.

- التراجم الفرضية

**الفرضية 1:** بعض الخلايا السرطانية تكتب جزيئات HLA<sub>1</sub> غير طبيعية لا يمكن للخلايا LT8 أن تعرف لها.

- الفرضية 2: بعض الخلايا السرطانية لا تركب جزيئات الـ HLAI وكانت متحابطة.


علوم الطبيعة والحياة من



- ٤- تعرف على المخلابا (س)، (ع)، (ص)، (ل) مع ذكر الأسس المعمدة في ذلك.  
و- أسمى العلاقة الوظيفية بين الخلبيتين (س) و(ل).


جزء الثاني

خلال أيام من التجربة السابقة تم قياس كمية كل من الغلوبولينات المناعية (Ig)، البروفرين، الـ ADN لدى والـ ADN الفيروسي في الغرفتين (1) و(3) فأعطت النتائج المبينة في الوثيقة (02).



- أ- أثغر غليلاً مقارناً للمنحوتات المحصل عليها في الغرفتين (١) و(٣).  
ب- فسر الشائع المحصل عليها.

السنة المضية



التمرين 03

للمعرفة الآليات هذا التدخل تُفتح الدراسة التالية.

الجزء الأول

نوع خلاباً مناعية مختلفة على ثلاث غرف في شروط تجريبية مبينة في الشكل (أ) من الوثيقة (٠١) حيث تُفصل الغرفة (١) عن الغرفة (٢) بعشاء نفود للجزيئات وغير نفود للخلايا في حين تُفصل الغرفة (٢) عن الغرفة (٣) بعشاء غير نفود. بينما يوضح الشكلان (ب) و(ج) من نفس الوثيقة رسمًا تخطيطياً للظواهر الخلوية التي تحدث داخل الغرف الثلاثة.

السلسلة الفعلية  
2- استخلص مع التحليل بخط الاستجابة المناعية التي حرض المستضد على حدوثها في كل من الغرفتين (1) و (3).

الجزء الثالث  
من النتائج للتوصيل إليها ومكتباتك المجزأة خلاصة توضح دور مختلف الجزيئات والبروتينية المتدخلة في العرض وأقصاء الآلات.

### الإجابة النموذجية

الجزء الأول  
1- التعرف على الخلايا مع ذكر الأسس المعتمدة

الخلية	الأسس المعتمد
الخلية (س)	تعرف على المعدن المستضد - CMHII المعروض على سطح غشاء الخلية المصابة تعرفها مزدوجاً بواسطة TCR.
الخلية (ع)	تعرف على المعدن المستضد - CMHII المعروض على سطح غشاء الخلية المصابة تعرفها مزدوجاً بواسطة TCR.
الخلية (ص)	تعرف على عدد المستضد الفيروسي تعرفها مباشراً بواسطة أجسام مضادة غشائية (BCR).
الخلية (ل) بالغة (عارض)	تقوم بعلامة المستضد وهضمها جزئياً وعرض معدنهاته رفقة CMHII.

2- استنتاج العلاقة الوظيفية بين الخلية LT4 والبالغة

- تحسن البالغة LT4 بعرض عدد المستضد مرتبطاً بال CMHII على سطح غشائها فتتعرف عليه LT4.

- تفرز البالغة الأنترليكين 1 لتنشيط LT4.

### الجزء الثاني

1- التحليل المقارن للمنحنيات

مثل المنحنيات تغيرات كمية كل من الأجسام المضادة، البروفرين، ADN خلوي، ADN فيروسي على مستوى كل من الغرفتين (1) و (3) بدلاً عن الزمن (الأيام) حيث نلاحظ:

- تزايد كمية ADN فيروسي في الغرفة (1) ثم يتلاقي، ويستمر هذا التزايد في الغرفة (3) دون أن ينخفض.

- تزايد كمية ADN الخلوي في الغرفة (1) ثم ثبت الكمية في حين لا تزايد الكمية في الغرفة (3).

- تزايد كمية الأجسام المضادة في الغرفة (1) ثم تتناقص تدريجياً في حين تبقى شبه معدومة في الغرفة (3).

ستتجدد حدوث استجابة مناعية في الغرفة (1) وعدم حدوث استجابة في الغرفة (3).

بـ- تفسير النتائج المعصل عليها

يرجع تزايد كمية ADN الخلوي في الغرفة (1) إلى تضاعفه نتيجة تكاثر الخلايا المناعية LB و LT8، بينما، والمحفظتين بواسطة الأنترليكين 2 الذي أفرزته LT4 في الغرفة (2) والذي انتقل عبر الغشاء

### علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

دور البروتينات في الدفاع عن الذات  
السلسلة الفعلية  
رحلة الفحة (1) مما أدى إلى تمايز الـ LB إلى خلية بلازمة متوجهة للأجسام المضادة والذي يفسر ارتفاع كثتها في الوسط. من جهة أخرى تمايز الـ LT8 إلى المفترزة للبروفرين والذي يفسر ارتفاع كميتها في الوسط.

ويجتاز تمايز كمية الـ ADN الفيروسي إلى تدخل كل من الأجسام المضادة مشكلة مقدرات مناعية مع قنواته إلى تثبيطه ومع تكاثره وانتشاره وتداخله في غرب الخلايا المصابة بافرازها للبروفرين. قد تؤدي تزايد كمية الـ ADN الفيروسي في الغرفة (3) إلى تكاثر الفيروس لغياب الخلايا المناعية استمراراً وعدم انتقال الأنترليكين 2 من الغرفة (2) إلى الغرفة (3) لأن الغشاء غير قفوٌ لغزو الجزيئات.

2- نتائج الاستجابة المناعية هي الغرفة (1)

رحلة مناعية نوعية ذات وساطة خلطية وخلوية في نفس الوقت.

التحليل: إنتاج أجسام مضادة والبروفرين.

في الغرفة (3) عدم حدوث استجابة مناعية.

التحليل: تكاثر الفيروس وانعدام الجزيئات الدفاعية.

الخلية الثالث

يتعرف على الآلات وإقصاؤها في المراحل التالية:

مرحلة التعرف والتنشيط

يعرف الخلايا LB على المستضد تعرفها مباشراً بواسطة مستقبلاتها الغشائية BCR التي تتكامل بنهاها مع عوادس المستضد، ويسمى هذا التعرف بالتحسيس. تعرف الخلايا LT8 بواسطة مستقبلاتها الغشائية على حدودات المستضد المعرضة رفقة الـ HLAI على أغشية الخلايا المصابة، ويسمى هذا التعرف بالتعرف المزدوج. تعرف الخلايا LT4 على أغشية الخلايا المصابة، ويعرفها مزدوجاً كذلك بواسطة مستقبلاتها TCR على عدادات المستضد المعرضة رفقة HLAII على أغشية الخلايا المصابة CPA. تُنشط هذه الخلايا وتتركب على أغشيتها مستقبلات غشائية خاصة بـ IL2.

مرحلة التكاثر والتمايز

غير الخلايا LT4 المنشطة الـ IL2 الذي يحفز تكاثرها لتتشكل كثافة من LT4 المتضادة، يتمايز بعضها إلى LT4m والبعض الآخر إلى LT4m ذات ذاكرة. يرتبط الـ IL2 بمستقبلاته الغشائية النوعية على غشاء الخلايا LB و LT8 المنشطة، فيحفز الخلايا LB على التكاثر والتمايز إلى خلايا بلازمية وخلايا LBm، وبخفر الخلايا LT8 على التكاثر والتمايز إلى خلايا LT8m وخلايا LT8.

مرحلة التخلص من المستضد

غير الخلايا البلازمية أجساماً مضادة نوعية ترتبط بالمستضد الذي حرض على إنتاجها وتشكل مقدرات مناعية تمنع تكاثره وانتشاره وتحميّمه ليتم التخلص منه بواسطة الخلايا البالغة. وتعرف الخلايا LT8 على الخلايا السرطانية تعرضاً مزدوجاً وتفرز البروفرين الذي يشكل ثقباً في الخلايا المصابة مؤدياً إلى تم تحرير على الآلات وإقصاؤها بواسطة جزيئات بروتينية تفرزها الخلايا المناعية.


تعترف الخلايا المقاومة LB و LT من أهم الخلايا المناعية التي تتصدى للمستضدات وذلك بواسطة بروتوبير

وطيفية تزدهرها للتعرف والقضاء على مولد الضد.

#### الجزء الأول

يولد بعض الأفراد عاجزين عن تركيب الأجسام المضادة مما يجبرهم على العيش في أوساط معقمة وعزلة.

توضح الوثيقة (01) نظر الخلايا LB عند فرد عادي.



الوثيقة (01)

1-أ- حدد الظواهر المؤدية إلى تحول الخلية (أ) إلى خلايا الصنف (ب).


ب- يسبب دخول المستضد Z إلى الخصوصية في عددة تغيرات تطرأ على الخلية LB2 ما تؤدي إلى ظهور الخلية (ه). صُفت هذه التغيرات انطلاقاً من معطيات الوثيقة (01). على عدم تحول الخلايا LB1 و LB3 إلى الخلية من النمط (ه).

ج- استنتج طبيعة المادة (س) وحدد مصدرها ودورها في ظهور الخلية (و).

2- قدم ثلاثة فرضيات لتفصيل سبب العجز عن تشكيل الأجسام المضادة.

#### الجزء الثاني

لتوضيح سبب العجز عن تشكيل الأجسام المضادة نقترح عليك الوثيقة (02) التي تتضمن نتائج تطور عدد المقاويات وتغير كمية المادة (س) قبل وبعد 15 يوماً من الحقن بالأناتوكسين الكرازي عند شخصين أحدهما سليم والأخر مصاب.



لتحدة 04: دور البروتينات في الدفاع عن الذات

بين أن معطيات الوثيقة (02) تسمح لك بالتحقق من مدى صحة الفرضيات المقترنة في الجزء الأول.

**الجزء الثالث**  
الخلايا مما جاء في الموضوع، أخيراً خلاصة لأهمية البروتينات في سيرورة الاستجابة المناعية النوعية.

#### الإجابة التموذجية

##### الجزء الأول

1-1- الظواهر المؤدية إلى تحول الخلية (أ) إلى خلايا الصنف

نعم الخلايا الإنسانية (أ) للخلايا LB في مستوى النخاع العظمي الآخر بتراكب مستقبلات غشائية نوعية (س) تندمج في مستوى الغشاء السيتوبلازمي، وهي مستقبلات توافق كل أنواع المحددات المستضدية بيلات الضد، وكل LB لها BCR خاص.

##### ب- وصف التغيرات

يزداد LB2 مع المستضد Z تعرف الخلايا LB2 تعرفها مباشراً مع مولد الضد بواسطة المستقبلات BCR، مما يؤدي إلى تشبيتها فتركب مستقبلات المبلغ الكيميائي.

العليل: تحمل كل من LB1 و LB3 مستقبلات غشائية نوعية BCR لا تتكامل بينها مع مولد الضد Z فلا يبحث لها تعرف ولا تشبيه.

##### ج- طبيعة المادة س

عماً المادة س ارتبطت على المستقبلات الغشائية المحملة على LB2 المشطة فهذا يدل على أن المادة س هي مبلغ كيميائي IL2.

مشهداً: LT4 الناتجة عن تمثيل LT.


لذلك: تحفيز LB2 على التكاثر والتمثيل إلى خلايا بلازمية (و) وخلايا LBm (ن).

##### 2-اقتراح ثلاثة فرضيات

فرضية 1: قلة أو عدم إفراز الأنترلوكين.

فرضية 2: عدم وجود مستقبلات لأنترلوكين على أغشية الخلايا LB.

فرضية 3: عدد مستقبلات المادة س ( الأنترلوكين ) قليل.



يُجل كل فرد وحدة بيولوجية بذاته، إذ يُطعّم ضوبيته المميزة بين مكونات نكاثر وثانيات الخلايا LB، إلا أنه لا يوفر العدد اللازم من الخلايا LB بعد حقنه بالأناتوكسين التكريزي، أي هو يعاني من عجز في نكاثر وثانيات الخلايا LB.

من جهة أخرى، يُبين الشكل (ب) أن كمية المادة س (الأنتلوكين) المفرزة لدى الشخص المصاب قبل وبعد الحقن بالأناتوكسين التكريزي تمايل الكمية المفرزة عند الشخص السليم.

ومنه كل من الفرضيتين 1 و 3 مستبعدة.

تثبت التجربة أن سبب العجز المتمثل في عدم تشكيل الأجسام المضادة عند بعض الأفراد مرتبط بعدم تشكيل مستقبلات الأنترلوكين على LB، فالفرضية 2 هي الفرضية الصحيحة.

## الجزء الثالث

تمثل أهمية البروتينات في سيرورة الاستجابة المناعية النوعية المتناولة في الموضوع في التعرف على مولد الضد وفي التشخيص والنكاثر والثانيات وفي إبطال مفعول مولد الضد.

تشكل الخلايا المقاومة LB في خارج العظام وتكتسب كفاءة المناعية فيه بتركيب مستقبلات غشائية BCR توافق مولدات الضد.

يُؤدي تعرف الخلايا المقاومة LB على المستضد إلى انتخاب ملة من الخلايا المقاومة LB تملك مستقبلات غشائية متكاملة بنهاية مع معدات المستضد: إنه الانتخاب اللمي.


تم مراقبة نكاثر وثانيات الخلايا LB ذات الكفاءة المناعية عن طريق ميلغات كيميائية هي الأنترلوكينات التي يفرزها صفت آخر من الخلايا المقاومة T4 المساعدة (T4h).

لا تؤثر الأنترلوكينات إلا على المقاويات المنشطة، أي المقاويات الحاملة للمستقبلات الغشائية الخاصة بها والتي تظهر بعد التماس مع المستضد.

نظرًا على الخلايا المقاومة المنشطة والمنشطة انقسامات تتبع بتميز هذه الأخيرة إلى خلايا منفذة (خلايا بلازيمية) وخلايا LBm ذات ذكرة.

تُنتج الخلايا البلازيمية أجساماً مضادة ترتبط نوعياً مع مولد الضد الذي حرض على إنتاجها.

يُؤدي تشكيل المعدن المناعي إلى إبطال مفعول مولد الضد، ليتم بعدها التخلص من المعدن المناعي المنشك عن طريق ظاهرة البلعمة.




بالاعتماد على معطيات الوثيقة (02) (أ و ب):

أـ ماذا مثل أحرف وأرقام الشكل أ؟

بـ مثل النسق الوراثي للأبوين معتمداً على معطيات الشكل ب.

### السلسلة الوراثية



**جـ الشرح**  
يُطرح زراعة الأعضاء مشاكل مختلفة تؤدي إلى رفضها من طرف عضوية المستقبل نتيجة خصائص مورثات نظام CMH التي تميز بما يلي:  
ـ ينتمي أيّن:  
ـ ينحدر مورثات نظام CMH (DR, DQ, DP, B, C, A).  
ـ ينحدر أيلات كل مورثة والفرد لا يحمل إلا أيلتين منها.  
ـ ينحدر أيلات كل مورثة والفرد لا يحمل إلا أيلتين منها.  
ـ في الشكل ب فيبين أن:  
ـ الأيلات متساوية السيادة.

ـ وبالتالي عدد احتمالات التراكيب الوراثية الممكنة كبير جداً ولكل فرد تركيبة خاصةٌ ثبوّبة، فباستثناء يوم المفتي يصعب إيجاد فردٍ متماثلٍ لـ CMH ولذلك كلما كانت نسبة التمايز بين الأفراد قليلةٌ مما كان عدد أنواع جزيئات مؤشرات الذات مختلفاً بين المطعى والمستقبل كثيراً وعليه يلعب العضو دور مولد ضد ترفضه مناعة الفرد المستقبل.  
ـ في الأعضاء بدون مراعاة التوافق النسيجي يؤدي إلى الرفض.

### ـ ٤ـ التحليل المقارن

(شكل (أ))

ـ الخلية X مصابة بفيروس.

ـ ركيت جزيئات الـ HLA، تميز بسلسلة طويلة  $\alpha$  وسلسلة قصيرة  $\beta 2m$ .

ـ ركيت بروتين فيروسي، بروتين داخلي المنشأ، ثم فنككه جزئياً إلى بيتيدات صغيرة.

ـ تكبت المعدن (HLAI) - بيتد مستضدي)، في الشبكة الهميولية الفعالة.

ـ تفرض البيتد المستضدي على جزيئة HLAI (الذات المتفاوت) على سطحها الخارجي.


ـ خلية X، خلية مرتبطة بالخلية Y تملك المستقبلات المواتقة للمعدن (HLAI - بيتد مستضدي) فهي خلية Y.

(شكل (ب))

ـ الخلية X، خلية بالغة (CPA).

ـ ركيت جزيئات HLAIII تميز بسلسلتين طوبولين  $\alpha$  و  $\beta$ .

- السلسلة الوراثية**
- ـ اشرح باستدلال منطقى لماذا تطرح زراعة الأعضاء مشاكل تؤدي إلى رفضها من طرف عضوية المستقبل.
- ـ ٢ـ تلعب الجزيئات الغشائية التي تعرض بيتيدات مستضدية دوراً أساسياً في تحديد نمط الاستجابة المناعية، وذلك كما توضح الوثيقة (02) (ج، د).



ـ أخيراً خليلياً مقارناً بين الشكلين جـ وـ دـ يتضمن تحديد:

ـ مصدر البيتد المستضدي.

ـ نمط الـ HLA.

ـ مقر تشكيل المعدن (HLA) - بيتد مستضدي).

ـ نمط كل من الخلايا X، Y، Z، وـ H.

ـ واستنتج نوع الاستجابة المناعية المحتملة في الحالتين ومصير الخلتين X وـ Y.

**الجزء الثالث**

اعتماداً على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومعلوماتك، تلخص دور الجزيئات الغشائية في التمييز بين الذات والآلات.

### الإجابة المودجية

#### الجزء الأول

#### افتراض هرقيات

الفرضية ١: تقبل العضوية الطعم الذي يوافقها من حيث النظام CMH.

الفرضية ٢: ترفض العضوية الطعم الذي يخالفها من حيث النظام CMH.

#### الجزء الثاني

#### ـ ١ـ التعرف على الأحرف والأرقام

ـ أحرف الشكل (أ): تمثل مورثات النظام CMHII وـ CMHIII.

ـ الأرقام: تمثل عدد أنواع أيلات كل مورثة.

- السلة المقصبة
- قاتل بابتلاع بروتين خارجي للثنا ونوكه ضمن فجوة هاضمة إلى ببتيدات صغيرة.
  - شكلت المعدة (HLAII - يزيد مستضدي) ضمن حويصل.
  - تعرض الببتيد المستضدي على جزء HLAII على سطحها الخارجي للخلية T4.
  - استنتاج نوع الاستجابة المناعية ومصدر الخلطين (خ، خ، 3):

مصدر الخلطين (خ، خ، 3)	نوع الاستجابة المناعية
خ: التخريب	استجابة مناعية خلوية
خ: تبقى تشارك في الدفاع	استجابة مناعية خلطية
الشكل (ج)	أو استجابة مناعية خلوية
الشكل (د)	المناعي

### الجزء الثالث

يمثل كل فرد تركيبة بروتينية خاصة من الجزيئات HLA مرتبطة بالتعدد الأليلي للمورثات المشفرة لهن البروتينات. تحدد جزيئات الذات والرثيا وهي تمثل مؤشرات المeria البيولوجية وتعرف باسم: نظام معدن التوافق النسيجي الرئيسي (CMH). تصنف جزيئات HLA إلى صنفين، جزيئات الصنف I: توجد على سطح جميع خلايا العضوية ما عدا الكريات الحمراء. جزيئات الصنف II: توجد بشكل أساس على سطح غشاء بعض الخلايا المناعية (الخلايا العارضة للمستضد، الخلايا LB).

تلعب هذه الجزيئات الفضائية دوراً أساسياً في التمييز بين الذات والآلات: يتضمن باقي النص العلمي الموارد الأساسية التالية:

- تبدي العضوية تسامحاً مناعياً مع عناصر الذات لاستحالة ارتباط الخلايا المقاومة للذات مع خلايا الذات الطبيعية (استحالة حدوث الارتباط).

- تعرف الخلايا LB على المحدد المستضدي تعرفها مباشراً بفضل مستقبلاتها الغشائية النوعية BCR.

- تعرف الخلايا LT4 على المحدد المستضدي تعرفها مباشراً بفضل مستقبلاتها الغشائية النوعية TCR على المحدد المستضدي المعروض على جزيئات HLAII من قبل CPA.

- تعرف الخلايا LT8 على المحدد المستضدي تعرفها مزدوجاً بفضل مستقبلاتها الغشائية النوعية TCR على المحدد المستضدي المعروض على جزيئات HLAI من قبل CPA، كما يتم كذلك هذا التعرف المزدوج بطريقة مباشرة إثر التماش مع الخلايا المصابة التي تحمل المحددات المستضدية على جزيئات HLAII.

تعرف الخلايا LT8 على الخلايا المصابة بالتماس المباشر معها ويكون هذا التعرف تعرفاً مزدوجاً.

### التمرين 06

يعاني بعض الأطفال من قصور مناعي خطير ونادر يصيب حوالي طفل واحد من بين 300 ألف طفل تمثل أمراضه في التهاب رئوي حاد، إسهالات حادة وتقرحات معدية. يجب أن يعيش الطفل المصابة في غرفة معقمة وبغرف تقاعة. هذا الحال المناعي هو مرض وراثي يسمى "نقص المناعة الماء والمرتبط بالكريوموزوم X" يرمز له DISC-X. لفهم هذا الحال واقتراح علاج له قام العلماء بمجموعة من الأبحاث تقدمها لك في هذا الموضوع.

السلة المقصبة

الجزء الأول

رحلة 04 دور البروتينات في الدفاع عن الذات

بنبات خاصة تم قياس تركيز المقاويات والأجسام المضادة في الدم عند الأطفال المصابين بالمرض - DISC-X (مقارنة مع الأطفال غير المصابين، النتائج الحصول عليها مدونة في جدول الوثيقة (01)).


الأطفال المصابين بـ DISC-X	الأطفال غير المصابين	تركيز المقاويات والأجسام المضادة في الدم
4000 من 2000 إلى 2000	0	عدد المقاويات LT في كل ميكرو لتر
1250 من 1000 إلى 400	0	عدد المقاويات LB في كل ميكرو لتر
أكبر من 400	(01)	الأجسام المضادة Ac (ملي غرام / ديسيلتر)

- إعتماداً على الوثيقة (01) فسر ضرورةبقاء الأطفال المصابين في غرف جداً معقمة.
- إنزع فرضين تفسيرين لأصل الحال.

### الجزء الثاني

إيات مدى صحة إحدى الفرضيتين واقتراح علاج إلنك الدراسة التالية:

تلل الوثيقة (2) مستقبلات غشائية عند الخلايا الأم المنتجة للخلايا المقاوية LT المتواجدة في نفقي الطعام عند الأطفال المصابين وغير مصابين.



- أ- بين باستغلال الوثيقة (2) صحة إحدى الفرضيتين (سبب المرض DISC-X).
- ب- لعلاج الأطفال المصابين بهذا المرض تم الاعتماد على تقنية العلاج الورائي. لفترة زمنية تندد إلى عدة أشهر، تتمثل في نقل المورثة المسئولة عن تركيب بروتين غشائي ضروري لتنشيط انقسام وثابر المقاويات من خلايا أصلية (في نفقي الطعام). لهذا الغرض تم استخلاص خلايا أصلية لل مقاويات LT من نفقي الطعام للأطفال المصابين وحقنها بالمورثة السابقة ثم يعاد حقن هذه الخلايا المعدلة وراثياً للأطفال المصابين.

## السلة الفنية

رسالة: دور البروتينات في الدفاع عن الذات  
عن البذور نلاحظ أنه رغم وجود الخلايا LB المسئولة عن الاستجابة المناعية الخلطية إلا أنه لا يتم إنتاج الأجسام المضادة بسبب غياب الخلايا LT4، وهذا ما يعيق تحفيزها على التكاثر والتمايز إلى الخلايا LT8 المنتجة للأجسام المضادة.  
يلزم هؤلاء الأطفال لا يمتلكون المقاويم LT8 المسئولة عن الاستجابة المناعية الخلطية.  
غياب الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية يؤدي إلى ظهور أمراض عند هؤلاء الأطفال لكون الجهاز المناعي غير وظيفي وهذا ما يفسر ضرورة بقاءهم في غرف جد معقمة.

## 2. الاقتراحفرضيتين

- الفرضية 1: غياب الخلايا الأصلية للمقاويم A على مستوى نقي العظم.
- الفرضية 2: غياب الغدة التيموسية المسئولة عن نضج المقاويم A.

## الجزء الثاني

## 1- تبيين سبب مرض DISC-X

بالنسبة للأطفال غير المصابين: نلاحظ أن السطح الخارجي لغشاء الخلية الأصلية المتواجدة في نقي العظام ينطلي مستقبلاً غشائياً وظيفياً والذي يتكامل مع البروتين المحفز، فإثر توضع (تبييت) البروتين المحفز عليه (على المستقبل الغشائي) يحفزه على التكاثر والتمايز فبم تنشيط وتحسيس الخلية فتكاثر الخلية الأصلية وتتمايز مشكلة خلية مفاوية (LT) متمازية.


بالنسبة للأطفال المصابين بالـDISC-X: نلاحظ أن السطح الخارجي لغشاء الخلية الأصلية يمتلك جزءاً فقط من مستقبل غشائي ولا يتكامل مع البروتين المحفز مما يؤدي إلى عدم تنشيط عملية تكاثر وتمايز الخلايا الأصلية على مستوى نقي العظام مما يؤدي إلى عدم تكاثر وتمايز الخلايا المولدة للخلايا LT.  
إذ سبب المرض يعود إلى غياب مستقبل غشائي وظيفي (وجود مستقبل غشائي غير وظيفي) على سطح الخلايا الأصلية المولدة للخلايا LT وهذا الذي يمنع تحفيزها على التكاثر والتمايز إلى خلايا LT.  
ومن الفرضية 1 هي الفرضية الصحيحة والتي تنص على: غياب الخلايا الأصلية للمقاويم A على مستوى نقي العظم.

## 2- تبيين إمكانية العلاج المقترن

نوضح الوثيقة (3 - أ) أن الأطفال المعالجين أصبحوا قادرين على إنتاج الخلايا LT وبذلك تحفيز الخلايا LT على التكاثر والتمايز إلى خلايا متعددة للأجسام المضادة، وهذا ما يفسر ظهور الأجسام المضادة عند الأطفال المعالجين وقدرت بـ 323 (ميلي غرام / ديسيلتر) بعد 180 يوماً من العلاج مقارنة بالأطفال السليمين الذين يتراوحون 400 (ميلي غرام / ديسيلتر).  
كما يمثل جدول الوثيقة (3 - ب) كمية الأجسام المضادة عندأطفال معالجين وأطفال غير مصابين بعد خضم بعض المستضدات.

حيث نلاحظ أن الأطفال المعالجين بالعلاج الوراثي أصبحوا قادرين على إنتاج أجسام مضادة إثر تلقيهم مختلف اللقاحات وكانت كمية الأجسام المضادة المنتجة معتبرة، أي أن جهازهم المناعي أصبح وظيفياً.  
إذ يتعزز العلاج الوراثي فعالاً.

للحظة: هذه التقنية صعبة النجاح وتتطلب عدة تجارب كي تندمج المورثة.



بعد ستة أشهر من إنتهاء العلاج قيست كمية الأجسام المضادة عند الأطفال المعالجين وقدرت بـ 323 (ميلي غرام / ديسيلتر) بعد 180 يوماً من العلاج. مثل الوثيقة (3 - أ) النتائج الحصول عليها بعد العلاج الوراثي.

لأختبار مدى نجاعة العلاج تقوم بتنقيح الأطفال ضد بعض الأمراض مثل التوكسين الكرازي والديفتيري وفرووس شلل الأطفال، النتائج مدونة في جدول الوثيقة (3 - ب).

كمية الأجسام المضادة ضد التوكسين الكرازي للأطفال (U/ml)	كمية الأجسام المضادة ضد التوكسين الديفتيري للأطفال (U/ml)	كمية الأجسام المضادة ضد التوكسين الكرازي (U/ml)	الأطفال المعالجين
215	0.86	0.53	الأطفال غير المصابين
أكبر من 80	أكبر من 0.2	أكبر من 0.2	المصابين

الوثيقة (03) - الشكل (ب)

- اعتماداً على شكل الوثيقة (03) بين إمكانية العلاج المقترن من طرف الباحثين في تصحيح هذا المرض الوراثي.

## الجزء الثالث

آخر خلاصة توضح خلاياها أصل مرض نفس المناعة المرتبط بالكروموسوم X.

## الإجابة النموذجية

## الجزء الأول

## 1- التقسيم

تبين نتائج جدول الوثيقة (01) غياب الخلايا المفاوية LT ب النوعيها LT4 و LT8 عند الأطفال المعالجين. نعلم أن الخلايا LT4 هي الخلايا الموربة في الاستجابة المناعية، فهي تحفز الخلايا المناعية LB و LT8 لتوليد استجابة مناعية قوية وكثيفة، وذلك بتمايزها إلى خلايا معاونة LTb مفرزة للأنتителوكين 2، وغيابها يؤدي إلى عدم حدوث الاستجابة المناعية النوعية ب نوعيها الخلطية والخلوية.

رئيسي دور البروتينات في الدفاع عن الذات						علوم الطبيعة والحياة من الألب إلى الـ ز	السلة الثالثة						
السلة العضية		التجربة 3	التجربة 2	التجربة 1	الخلايا الموضعية في الغرفة العلوية	الخلايا الموضعية في الغرفة السفلية	الخلالا الموضعية في الغرفة العلوية						
LT4		لا توجد		لا توجد									
LB		LB + LT4		LB									
VZV	HHV8	VZV	HHV8	VZV	HHV8	نوع المستضد المتواجد في وسط الزرع	نحوه						
غياب	وجود	غياب	غياب	غياب	VZV	ارتصاص مع HHV8	غيرها						
غياب	وجود	غياب	غياب	غياب	VZV	ارتصاص مع HHV8	غيرها						
الجدول 2		الوثيقة (01)		الوثيقة (01)		الوثيقة (01)							
ـ من خلال الجدول (2) من نفس الوثيقة استخرج العلاقة الموجودة بين المقاويات LB و LT4 .													
ـ من خلال تحليلك لنتائج الجدول (1) من الوثيقة (01) اقترح فرضيتين توضحان سبب عدم قدرة الشخص على مقاومة الفيروسوـات HHV8 و VZV .													
ـ العـة الثانية													
ـ تأكـد من صحة إحدى الفرضيتـين المقترـجـتين في الجزء السـابـق تقوم بقياس كمية المقاويـات LT4 في أعضـاء الخـطـيطـة عند مجموعـة من الأشـخاص . النـاتـج مـدوـنة في الجـدول (01) من الوـثـيقـة (02) .													
ـ إن غزو الفيروس للخلـة المستـهدـفة يتم بـواسـطة بـروـتـينـاتـ العـشـائـيةـ (ـالمـخدـدـاتـ المـسـتـضـدـيةـ) مع بعضـ البرـوتـينـاتـ العـشـائـيةـ للـخلـةـ المـضـيـفـةـ (ـالـمـسـتـهـدـفـةـ)ـ ،ـ الجـدولـ (02)ـ منـ الوـثـيقـةـ (02)ـ يـبيـعـ ذلكـ .													
ـ كـمـيـةـ الـمـقاـويـاتـ LT4ـ فيـ الـأـعـصـاءـ الـخـطـيطـةـ													
ـ عندـ شـخـصـ سـليمـ		ـ 290.10 <sup>9</sup> ـ		ـ عندـ شـخـصـ مـصـابـينـ بـ HHV8ـ أوـ VZVـ		ـ 300.10 <sup>13</sup> ـ							
ـ أقلـ مـنـ 100.10 <sup>9</sup> ـ		ـ عندـ الشـخـصـ سـ		ـ الجـدولـ (01)ـ		ـ							
ـ الجـدولـ (02)ـ													
ـ نوعـ الـخـلـةـ		ـ الـبرـوتـينـاتـ العـشـائـيةـ لـلـخـلـالـاـ المـسـتـهـدـفـةـ		ـ المـخدـدـاتـ المـسـتـضـدـيةـ		ـ الـفـيـروـسـاتـ							
ـ خـلـالـاـ البـشـرـةـ		ـ مـسـتـقـبـلـ 03b1ـ		ـ غـلـيكـوـبرـوتـينـ RGDـ		ـ HHV8ـ							
ـ خـلـالـاـ (ـخـابـاتـ)ـ عـصـبـيـةـ لـلـخـلـلـ		ـ مـسـتـقـبـلـ نوعـيـ		ـ غـلـيكـوـبرـوتـينـ مـانـوزـ 6ـ فـوسـفـاتـ		ـ VZVـ							
ـ الـخـلـالـاـ LT4ـ		ـ مـسـتـقـبـلـ نوعـيـ		ـ بـروـتـينـ GP120ـ		ـ VIHـ							
ـ الاستـجـاجـةـ المـنـاعـيـةـ ضـدـ الـفـيـروـسـ HHV8ـ وـ الـفـيـروـسـ VZVـ مـعـ التـعـلـيلـ .													
ـ الـوـثـيقـةـ (02)ـ													

الجزء الثالث  
الخلـلـ الـمـوجـودـ فيـ الـكـروـمـوزـومـ Xـ يـؤـديـ إـلـىـ عدمـ اـكـتمـالـ تـصـنـيعـ الـبرـوتـينـ العـشـائـيـ علىـ سـطـحـ أـغـشـيـةـ الـخلـالـاـ المـلـفـوـظـةـ المـلـفـوـظـةـ الـأـصـلـيـةـ لـلـخـلـالـاـ المـلـفـوـظـةـ،ـ وـمـنـهـ عدمـ إـمـكـانـيـةـ تـبـيـبـ الـبرـوتـينـ المـخـفـرـ عـلـىـ التـكـاثـرـ وـالـتـماـيزـ فيـ الـعـرـقـيـ،ـ يـؤـديـ ذـلـكـ إـلـىـ عدمـ تـشـبـطـ الـخـلـالـاـ الأـصـلـيـ وـعـدـمـ تـماـيزـهـ لـاـنـتـاجـ الـخـلـالـاـ المـلـفـوـظـةـ LTـ وـبـالـإـنـ غـيـرـاـمـاـ وـعـدـمـ حدـوثـ اـسـتـجـاجـةـ مـنـاعـيـةـ،ـ هـذـاـ مـاـ يـعـرـفـ بـمـرضـ نـقصـ المـنـاعـةـ.

### ـ كـمـ التـعـرـيفـ 07

ـ تستـطـعـ الـعـضـوـيـةـ التـعـيـزـ بـنـ الـمـكـوـنـاتـ الـحـامـيـةـ بـالـذـاتـ وـالـمـكـوـنـاتـ الـغـرـيـبةـ عـنـهـ (ـالـلـادـاـتـ)،ـ إـلـىـ تـوـجـهـ بـعـضـ جـزيـئـاتـ الـلـادـاـتـ الـتـيـ تـعـزـزـ الـعـضـوـيـةـ عـلـىـ القـضـاءـ عـلـىـهـ،ـ لـفـهـمـ أـكـثـرـ لـأـلـيـةـ عـمـلـ الـخـلـالـاـ المـنـاعـيـةـ

ـ تـقـومـ بـالـدـرـاسـةـ التـالـيـةـ

### ـ الـجـزـءـ الـأـلـوـاـنـ

ـ كـشـ طـيـبـ عـنـدـ شـخـصـ سـ إـصـاـبـةـ بـورـمـ جـلـدـيـ sorcome de Kaposiـ وـ هـوـ وـرمـ جـلـدـيـ (ـسـرـطـانـ)ـ بـسـبـبـ فـيـروـسـ Zonaـ).ـ وـذـلـكـ مـرـضـ جـلـدـيـ نـاتـجـ عـنـ فـيـروـسـ (VZVـ).ـ إـنـ الـأـشـخـاصـ الـعـادـيونـ الـذـينـ يـمـلـكـونـ جـهـارـاـ مـنـاعـيـاـ فـعـالـاـ يـقاـمـونـ هـذـهـ الـفـيـروـسـاتـ (ـقـادـرـينـ عـلـىـ القـضـاءـ عـلـىـهـ).ـ لـفـهـمـ مـلـاـنـ (ـ01ـ)ـ وـ(ـ02ـ)ـ مـنـ الـوـثـيقـةـ (ـ01ـ)ـ حـيـثـ أـنـ الـجـدولـ (ـ02ـ)ـ يـمـثـلـ نـاتـجـ تـبـيـبـ عـلـىـكـ التـنـاجـ الـعـشـائـيـةـ المـوـضـحـةـ فيـ الـجـدولـ (ـ01ـ)ـ حـيـثـ قـامـ بـيـنـعـ خـلـالـاـ المـلـفـوـظـةـ مـحـسـةـ بـعـدـ تـحـضـيـنـهـ مـعـ الـمـسـتـضـدـ فيـ حـجـرـ زـرـاعـةـ مـارـبـوكـ مـعـ بـرـشـ الزـرـعـ وـتـعرـضـ الـرـاشـاهـ لـتـحـصـلـ عـلـيـهـ إـلـىـ مـسـتـضـدـاتـ VZVـ HHV8ـ وـ

كمـيـةـ الـأـجـسـامـ المـضـادـ ضدـ HHV8ـ (ـوـمـ /ـ مـلـ)	كمـيـةـ الـأـجـسـامـ المـضـادـ ضدـ VZVـ (ـوـمـ /ـ مـلـ)	الـشـخـصـ سـ
10	2	شـخـصـ لـمـ يـعـبـ بـالـفـيـروـسـ
0	0	شـخـصـ مـصـابـ بـالـفـيـروـسـ HHV8ـ
0	64	شـخـصـ مـصـابـ بـالـفـيـروـسـ VZVـ
300	0	الـجـدولـ 1ـ

السلسلة التفضية

رسالة ٠٤ دور البروتينات في الدفاع عن الذات  
٢- تبيين مسحة إحدى الفرضيات  
من خلال نتائج الجدول (٠١) من الوثيقة (٠٢) عدد المقاويات LT4 عند الشخص س يكون متخصصاً في الأعضاء الحيوانية بالمقارنة مع الأشخاص الغير مصابين والمصابين بالفيروسات HHV8 على الترتيب  $290.10^9$  و  $300.10^9$ .

له عدم مقاومة عضوية الشخص س للفيروسات VZV و HHV8 نتيجة العجز المناعي الذي يؤدي إلى نقص الكبير في المقاويات LT4 والذي يسببه فيروس VIH المصايب به الشخص س حيث يحمل فيروس VIH مستضدات غليكوبروتينية GP120 والتي تتكامل بنوباً مع المستقبل الغشائي للمقاويات LT4 مما يتيح بإصابة هذه المقاويات حيث تصبح متحركة للفيروس VIH فتتم استنزافها تدريجياً نتيجة لإمالة المنكورة وهذا النقص في المقاويات LT4 سيؤدي بالضرورة لغياب التحفيز المناعي ، وبالتالي يتيح المقاويات غير قادرة على التكاثر ثم التمايز في غياب هذا التحفيز مما يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة بكميات ضعيفة جداً غير كافية للقضاء على الفيروسات HHV8 و VZV. وبالتالي فالفرضية المحققة هي رقم ٢ والغير محققة هي رقم ١ والتي تنص على نقص في المقاويات LB في المجموعة للأجسام المضادة.

الإجابة النموذجيةالجزء الأول  
١- التحليل


من خلال الجدول (١) من الوثيقة (٠١) نجد عند الشخص س كمية الأجسام المضادة النوعية للفيروسات منخفضة جداً وهي ٢٠٠ م / مل النوعية لـ HHV8 و ٦٠٠ م / مل النوعية لـ VZV. في حالة الأشخاص الغير مصابين تكون كمية الأجسام المضادة النوعية للفيروسات السابقة متعدمة وعند الأشخاص المصايب HHV8 فقط تكون كمية الأجسام المضادة النوعية لهذا النوع من الفيروسات مرتفعة ٦٤٠٠ م / مل مما يتيح ضد فيروس VZV متعدمة وعند الأشخاص المصايب بالفيروس VZV تكون لديهم كمية الأجسام المضادة النوعية لهذا النوع من الفيروسات مرتفعة ٣٠٠٠ م / مل والنوعية للفيروس HHV8 تكون متعدمة.


الفرضيات المقترنات

- الفرضية ١: نقص في المقاويات LB المسؤول عن إنتاج الخلايا المنتجة للأجسام المضادة.
- الفرضية ٢: نقص في LT4 المسئولة عن تحفيز LB (عجز مناعي).
- استخراج العلاقة الموجودة بين المقاويات

العلاقة هي تعاون مناعي خلوي عن طريق التحفيز بمادة كيميائية ذات طبيعة غليكوبروتينية هي الأنترولين ٢ حيث من خلال نتائج الجدول (٠٢) من الوثيقة (٠١) نجد أن نتائج الأجسام المضادة النوعية للفيروسات HHV8 و VZV يكون في حالة وجود LB و LT4 معاً في نفس الغرفة أو تواجد LT4 في الغرفة العلوية و LT4 في الغرفة السفلية مما يدل على إنتاج الأجسام المضادة من طرف LB بينما تواجد LT4 التي تفرز المبلغ الكيميائي ، الذي يمر من الغرفة السفلية مكان تواجد LB المحسنة ضد الفيروسات حيث يتم تحفيزها على التكاثر ثم التمايز إلى خلايا بلازمية متحركة لأجسام مضادة نوعية للفيروسات السابقة.

الجزء الثاني  
١- استنتاج نوع الاستجابة ضد الفيروسات HHV8 و VZV.  
نوع الاستجابة المناعية هي مناعة نوعية ذات وساطة خلطية وتعلل ذلك بتدخل الأجسام المضادة التي تنتجه الخلايا البلازمية والتي مصدرها من تكاثر ثم تمايز المقاويات LB هذه الأخيرة تم تحفيزها ، LT4.





### الجزء الثالث

يُضيف المعلومات المستخرجة من هذه الدراسة ومكتسباتك المعرفية، أخيراً خلاصة تبين فيها أن الجمع بين المضادات الحيوية والأجسام المضادة يمكن أن يكون علاجاً أكثر فعالية ضد المكورات العنقودية الذهبية وبالتالي يحبب الانكسارات.

#### الإجابة النموذجية

##### الجزء الأول

###### 1- تحليل النتائج

###### الشكل (أ) من الوثيقة (01)

بنظر صورة أخذت بالجهاز الإلكتروني للمايكروفاي خلال ابتلاع مكورات عنقودية ذهبية في ساعة واحدة و 24 ساعة حيث نلاحظ:

بعد ساعة من البلعمة نلاحظ تواجد بكثيريا المكورات العنقودية الذهبية واحدة فقط داخل المايكروفاي.


بعد 24 ساعة من البلعمة نلاحظ تواجد ثلث عناصر بكثيرية، إثنان منها في حالة انقسام خيسي دليل على تكاثرها مقاومتها للنشاط التدميري للمايكروفاي.

نستنتج أن المايكروفاي هي ملجاً داخل خلوي للمكورات العنقودية الذهبية، فهي تقوم ببلعمة البكتيريا خلفية البلعمة لكنها تعجز على تدمير كل المكورات العنقودية الذهبية حيث تكاثر هذه الأخيرة داخلها.

###### الشكل (ب) من الوثيقة (01)

بنظر الشكل (ب) تغير عدد بكثيريا المكورات العنقودية الذهبية الحية بنوعها في غياب وفي وجود المضاد الحيوي بدلاله الزمن.

نسبة للمكورات الرئوية من الشكل خارج خلوي وفي غياب المضاد الحيوي في وسط الزرع، نلاحظ في بداية ارتفاع عددها من  $10^8$  إلى  $10^{10}$  بعد 5 ساعات من حقن المضاد الحيوي ثم ينخفض بعد ذلك ثانية تقريراً طوال مدة التجربة (25 ساعة) دليل على تكاثرها ومقاومتها للهجاز المناعي.



كل (ب)


نقة (01)

من الوثيقة (01).

في العلاج بالمضادات الحيوية ضد المكورات العنقودية

ل داخل خلوية للمكورات العنقودية الذهبية، يتم ربط هذه البكتيريا. يظهر الشكل (أ) من الوثيقة (02) بلعنة، وجود المضاد الحيوي فقط. بينما يظهر الشكل (ب) به المرتبطة مع الأجسام المضادة النوعية الحاملة لجزيئات

ن الشكل داخل خلوي في كليتي فئران 4 أيام بعد ظهور عليها مثيلة في الوثيقة (03).



الوثيقة (02)

**السلة العصبية**  
بالنسبة للذكورات العنقودية من الشكل داخل خلوي وفي وجود المضاد الحيوي، نلاحظ خلال 6 ساعات الأولى من حقن المضاد الحيوي انخفاضاً طفيفاً في عدده، بعد ذلك يرتفع العدد ليصل إلى حوالي  $10^4$  ذكوراً من حقن المضاد الحيوي وهذا يدل على تكاثرها لعدم فعالية المضاد الحيوي ضد الشكل داخل خلوي. وعكس ذلك بالنسبة للذكورات العنقودية الذهبية من الشكل خارج خلوي فهى موجودة في المضاد الحيوي نلاحظ انخفاضاً سريعاً في عدد البكتيريا من  $10^6$  إلى أن تصل إلى قيمة دينا بعد 25 ساعة من حقن المضاد الحيوي وهذا يدل على تدعيمها لفعالية المضادات الحيوية ضد الشكل خارج خلوي.

نستنتج أن المضادات الحيوية المستخدمة في العلاج ضد الذكورات العنقودية الذهبية تكون أكثر فعالية ضد الشكل خارج خلوي مقارنة بالشكل داخل خلوي من البكتيريا.

**2- اقتراح فرضية**  
نسمح للأجسام المضادة البوية ضد الذكورات العنقودية الذهبية في إدخال جزيئات المضاد الحيوي إلى الماكروفاج.

#### الجزء الثاني

**التحقق من صحة الفرضية**  
استغلال معطيات الوثيقة (02)

الشكل (أ): في وجود المضاد الحيوي فقط، تبلغ الماكروفاج الذكورات العنقودية فقط بظاهره البلعمة ببقاء المضاد الحيوي خارج الماكروفاج دليل على عدم قدرة جزيئات المضاد الحيوي الحرة على النزول إلى داخل الماكروفاج.

الشكل (ب): في وجود أجسام مضادة حاملة لجزيئات المضاد الحيوي، ترتبط نوعياً مع المستضد (الذكورات العنقودية) مشكلة معقداً مناعياً، يتم بلعمة المعقد المناعي من قبل الماكروفاج وعلى مستوى السيتوبلازم يتم تحرير وتشييط جزيئات المضاد الحيوي بواسطة الإنزيم بروتياز وهذا يدل على أن دخول المضادات الحيوية إلى داخل الماكروفاج يتطلب ارتباطها مع الأجسام المضادة.

إذن نسمح للأجسام المضادة المرتبطة بالمضاد الحيوي بإدخال هذا الأخير إلى داخل الماكروفاج.

**استغلال معطيات الوثيقة (03)**

مثل الوثيقة تغير عدد الذكورات العنقودية الحية بعد 4 أيام من الإصابة خلال علاجات مختلفة.

عند العلاج بحقن ماء ملحى نلاحظ عدداً كبيراً من الذكورات العنقودية الحية (حوالي  $10^8$ ) دليل على تكاثرها لعدم فعالية هذا العلاج.

عند العلاج بحقن للمضادات الحيوية فقط نلاحظ بقاء عدد الذكورات العنقودية الحية مرتفعاً نسبياً (حدود  $10^6$ ) وهو أقل مقارنة مع العلاج الأول (الماء الملحى) دليل على الفعالية المحددة للمضاد الحيوي (فعالية ضد الشكل الخارجي فقط).

**وحدة 04: دور البروتينات في الدفاع عن الذات**  
**السلسلة الفرعية**

بعد العلاج يختفي الأجسام المضادة المرتبطة بجزيئات المضاد الحيوي نلاحظ انخفاضاً كبيراً جداً في عدد الذكورات العنقودية الحية<sup>(10³)</sup> دليل على الفعالية الكبيرة لهذا العلاج في القضاء على المذكورات العنقودية خلال توقف تكاثرها داخل الماكروفاج ومن ثم القضاء عليها.

بين المضادات الحيوية المرتبطة بالأجسام المضادة تكون أكثر فعالية ضد الشكل الداخلي للمذكورات العنقودية الذهبية، فهي تسمح بإدخال المضاد الحيوي إلى داخل الماكروفاج. يسمح البروتين المتناثر من حقن المضاد الحيوي وتحريض جزيئات المضاد الحيوي. تعمل المضادات الحيوية على وقف تطور (تكاثر) لكثيرها داخل الماكروفاج ومن ثم القضاء عليها ومنع انتشارها داخل العضوية.

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المفترضة سابقاً.

#### الجزء الثالث

ذلك يكتسبها المذكورات العنقودية الذهبية القدرة على مقاومة رد فعل الجهاز المناعي من خلال جلوتها إلى داخل الماكروفاج لتتكاثر داخلها لعدم قدرة الماكروفاج على تحريرها.

من أجل المقاومة ضد هذه البكتيريا تستخدم المضادات الحيوية وهي مواد كيميائية تسمح بتحريض البكتيريا أو منع تطورها، ولتحسين العلاج بالمضادات الحيوية قام الباحثون بالجمع بينها وبين الأجسام المضادة.

الأجسام المضادة بروتينات تتدخل في الرد المناعي الخلطي حيث ترتبط نوعياً مع المستضدات (المذكورات العنقودية الذهبية) التي حضرت على إنتاجها وتشكل معقدات مناعية تعمل على تعديل وإبطال مفعول المضادات الحيوية في الوسط الخارجي على تحرير البكتيريا أو منع تطورها ولكنها عاجزة عن ذلك ضد الشكل الداخلي لهذه البكتيريا.

لكي يكون العلاج أكثر فعالية ضد الذكورات العنقودية الذهبية بشكلها الخارجي والداخلي يجب أن يكون العلاج من:

مضاد حيوي ضد البكتيريا من الشكل الخارجي ومضاد حيوي مرتبط بجسم مضاد موجه ضد الشكل داخل خلوي حيث يسمح الجسم المضاد بإدخال المضاد الحيوي خلال بلعمة المعقد المناعي من قبل الماكروفاج. نتتج الماكروفاج البروتين الذي يسمح بتحريض وتشييط المضاد الحيوي، هذا الأخير يعمل على وقف تطور البكتيريا من الشكل الداخلي والقضاء عليها وبالتالي تحجب الانقسامات.

## الوحدة ٥٥: دور البروتينات في الاتصال العصبي

### ١- جزء الدروس

سلسلة الفضية

- كمون وتيار  
في الكهرباء: ينتج الكمون (التوتر) عن وجود شحنة ساكنة في المحلول، وينتاج تيار عن انتقاماً من نقل.  
١.١. كون كهربائي

في الليف العصبي، الشحنات هي الشوارد  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ، المحلول هو المبوب والسائل خارج خلوي، نقل هو الفضاء الهيروي والناقل هو القنوات الأيونية.  
بعد شوارد (شحنات) داخل الليف ينتج عنه كمون (كتافة الشحنات) معين. وجود شوارد خارج الليف (شحنات) ينتج عنه كمون كذلك تختلف قيمته عن الأول. حسب الفرق بين الكمون الأول ولكن بمقدار يساوي  $70 \text{ ميلي فولط}$ ، يسمى بكون الراحة.  
كون الراحة سالب لأنّه يتفق على حسابه من الداخل إلى الخارج (كون داخلي تنفس منه كمون خارجي). لو تم الانفاق على حسابه عكس ذلك (من الخارج إلى الداخل) لكان ندوسه الآن أنه موجب (يقدر بـ  $70 \text{ ميلي فولط}$ ).

- جهاز قياس فرق الكمون: راسم الاهتزاز (الذبذبات) المهيطي (أوسيلوسكوب).
- وحدة قياس فرق الكمون: الغولط وقدر في الليف العصبي بالملي فولط.
- ٢- تيار كهربائي

يعتبر التيار الكهربائي عن انتقال شحنات عبر ناقل. عندما تربط قطب بطارية الموجب والسلب بسلك نقل، تستغل فيه إلكترونات (شحنات سالبة) ويتولد فيه تيار كهربائي.  
في الليف العصبي، يتولد التيار الكهربائي عن انتقال الشوارد  $\text{Na}^+$  و  $\text{K}^+$  و  $\text{Cl}^-$  عبر قنوات أيونية تغير سلك الناقل للتيار.

- جهاز قياس التيار الكهربائي: أمبير متر حساس جداً للتيار الكهربائي متصل بعاصفة مجهرية (تقنية باش كلام).
- وحدة قياس التيار الكهربائي: الأمبير وقدر في الليف العصبي باليكرو أمبير.
- ٣- جهاز عصبي

يكون الجهاز العصبي مثل أجهزة العضوية الأخرى من أعضاء وخلايا وجزيئات.

- ٤- أعضاء الجهاز العصبي
  - أ- أعضاء مرکبیة  
تشمل في الدماغ والمخالع الشوكي، وهي مراكز عصبية لأنّما تستقبل السائلة العصبية وتديجها وترجمها إلى إحساسات واعية تشعر بها أو ترسلها إلى أعضاء وخلايا منفذة.



**وكاشة**  
**COMPANY**

We can help you  
يمكّنا أن نساعدك

٠٦٧١٠٩٨٧٥  
٠٥٥٥١٢٦٣٤٥

[www.okacha.net](http://www.okacha.net)

- ١- طلالة الطب الجديدة
- ٢- تحضير الشخص في العادة الطبية
- ٣- تحضيرية للحاكماء
- ٤- تحضيرية لسابقات المسابقة
- ٥- تحضيرية لمسابقات المسابقة
- ٦- طلالة العاملات
- ٧- تحضيرية في البرمجة والإعلام الالكتروني
- ٨- تحضيرية في الملاحة
- ٩- طلالة البكالوريا

السلسلة الفضية - الدوال من الألف إلى الياء - للأستاذ نور الدين عيساوي -	الرياضيات
السلسلة الفضية - المتسلسلات من الألف إلى الياء - للأستاذ نور الدين عيساوي -	علوم الطبيعية والحياة
السلسلة الفضية - الاحصاءات من الألف إلى الياء - للأستاذ نور الدين عيساوي -	السلسلة الفضية - الأعداد المركبة من الألف إلى الياء - للأستاذ نور الدين عيساوي -
السلسلة الفضية - أدبيين - الرياضيات من الألف إلى الياء - للأستاذ نور الدين عيساوي	العلوم الإسلامية
السلسلة الفضية - علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء - للأستاذ بن خريف والأستاذ بن مدنى	السلسلة الطالب المتفوق: المتفوق في علوم الطبيعة والحياة الفلسفة للطالبة إكرام بوزار.
السلسلة الأرجوانية - العلوم الإسلامية للأستاذ يوسفادي نوال	السلسلة الأرجوانية عليهن: التاريخ والجغرافيا للأستاذ يورنان
السلسلة المتفوّه العلوم الإسلامية ٢٠٢٠ مراضيم وأسئلة مقترحة للأستاذ يوسفادي	السلسلة الأرجوانية أدبيين: التاريخ والجغرافيا للأستاذ يورنان
السلسلة المتفوّه، عليهن: التاريخ والجغرافيا ٢٠٢٠ ومواضيع مقترحة للأستاذ يورنان	السلسلة المتفوّه، عليهن: التاريخ والجغرافيا ٢٠٢٠ ومواضيع مقترحة للأستاذ يورنان
السلسلة الفضية- عليهن: الإنجليزية من الألف إلى الياء - الأستاذ عزو زمع	الإنجليزية
السلسلة الفضية- أدبيين ولغات- الإنجليزية من الألف إلى الياء - الأستاذ عزو زمع	الفلسفة
السلسلة الفضية- أدبيين- الفلسفة من الألف إلى الياء - الأستاذ حمودة م	الأدب العربي
سلسلة الطالب المتفوق: كيف تحصل على العلامة الكاملة في الفلسفة للطالبة هبة	هذه السلسلة
السلسلة الفضية- أدبيين- الأدب العربي من الألف إلى الياء - الأستاذ قوادري ب	- كتاب أذكار الطالب المعلم - - التخصص التحضيري لطلاب البكالوريا
السلسلة الفضية- هندسة الطائرات من الألف إلى الياء - الأستاذة عماري عقبة	لمعرفة المزيد عن اصدارات مكتبة عكاشة زوروا موقعنا على الانترنت وصفحتنا على الفيس وانستغرام

[www.okacha.net](http://www.okacha.net)

**السلة العصبية**


**نقطة 2- خلايا الجهاز العصبي**

يتكون الجهاز العصبي من نوعين من الخلايا فقط: العصبونات والخلايا الدبقية.

**نقطة 3- دور البروجرات في الاتصال العصبي**

يكون من جسم خلوي يحتوي نواة، تند منه استطلالات هبولة قصيرة تسمى ثفرعات شجورية، وتفرع واحدة طويل يسمى المحور الأسطواني يتضمن بثفرعات تجارية تنتهي بالانفاس صغير يسمى الرز الشبكي.

العصبونات لا تتجدد لأنها لا تحتوي على الجسم المركزي، العصبة المسؤولة عن الانقسام، وعندما يموت العصبون يغوص مكانه باستطلالات هبولة لعصبونات أخرى تشكل مشابك.



رسم تخطيطي يمثل بنية الجهاز العصبي

**دماغ:** مسؤول عن الأفعال الإرادية (كلام، مشي...) والإحساسات الوعائية (الحواس الخمسة). يتواجد في المجمحة ويتكون من المخ والمخي والجذع المخفي.

**نخاع شوكي:** مسؤول عن الأفعال الإرادية (الانعكاسية). وهو خطأ أيضًا يتواجد داخل العمود الفقري. يتكون من مادة رمادية مركبة على شكل حرف H ومادة بيضاء محاطة.

تتركب المادة البيضاء من الألياف العصبية، ويعود اللون الأبيض إلى غمد النخاعين.

تتركب المادة الرمادية من الأجسام الخلوية التي تكتسب اللون الرمادي لاحتواها على الأنزيم.



رسم تخطيطي يمثل بنية النخاع الشوكي


**عقدة شوكية:** تواجد في الجذر الظاهري للنخاع الشوكي، تحتوي على الأجسام الخلوية للعصبونات الحية.

**ب- أعضاء محاطية:** عند إحداث تنبية فعال في غشائه، يتولد فيه كمون أو كمونات عمل.


**أعصاب:** يتراكب العصب من مئات إلى آلاف الألياف العصبية، يُعصب (يتحكم في) منطقة معينة من الجسم.

يوجد عند الإنسان 12 زوجاً من الأعصاب الدماغية، و31 زوجاً من الأعصاب الشوكية.





مؤقت وموضعي للحالة الكهربائية لغشاء الليف العصبي، حيث يزول الاستقطاب ثم يعود للحالة الطبيعية.  
جهاز راسم الاهتزاز المهبلي كمون العمل على شكل منحنى يتضمن أربعة (4) مراحل: زوال  
الاستقطاب، عودة استقطاب، فرط استقطاب ثم عودة إلى الحالة الطبيعية.  
كمون العمل ثابتة في نفس الليف وتختلف من ليف عصبي لأخر، تقدر بـ 100 ملي فولط  
(من 70- إلى 30+ ملي فولط).




### 5- مصدر كمون العمل

لإضافة للاستقطاب، يتميز الليف العصبي بخاصية أخرى تسمح بتوسيع كمون عمل فيه وهي احتواه على ثيوتات متعلقة (مرتبطة) بالفولطية خاصة بشوارد الصوديوم والبوتاسيوم. ومصدر كمون العمل هو توسيع وموضعي لتركيز شوارد الصوديوم والبوتاسيوم على جانبي غشاء الليف نتيجة افتتاح هذه الثيوتات.


#### تجربة تظهر مصدر كمون العمل

نزل جزء من غشاء العصبون قبل المشبك الذي يحتوي على نوعين من القنوات بتقنية Patch-clamp.  
نخضع لكمون اصطناعي مفروض بحوالى الكمون الغشائي إلى 0 mV مثل ما هو مبين في المنحنى (أ) من  
الوثيقة، ثم نسجل التبريرات التي تعبّر الغشاء ضمن ظروف معينة النتائج مماثلة في التسجيلات من نفس الوثيقة.  
تسجيـل (1) : حالة عاديـة أثناء تطبيقـ كـمـونـ المـفـروـضـ.  
تسجيـل (2) : عند إضـافـةـ مـادـةـ TTXـ (ـمـادـةـ مـتـبـطـةـ لـاـنـتـقـالـ Na+ـ).  
تسجيـل (3) : عند إضـافـةـ مـادـةـ TEAـ (ـمـادـةـ مـتـبـطـةـ لـاـنـتـقـالـ K+ـ).



المعلومات المستخرجة من النتائج التجريبية مع للتحليل:


- من الشكل (أ): الفنـصـرـ المـسـوـلـةـ عنـ تـفـقـ شـوـارـدـ الصـوـدـيـوـمـ عـكـسـ تـرـجـ التـرـكـيزـ ذاتـ طـبـيـعـةـ بـرـوـتـيـبـيةـ
- التـطـيلـ: لأنـ عـلـمـهاـ تـوقـفـ عـدـ وـضـعـهاـ فيـ درـجـةـ حرـارـةـ 0ـ (ـتـطـيـطـ)، وـعـودـةـ نـشـاطـهاـ بـعـدـ درـجـةـ الحرـارـةـ
- من الشكل (ب): يـنـظـلـ نـقـلـ شـوـارـدـ الصـوـدـيـوـمـ عـكـسـ تـرـجـ التـرـكـيزـ طـاقـةـ عـلـىـ شـكـلـ ATPـ.
- التـطـيلـ: تـوقـفـ تـفـقـ شـوـارـدـ الصـوـدـيـوـمـ عـنـ إـضـافـةـ الـDNPـ الـتـيـ تـعـيـقـ تـشـكـلـ الـATPـ. وـتـزـادـ التـنـفـقـ بـشـكـلـ يـنـتـنـسـ بـعـدـ كـمـيـةـ الـATPـ.
- من الشكل (ج): يـشـرـطـ نـقـلـ اـزـدواـجـ الشـارـدـيـنـ Na+ـ وـK+ـ
- التـطـيلـ: عـنـ تـزـعـ K+ـ مـنـ وـسـطـ يـنـقـلـ تـدـقـقـ



#### دور البروتينات الفضائية في ثبات كمون الراحة

نـكـمـنـ أـهـمـيـةـ كـمـونـ الـرـاحـةـ كـوـنـهـ يـسـمـحـ بـتـوـلـيدـ كـمـونـ عـلـىـ إـحـدـاـتـ تـبـيـهـ وـانـفـاحـ القـنـوـاتـ الفـوـلـطـيـةـ

وبـالـتـالـيـ قـدـرـةـ الـلـيفـ عـلـىـ نـقـلـ السـيـالـةـ العـصـبـيـةـ.



عودة الاستقطاب: تصبح قنوات  $\text{Na}^+$  المرتبطة بالفولطية غير نشطة وتفتح قنوات  $\text{K}^+$  المرتبطة بالفولطية.

ويحدث تدفق خارجي  $\text{K}^+$  حسب تدرج تركيزها.

فرط الاستقطاب: يتأخر انفلاقي قنوات  $\text{K}^+$  المرتبطة بالفولطية ويستمر تدفقها الخارجي. تكون قنوات  $\text{Na}^+$  المرتبطة بالفولطية في هذه الحالة مغلقة.

عودة إلى الحالة الطبيعية: تؤمن مضخة  $\text{Na}^+/\text{K}^+$  المستهلكة للطاقة (ATP) عودة التراكيز الأيونية للمنزلة الأصلية.

### فرض الكمون

مبدأ العمل: ترسل تياراً كهربائياً ذو كمون معين يلغى أو يغير الكمون الطبيعي (70 ملي فولط)، ويتبع كمون جديد اصطناعي يسمى الكمون المفروض (0 ملي فولط - 20 ملي فولط...).

الاستعمال: فتح القنوات الفولطية لمدة قصيرة تقدر بالمليء ثانية دراسة التيارات الكهربائية الناتجة فيها باتش كلامب.

مبدأ العمل: تعزل قناة أو عدة قنوات غشاء الليف عصبي بواسطة ماصة مجبرية متصلة بجهيز حسّن التيارات الكهربائية، وسجل التيارات الداخلية والخارجية فيها.

الاستعمال:قياس التيارات الكهربائية الداخلية والخارجية على مستوى قناة أو عدة قنوات في غشاء الليف.

النبيه الفعال (المخدي): تبيه يتولد عنده كمون أو كمونات عمل.

عنة النبيه: فرق الكمون اللازم لفتح عدد من القنوات الفولطية لشوارد الصوديوم كاف لـ توليد كمون عمل. تختلف عنبة النبيه من عصبون لأخر ولكنها ثابتة في نفس العصبون وتقدر بحوالي 55 ملي فولط.

### سرعة انتشار السائلة العصبية

في النبيه المنفع (محاط بعدم النخاعين)، السائلة العصبية سريعة، تنتقل بالقفز من اختناق رانفي إلى آخر، لأن عدم النخاعين عبارة عن عازل يقطع القنوات الفولطية بين اختناقين.

في النبيه عدم النخاعين، السائلة العصبية بطيئة، كل قناة فولطية تشتعل القناة التي تليها وهذا ينطلق زوال الاستقطاب.

### نقل مشبك

#### 1- مشبك


يؤمن المشبك نقل السائلة العصبية من الوحدة قبل مشبكية إلى الوحدة بعد مشبكية (في اتجاه واحد)


وتحدد طبيعتها (منهية أو مشبطة).

#### 2- بنية المشبك

يترك المشبك من ثلاثة أجزاء، خلية قبل مشبكية وخالية بعد مشبكية يفصل بينهما شق مشبك.

تحتوي الخلية قبل مشبكية على حويصلات مشبكية كما المبلغ العصبي كما يحوي العشاء قبل مشبك على قنوات فولطية خاصة بشوارد الكالسيوم ذات طبيعة بروتينية. وتحتوي غشاء الخلية بعد مشبكية على





رسم تخطيطي يمثل آلية عمل المشبك التبيهي

أيضاً GABA في المشبك المنشط.

يشت للبلع العصبي الـ GABA على المستقبلات الخاصة به في الغشاء بعد مشبك (مستقبلات قنوية) فتح قنوات  $\text{Cl}^-$  المرتبطة بالكيمياء، تنفذ شوارد  $\text{Cl}^-$  مسببة فرط استقطاب الغشاء بعد مشبك. تزلف سعة فرط استقطاب الغشاء بعد المشبك على عدد المستقبلات القنوات المفتوحة خلال زمن معين.

يسحب انغلاق قنوات  $\text{Cl}^-$  المرتبطة بالكيمياء بالعودة إلى كمون الراحة.

**السلسلة العصبية**  
مستقبلات البلع العصبي تدعى القنوات المرتبطة بالكيمياء لأنها يتحكم في فتحها وغلقها المسلح العصبي الكيميائي.

ي Transmit مستقبل الاستيل كولين لثبيت الاستيل كولين وفتحه فهو مستقبل قنوي (إيبوفور). الغشاء، قبل مشبك عبارة عن رد مشبك لنفع غامض، أما الغشاء بعد مشبك فقد يكون فرعًا شعرياً غشاء، الغض الخلوي، غشاء، الغير الأسطواني أو غشاء خلية عضلية.

**بـ- النوع المشابك**  
ي يوجد نوعين من المشابك، مشبك عصبي عصبي يتواجد في المركز العصبي ومشبك عصبي عصري (الوجه عرق) يتواجد على مستوى العضلات.  
وطبعاً يوجد كذلك نوعين من المشابك، مشبك منه (SE) ينهي (يُنشط) الخلية بعد مشبكية، أي يولد فيها كموناً بعد مشبكها تبيهياً (PPSE). ومشبك منشط (SI) ينشط الخلية بعد مشبكية، أي يولد فيها كموناً بعد مشبكها تبيهياً (PPSI).

**الأولم استيل كولين إسترازان:** يتواجد في الشق المشبكى ودوره إمامه الأستيل كولين إلى كولين وأستيل. بعض المواد الكيميائية تبط الآزم استيل كولين إسترازان ونتيجة لذلك تبقى قنوات الصوديوم مفتوحة مما قد يسبب ترقعاً عضلياً.

**الأولم استيل كولين ترونسفرازان:** يوجد في هيول العصبون قبل مشبكى (الزور المشبكى)، ودوره تركيز جزيئات الأستيل كولين انطلاقاً من كولين وأستيل مرافق الآزم.

## 2-6 آلة النقل المشبك

تصل السائلة العصبية إلى النهاية الغيرية وتسبب في افتتاح قنوات فولطية خاصة بشوارد الكالسيوم ( $\text{Ca}^{++}$ ) فتدفع كمية منها إلى داخل الزر المشبكى، حيث يتناسب تركيز شوارد الكالسيوم النافذة للخل مع نواتر كميات العمل وتقول أن السائلة العصبية مشفرة بتركيز شوارد الكالسيوم.  
يتسرب دخول شوارد  $\text{Ca}^{++}$  في تحرير البلع العصبي عن طريق عملية الإطراح الخلوي حيث:

أولاً: الأستيل كولين (A-ch) في المشبك إليه.

يثبت البلع العصبي الأستيل كولين على المستقبلات الخاصة به في الغشاء بعد مشبكى (مستقبلان قنوية) فتحن قنوات  $\text{Na}^+$  المرتبطة بالكيمياء، تنفذ شوارد  $\text{Na}^+$  مسببة زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكى. توقف سعة زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكى على عدد المستقبلات القنوات المفتوحة خلال زمن معين.

تصل سعة الـ PPSE عينة توليد كمون عمل إذا توفرت كمية كافية من الأستيل كولين في الشق المشبكى ينفذ للبلع العصبي (الأستيل كولين) نشاطه (فعاليته) نتيجة الإمامة الإنزيمية حيث يتفاكل الأستيل كولين بواسطة الإنزيم استيل كولين إسترازان إلى أستيل وكولين.  
يسحب انغلاق قنوات  $\text{Na}^+$  المرتبطة بالكيمياء بالعودة إلى كمون الراحة.

**السلسلة الفعلية**

أ- دور البروتينات في الاتصال العصبي  
ترى الرائحة ثابت دائمة في نفس الخلية العصبية، ولكنه ينخفض أثناء النوم من 70-75 إلى 50-55 مللي فولط تحت تأثير ميلفات عصبية. لذا لا تنتبه الخلايا العصبية بسهولة (لا تشعر أو تسمع بأمورات مثل الاستيقاظ) لأنها يتطلب تبيه أكبر للوصول للغة (50 مللي فولط). وهذا هو سبب عمل الأدوية الملومة، تفتح قنوات الكالسيوم لتنشيط العصبيون.

كمونات عمل: عدد كمونات عمل في وحدة الزمن.

**3- تغير السيالة العصبية**

وهي المسائل العصبية المنشورة على مستوى العنصر قبل المشبك بتوتر كمونات العمل إلى تغير في كمية لغة العصبي المفردة على مستوى المشبك (تشغير تركيز المبلغ الكيميائي) الذي يتسبب في توليد وسائل نفعية بعد مشبكية مشفرة بتوتر كمونات العمل.

مقارنة بين كون العمل والكون بعد مشبك

كمون بعد مشبك (PPS)	كمون عمل (PA)	منشأ
الغشاء بعد مشبك	القطعة الابتدائية (SI)	نوع القنوات
كيميائية	فولطية	انتشار
الجسم الخلوي	المحور الأسطواني (الليف)	سعة
ثانية (قانون الكل أو اللاشيء)	ثانية (قانون الكل أو اللاشيء)	استقطاب
زوال (PPSE) أو فرط (PPSI)	زوال، عودة، فرط ثم عودة	ادماج
إدماج زئني أو فضائي	لا تدمع	

على إلى الجسم الخلوي عدة كمونات بعد مشبكية مبنية (PPSE) أو مبنية (PPSI)، فتقوم بدورها (بعيها) على مستوى القطعة الابتدائية، إما فضائيا إذا وردت من مشابك مختلفة في نفس الوقت، أو ربما إذا وردت متقاربة ومن نفس المشبك. ينبع عنها في المحور الأسطواني حالتين:

- كون عمل: إذا كانت مخلصة جموعها الجري تساوي أو تفوق عتبة توليد كمون عمل.

- كون راحة: إذا كانت مخلصتها أقل من عتبة التبيه أو فرطاً في الاستقطاب.


**8- المقدرات**

**1- إحساس بالألم**

لادة P والأنكبيالين مبلغان عصبيان تفرزها عصبيون في مشابك خاصة في الغرب الخلوي للنخاع الشوكى.

#### أ- تأثير عمل المادة P والأنكبيالين

لادة P تسبب الإحساس بالألم: إن إصابة، على مستوى الجلد مثلا، يتبيه عصبون حسى ويحرر المادة P ليشق مشبك مع عصبيون آخر وارد إلى المخ، تولد فيه سيالة عصبية بعد مشبكية تنتقل إلى سطح المخ بترجمتها إلى إحساس بالألم.



رسم تخطيطي يمثل آلية عمل المشبك التنشيطي

**فرط الاستقطاب:**  
توجد حالتين لفرط الاستقطاب:  
- فرط استقطاب في حالة كون العمل (المراحل الثالثة في منحنى كمون العمل) ينبع عن خروج شوارد  $K^+$ .  
- فرط الاستقطاب في المشبك النشط ينبع عن دخول شوارد  $Ca^{++}$ .

**تفسير فرط الاستقطاب:**  
السطح الخارجي للليف أكثر كهروجافية (+) والسطح الداخلي أكثر كهروسلبية (-). ينبع الفرط في الاستقطاب عند زيادة الكهروسلبية بين الداخل والخارج.  
ارتفاع الكهروسلبية: إما بخروج شوارد  $Na^+$  الموجبة (إلى الخارج الموجب مسبقاً). وإما بدخول شوارد الماشبك يحدد اتجاه واحد للسيالة العصبية لأنها يتميز بنية غير متباينة.

توجد مشابك يتولد فيها زوال الاستقطاب في الغشاء بعد مشبك عن دخول شوارد الكالسيوم  $Ca^{++}$  وليس الصوديوم  $Na^+$ .

**السلسلة العصبية**  
**الأنكيفالين تخفف الإحساس بالألم:** بعد الإحساس بالألم، يرسل المخ سائلة عصبية تنشط عصبية تعرف بـ GABA (مع العصبون الحسي) فتقلل إفراز المادة P، وبالتالي تخفف الإحساس بالألم.  
**و عند تفعيل العصبون الآلي من الدماغ يرفع تركيز مادة الأنكيفالين المفرزة فتؤدي إلى تثبيط إفراز المادة P.**  
**ومنه عدم الإحساس بالألم.**

**2-8. إزالة الإحساس بالألم**  
**للمرورين مادة طيبة (مهدئ) تستعمل بكثرة محددة بدقة لخفيف الإحساس بالألم (طا نفس ثم الأنكيفالين).**  
**للمرورين بذرة فرانغية ماللة للأنكيفالين، عند حقنها تثبت على المستقبلات الغشائية الخاصة بالأنكيفالين وتشعر نقل السائلة العصبية إلى المخ (السائلة العصبية التي تترجم إلى إحساس بالألم) بفيروس الإمساك بالألم.**  
**يمكن للنقل المشكي أن يدخل العديد من الجزيئات الخارجية المستعملة إما لأغراض طيبة أو لغيرها.**  
**إنما المخدرات كالمورفين الذي يستخدم في الحال الطبي لعلاج كل من الألم الشديد الحاد والمزمن. ولكن استخدام المرورين بشكل عشوائي ومفرط خارج نطاق التوجيه الطبي يتسبب في الإدمان الذي قد ينجرى بالمؤثر كما تسبب مخدرات أخرى تائهة ماللة.**

**خلاصة**

**يشتمل دور البروتينات في الاتصال العصبي في:**

- **الحفاظ على استقطاب العصبون:** تعمل مضخة  $K^{+}$  وقنوات التسرب الخاصة بالـ  $Na^{+}$  والـ  $K^{+}$  ذات الطبيعة البروتينية المتوزعة على طول الليف العصبي على إحداث فرق في تدرج تركيز  $K^{+}$  و  $Na^{+}$  على جانبي الغشاء المبولي مولدة فيه كمون راحة.
- **انتشار السائلة العصبية:** يولد كمون عمل وينتشر على طول الليف العصبي بتدخل نوع آخر من البروتينات الغشائية المتوزعة كذلك على طوله وتمثل في نوعين من القنوات الفولكلية الخاصة بشوارد  $Ca^{++}$  و  $K^{+}$ .
- **النقل المشكي:** على مستوى الزر المشكي، تدخل القنوات الفولكلية لشوارد  $Ca^{++}$  ذات الطبيعة البروتينية في تحويل المبلغ العصبي في الشق المشكي، والذي يؤثر على الغشاء بعد مشبك يشبه على مستقبلات قوية نوعية ذات طبيعة بروتينية خاصة بالأستيل كوكلين في المشبك المنبه والـ GABA في المشبك المثبط.

**11- جزء التمارين**


السنة العاشرة

دور البروتينات في الاتصال العصبي

**مذكرة عن التمرين الأول**

كـ التمرين 01

أ- **أمثلة الخلايا الحية يوجد ببروتينات عالمة التخصص وللتعرف على هذه البروتينات وتحديد دورها في الرسائل العصبية آلية ديمها، نقترح الوثيقة التي تثال رسمًا تخطيطياً وظيفياً لانتقال الرسالة العصبية قبل مشبكية إلى خلية بعد مشبكية.**



- 1- **أذكر مختلف البروتينات الغشائية المتدخلة في توليد وانتشار الرسالة العصبية عبر سلسلة عصبية تختلف دور كل منها.**
- 2- **أطلعها من معطيات الوثيقة أكتب نصًا علميًا تبين فيه آلية دفع الرسائل العصبية على مستوى الحسون المركب.**

## 1- البروتينات الفاشنة ودورها

البروتينات الفاشنة	دورها
مفتولة باستمرار، تسمح بتفاذاً مستمراً لشوارد $\text{Na}^+$ حسب تدرج تركيزها من الوسط الخارجي إلى هيول الليف العصبي.	تفاوت التسرب لشوارد $\text{Na}^+$
مفتولة باستمرار، تسمح بتفاذاً مستمراً لشوارد $\text{K}^+$ حسب تدرج تركيزها من هيول الليف العصبي إلى الوسط الخارجي.	تفاوت التسرب لشوارد $\text{K}^+$
تفاوت شوارد الصوديوم والبوتاسيوم عكس تدرج تركيزها. مضخة $\text{Na}^+/\text{K}^+$ .	مضخة $\text{Na}^+/\text{K}^+$
تفتح مؤقتاً عند تغير فرق الكمون، وتسمح بتفاذاً شوارد $\text{Na}^+$ حسب تدرج تركيزها مسببة زوالاً في الاستقطاب يقدر بـ 30 ميلي فولط.	القنوات الفولطية لشوارد $\text{Na}^+$
تفتح مؤقتاً عند تغير فرق الكمون، وتسمح بتفاذاً شوارد $\text{K}^+$ حسب تدرج تركيزها مسببة عودة وفرط الاستقطاب.	القنوات الفولطية لشوارد $\text{K}^+$
عند وصول السيالة العصبية إلى النهاية المخورية، تُفتح مؤقتاً وتسمح بتفاذاً شوارد $\text{Ca}^{++}$ الذي تعمل على اندماج الحوصلات المشبكية مع الغشاء قبل مشككي وطرح المبلغ العصبي في الشق المشبكي.	القنوات الفولطية لشوارد $\text{Ca}^{++}$
في الغشاء بعد مشككي للمشبك للنبيه (SE)، تستقبل المبلغ العصبي الأستيل كولين وتسمح بنقل شوارد الصوديوم إلى هيول الليف بعد مشككي محدثة فيه كمون بعد مشككي منه (PPSE).	الستيلات القوية الخاصة بالاستيل كولين

## 2- نص علمي

يمكن للخلايا العصبية أن تستقبل، تديم وتُرسل الرسائل العصبية لاحتواءً أغشيتها على بروتينات عالية التخصص. ومثال عن هذه الخلايا العصبيون الحركية التي تتمرکز أجسامها الخلوية في المادة الرمادية للنخاع الشوكي حيث تتم عملية الإدماج. فما هي الآلة التي يتم بها دمج الرسائل العصبية على مستوى العصبون الحركي؟

يتضح عن التنشئة الفعال في المخور الأسطواني للعصيون الحسي كمونات عمل متقاربة أو متباينة زمنياً حسب شدة التنشئة. تتشتت هذه الكمونات باتجاه التفرع النهائي وتؤدي إلى تخريب كمية من المبلغ العصبي الأستيل كولين في الشق المشبكي. تثبت جزيئات الأستيل كولين على مستقبلات خاصة في


السلة العصبية بعد مشككي للعصيون الحركي وتفتح قنوات تنفذ منها شوارد الصوديوم مسببة كمونات بعد مشككي (PPSE). كانت كمونات العمل الناتجة متقاربة زمنياً، تخرّب كمية كبيرة من الأستيل كولين تؤدي إلى فتح عدد من القنوات الكيميائية وتنفذ كمية كبيرة من شوارد الصوديوم، تفتح عنها كمونات بعد مشككي (PPSE) متقاربة كذلك وأقل من العتبة، يقوم الجسم الخلوي للعصيون الحركي بذاتها على مستوى الإندادية زمنياً لأنها متقابلة من نفس المشبك، يفتح عنها كمون عمل في المخور الأسطواني لأن مجموعها الجريبي تساوي أو تفوق عتبة توليد كمون عمل.

كانت كمونات العمل متباينة زمنياً، تخرّب كمية قليلة من الأستيل كولين، يفتح عدد قليل من القنوات الكيميائية وتنفذ كمية قليلة من شوارد الصوديوم، يفتح عنها كمونات بعد مشككي منه (PPSE) متباينة زمنياً لا يمكن الجسم الخلوي للعصيون الحركي من تفعيلها ولا يتولد عنها كمون عمل في المخور الأسطواني.

يتم دمج الرسائل العصبية على مستوى العصيون الحركي في الجسم الخلوي، حيث يستقبل هذا إن مختلف الكمونات بعد مشككي الواردة ويدمجها وتنتشر مخلصتها في مخور الأسطواني.

## بعض التصرير 02

ينحل البروتينات في آليات نقل الرسالة العصبية في المعاكسات العضلية من أجل إعادة التوازن الوظيفي الخلوي. مثل الوثيقة المولالية موقع العصيون الجامع ضمن التسلسل العصبيون للتحكم في المعاكس العضلي من مستوى النخاع الشوكي.



## أ- عدد أنواع:

الآليات البروتينية التي تسمح بانتشار كمون العمل على مستوى الليف العصبي.

الآليات البروتينية التي تسمح بنشأة PPSE و PPSE على الغشاء بعد المشبك في المشبكين 52 و 53.

الإجابة التمودجية

- أ- أنواع القوات البروتينية**

  - قوات العدويه المرتبطة بالقولضيه.
  - قوات البوتايسير المرتبطة بالقولضيه.

**ب- أنواع الآليات البروتينية**

- ويُنطَلِّعُ الماءُ العصبيُّ إِلَيْهِ الْمُفَرِّزُ مِنْ صُرُفِ النَّهَايَةِ الْأُخْرَىِ لِتَعْصِيبِ حَسْبِيِّ بِالْمُسْتَدِيلَاتِ الْغَشَائِيِّةِ الْمُرْبَدِيِّةِ اِنَّ الصِّفَيْهُ الْبَرْوَنِيَّهُ وَالْمِنْجُونِيَّهُ كَيْجَابِيَا وَالْمِنْجُونِيَّهُ عَلَىِ الْغَشَاءِ بَعْدِ الْمُشَكِّيِّ لِلْعَصِيبِينِ الْجَامِعِ، فَتَفَقَّهُ فِيِّ الْمُسْتَدِيلَاتِ الْقَبُوَّيِّهِ مَا يُسْعِي بِالشَّدَفِ الدَّاخِلِيِّ لِشَارَادِ الْمُصَوِّبِيِّومِ ( $No^{+}$ ) وَظَهَرَ كَمُونُ بَعْدِ الْمُشَكِّيِّ بِ

میں اپنے بھائی کے لئے

يُطْبَقُ الْمِنْعَمُ الْعَصِيُّ لِلْمُكْرَزِ مِنْ طَرِفِ النَّهَايَةِ الْأَعْوَرِيَّةِ لِلْعَصُونِ اجْمَعًا بِالْمُسْتَقْبِلَاتِ الْعَشَائِرِيَّةِ الْأَعْوَرِيَّةِ كِبِيرًا وَالْمُواجِدَةُ عَلَى الْغَشَاءِ بَعْدِ الْمُشْبِكِيِّ لِلْعَصُونِ أَخْرِيًّا، فَتَفَشَّلُ هَذِهِ الْمُسْتَقْبِلَاتِ الْفَقِيرَةِ مَا يُسْعِي بِالْتَّدَفُقِ الدَّاخِلِيِّ لِشَوَارِدِ الْكَلُورِ (٤) وَظَهَرَ كَمُونُ بَعْدِ مُشْبِكِيِّ هَذِهِ الْمُسْتَقْبِلَاتِ الْفَقِيرَةِ.

2- نص علمي

بعض انتقال الرسالة العصبية من العصبون الحسي إلى العصبون آخر و البعضون الجامع المبسط: -  
رسالة العصبية تنشر عبر العصبون الحسي وتنتقل إلى عصبوبين:


- تنتقل مباشرة إلى العصون آخر المعلنة المتقلصة (بابستة) غير مشبك واحد.  
تنتقل طريقة غير مباشرة إلى العصون آخر المعلنة المتقابلة (قايسنة) غير العصوب الجامع.  
من ثم إذا الوصل بين العصوب الخمس والعصوب آخر هو مشبك منه.

لـ<sup>22</sup> رسالة العصبة من العصبون الجامع المشط إلى العصبون الحركي للعضلة المقابلة:

- لذلك لا ينبع العصبون الجامع والعصبون المحرك مشبك مثبط،  
لأنه القاعدة  
لما يكون عد المشككي مثبط ينبع نشاط كون العصبون العمل على العصبون المحرك وهو ما يحول دون تفسير

التوصيات

نفوج نموذجاً تفسيراً للبيانات الأيونية غير الغشاء الخلوي لليف عصبي بعد إحداث تيه فعال هو موضح في الرسمة (٤١).



- ١- البيانات

أ- فولاذية  $\text{No}^-$ , 2- فلز فلوريتية  $\text{K}^-$ , 3- شوارد  $\text{Na}^+$ , 4- شوارد  $\text{K}^+$ , 5- غشاء مبتلا لزامني  
ب- عصبي، 6- مضخة  $\text{Na}/\text{K}$ .

تجربة (أ): منحى النبار الكهربائيي الداخلي ونبار الكهربائيي الخارج.

تجربة (ب): منحى كمون العمل.

٢- العلاقة بين المراحل

مرحلة ١ (جزء A): عند فرض كمون على غشاء معزول تفتح أولاً ثقوب الفولاذية للصوديوم وتشمل ذلك داخلية لدخول شوارد الصوديوم وفق درجة تركيزها فيحدث زوال الاستقطاب.

مرحلة ٢ (الجزء B): تتعلق الثقوب الفولاذية للصوديوم وتفتح ثقوب الفولاذية للبوتاسيوم وتشمل ذلك خارجية خروج شوارد البوتاسيوم وفق درجة تركيزها فيعود الاستقطاب.

مرحلة ٢ (الجزء C): استمرار خروج شوارد البوتاسيوم وفق تأثير التلاقى الغلائى للثقوب الفولاذية للبوتاسيوم حتى تنتهي فرط في الاستقطاب.

مرحلة ٣ (الجزء D): الغلائق الثقوب الفولاذية للبوتاسيوم وتدخل مضخة  $\text{Na}/\text{K}$  لاسترجاع التوزيع بين وشائين شوارد  $\text{Na}^+$  و  $\text{K}^+$  و المسؤول عن كمون الراحة. إضافة إلى ثقوب المنشورة باستمرار زرنيق  $\text{Na}^+$  و  $\text{K}^+$  التي تسمح بالتبادل الشاردي للخلية العصبية مع الوسط خارج الخلوي.

علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

دور	الروتين
تغير المبلغ العصبي في الشق المشبكى	النقوس الفولطية $(\Delta V)$
توليد كمون بعد مشبكى تبيهي	$Na^+$
النقوس الكيميائية $(\Delta C)$	النقوس الكيميائية $(\Delta C)$

بر الترين 04

من أجل دراسة الشخص الوظيفي للروتينات في نقل المعلومات على مستوى التمفصلات بين الخلايا العصبية لخنق الدراسة التالية:

تم تطبيق ثلاثة تبيهات فعالة ST1 ثم ST2 ثم ST3 موضحة في التركيب التجاري الممثل بالشكل (أ) في النقطة، وسجل الاستجابات الممثلة بالمتغيرات  $a$ ,  $b$ ,  $c$  في الشكل (ب).

الشكل (أ)


عصوبات:  $N1, N2, N3$   
راسم اختزانت مهني

الشكل (ب)

الوثيقة

- 1- تعرف على التبيهات  $a$ ,  $b$ ,  $c$  ثم استخرج طبيعة لالمشابك  $S1$ ,  $S2$ ,  $S3$ .
- 2- اذكر مختلف الروتينات المتدخلة في توليد الرسائل العصبية عبر السلسلة العصبية، مع كتابة نظر علمي تبين فيه آلية دمج الرسائل العصبية على مستوى العصبونات الأخرى.

أناية:



- 1- تعرف على البيانات المرقمة محددا نوع المشابك.

- 2- باستغلال معطيات الوثيقة ومهاراتك أكتب نصا علميا توضح فيه آلية النقل المشبكي في الشكل (أ).

#### الإجابة المودجية

##### 1- البيانات ونوع المشبك

- 1- خاتمة حمورية للخلية قبل مشبكي، 2- حويصلات مشبكي، 3- مبلغ عصبي (الأستيل كولين)، 4- مبلغ عصبي (GABA)، 5- غشاء الخلية بعد مشبكي، 6- مستقبل قنوي للأستيل كولي، 7- دخول  $\text{Na}^+$ ، 8- دخول  $\text{Ca}^{2+}$ ، 9- كمون بعد مشبكي تثبيطي (PPSE)، 10- كمون بعد مشبكي تثبيطي (PPSE).  
الشكل (أ): مشبك منه، الشكل (ب): مشبك مثبت.

##### 2- نص علمي


يتضمن النص:

- وصول كمون عمل إلى مستوى خاتمة العصبون قبل مشبكي يؤدي إلى افتتاح قنوات الكالسيوم المرتبطة بالقولبطة.
- دخول شوارد الكالسيوم في العصبون القبل مشبكي يعرض على تحريض الأستيل كولين عن طريق الإطلاق الخلوي في الشق المشبكي.

السلة الفنية  
دور البروتينات في الاتصال العصبي  
بروتين الاستيل كولين بعد ارتباطه بالمستقبلات بعد مشبكة المرتبطة بالكمياء رسائل عصبية بعد مشبكة  
بروتينات العمل  
بروتين الإزيم استيل كولين يسترار بإمامة الأستيل كولين ثم عودة امتصاص نوع الإماماة غير الغشاء  
تل مشبكي بظاهرة النقل الفعال لإعادة تركيب الاستيل كولين داخل الحويصلات المشبكة بفعل أستيل  
استرار.

#### به التمرن 06

نوع والنجاح الشوكي مركزان عصبيان مسؤولان عن مختلف الإحساسات التي يشعر بها الإنسان مثل البرودة، الألم، الجوع، والعطش. توجد مواد خارجية تسمى المخدرات تؤثر على هذين المركبين لتجعل وقوع الإحساس بالألم ومثال على ذلك مادة المورفين التي تمنع الإحساس بالألم. معرفة العناصر المدخلة في الإحساس بالألم وأآلية تأثير المورفين تعطي الوثيقة التالية:



- 1- تعرف على البيانات المشار إليها بأرقام. ماذا تمثل الأسماء؟  
2- بين في نص علمي كيف تتدخل العناصر الممثلة في الوثيقة في الإحساس بالألم، وأآلية تأثير المورفين على الإحساس بالألم.

#### الإجابة التموذجية

##### 1- البيانات

- 1- عصبون حسي جاذب، 2- عصبون حسي وارد إلى الدماغ، 3- عصبون حسي صادر من الدماغ، 4- حويصل المادة P، 5- حويصل الأنكيفاليين، 6- مشبك.  
لأن الأسماء مسار السيالة العصبية المسئولة عن الإحساس بالألم.

##### 2- نص علمي

- غير المورفين على الإحساس بالألم وذلك بتأثيرها على عمل المشابك. فكيف تدخل المشابك في الإحساس بالألم وكيف يؤثر المورفين على الإحساس به؟

السلسلة الفعلية  
1- آلية الإحساس بالألم

عندما يتعرض الجلد إلى تبعة قوي تولد سيالة عصبية على شكل كمونات عمل قبل المشبكية ينقلها سيرفر من الألياف العصبية للشبكة للعصب الجلدي. وصول هذه السيالة العصبية إلى مستوى المشبك M 1 يؤدي إلى تحرير المادة P (مبلغ عصبي) التي تتبه الغشاء بعد المشبكى للعصبون الوارد إلى الدماغ مولدة كمونات بعد مشبكية مسؤولة عن الإحساس بالألم ينقلها العصبون الوارد إلى الدماغ الذي يترجمها إلى إحساس بالألم. يرسل الدماغ سيالة عصبية على شكل كمونات عمل تنقل بواسطة العصبون الصادر من الدماغ إلى الشفاعة الشوكى. وصول هذه السيالة العصبية إلى مستوى المشبك M 2 يؤدي إلى تحرير الأنكييفالين (مبلغ عصبي) الذي يتبه الغشاء بعد المشبكى للعصبون الجلدي مولدة فرط في الاستقطاب مسؤول عن معن تحرير المادة P في المشبك M 1 وبالتالي توقف الإحساس بالألم.

2- دور المورفين في توقف الإحساس بالألم  
للمورفين بيئة مختلفة عن بيئة الأنكييفالين لكنه يملك جزء ثابت على المستقبلات بعد مشبكية محظوظ لأنكييفالين. عند الإحساس بالألم الشديد، يصبح الأنكييفالين غير كاف لتوقيف الإحساس بالألم فيحترق الفرد بالمورفين الذي يعطي بجرعات يمكن التحكم فيها، يتثبت المورفين على المستقبلات الغشائية لأنكييفالين الموجودة على الغشاء بعد المشبكى للعصبون الجلدي مولدا فرط استقطاب يمنع تحرير المادة P بمحضه من دخول شوارد الكالسيوم إلى النهاية الخورية.

نماذج عن التجارين الثاني

كم التغيرين 01

تُستخدم المادة DDT (Dichloro-diphénol-trichloroéthane) في المجال الزراعي لمكافحة الحشرات الضارة لكن يتبع عن استعمالها آثار سلبية على صحة الإنسان حيث تُسبب اختلالاً وظيفياً في جهازه العصبي. لمعرفة آلية تأثير المادة DDT تُفتح الدراسة التالية:


الجزء الأول

يمثل الجدول التالي تسجيلات تم الحصول عليها بواسطة الجهاز راسم الاهتزاز المهبطي على مستوى ليف عصبي في وجود وفي غياب المادة DDT، وذلك بعد إحداث تببة فعالة.

	الزمن (ms)	الكمون الغشائي (mv)	في غياب مادة DDT	الكمون الغشائي (mv)	في وجود مادة DDT
5	4.5	4	3.5	2.5	2
-70	-70	-75	-70	0	+30
+25	+25	+25	+25	0	+30

الوثيقة (01)

- 1- مثل بيأي ثم خليل النتائج الموضحة في الوثيقة (01). يعطي مقياس الرسم التالي:
- 2- اقترح فرضيتين لنفس آلية تأثير مادة DDT على الكمون الغشائي.



- 1- حدد أهم تغيرات القنوات الممثلة في الشكل (1) ثم علل تسميتها.
- 2- نظر باستغلال معطيات شكل الوثيقة (02) تأثير الكمون المفروض على القنوات القولطية في غياب مادة DDT.
- 3- نقش صحة إحدى الفرضيتين المقترحبتين انطلاقاً من النتائج السابقة، مبيناً آلية تأثير مادة DDT على النشاط العصبي.

**السلسلة الفعلية**

**الإجابة النموذجية**


**الجزء الأول**

**1- التمثيل البياني**

التمثيل البياني

في غياب مادة DDT

التحليل



يمثل السحبين تغيرات الكتون الغشائي (mv) بدلالة الزمن (ms) في غياب وفي وجود مادة DDT.

إحداث تبيه فعال.

التحجى (أ): في غياب مادة DDT تسجل كمون عمل طبيعي حيث يتغير الكتون من 70 mv (الراحة) إلى +30 mv (زوال الاستقطاب)، ثم يعود الكتون إلى -70 mv.

من جديد، ثم تسجل زيادة في الكتون تقدر بـ -75 mv (فوت الاستقطاب)، ثم يعود الكتون إلى حالة الراحة من جديد.

التحجى (ب): في وجود مادة DDT يتغير الكتون من 70 mv (كمون الراحة) إلى +30 mv (زوال الاستقطاب)، ثم يختفي الكتون قليلاً إلى الحالة +25 mv ويبقى ثابتاً عندها.

نستنتج أن مادة DDT تعوق تشكل كمون العمل حيث تبقى الليف العصبي في حالة زوال استقطاب.

2- المقترن هرسيتين

الفرضية 1: مادة DDT تفعّل الغلاقنات المرتبطة بالغولطية لشوراد الصوديوم المسؤولة عن زوال الاستقطاب.

الجزء الثاني

1- أهم مميّزات القنوات الغولطية وتعديل تمثيلها

ـ قنّة الصوديوم المرتبطة بالغولطية: بروتينات غشائية ضمّنية، نوعية، مبوبة كهربياً، تنتقل عبرها الشارة


تس تخرج توكيرها (ظاهره الميز)، فإذاً حالات: مغلقة، مفتوحة أو غير نشطة.

ـ قنّة البوتاسيوم المرتبطة بالغولطية: لها نفس خصائص قنّة الصوديوم الغولطية ولكن لها حالتين فقط:

ـ مفتوحة أو مغلقة.

ـ بل تسميتها: تسمى قنوات مرتبطة بالغولطية لأنها يتحكم في افتتاحها وإنغلاقها قيمة فرق الكتون.

ـ التصرين 02



- السلسلة الفعلية  
1- حل التسجيلين (أ)، (ب) واستنتج العلاقة بينهما.  
2- باستعمال نفس التركيب التجاري السابق واتر تبيه فعال تم حساب عدد القنوات المفتوحة في الموضع (م) وفي أربعة مختلفة، النتائج الحصول عليها ممثلة في جدول الوبقة (02).

الوقت (ثانية)	عدد القنوات									
	قنوات النمط 1					قنوات النمط 2				
متز�دة في الميكرو	متز�دة									
5	4.5	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0
0	0	0	0	0	2	5	25	40	5	0
0	1	2	8	12	18	20	15	5	0	0
	الوبقة (02)									

أ- ترجم نتائج الجدول إلى منحنيين على نفس المعلم.

ب- أوجد العلاقة بين المنحنين والتسجيلين (أ) و(ب) من الوبقة (01).

ج- حدد غطي القنوات المقصودة في هذه الدراسة ومصدر كل تيار.

### الجزء الثاني

عند وضع الجهاز ج 2 على قطعة من الجزء المكثف من الشكل (01) وإحداث عدة تنبีهات متزايدة الشدة في الموضع (ه) أو حقن كميات متزايدة من الأستيل كولين في الشق المشبك.

1- مثل بالرسم النتيجة الممكن الحصول عليها، مبررا إياها.

2- وضُع دور البروتينات المدروسة في نقل المعلومة العصبية عند إحداث تنبية فعال على مستوى الخلية قبل المشبكية.

### الإجابة النموذجية

١-١-١- تسجيل التسجيلين

- التسجيل أ: منحى كمون عمل.

- التسجيل ب: منحى التيارات الكهربائية.

ب- التحليل

التسجيل (أ)


يتمثل منحى تغير الكمون ( $mv$ ) بدلاة الزمن ( $ms$ ) في المخور الأسطواني إثر تبيه فعال.

- من 0 إلى 1 ms: تسجيل زوال الاستقطاب يتغير الكمون فيه من -70 إلى +30 mv.

- من 1 إلى 2.5 ms: تسجيل عودة الاستقطاب إلى -70 mv.

- من 2.5 إلى 3 ms: تسجيل فرط الاستقطاب يصل إلى حوالي -90 mv.

- من 3 إلى 4 ms: تسجيل عودة الاستقطاب إلى حالة الراحة.



### ب- العلاقة

- النتائج قنوات النمط 1 (المنحى) ينتهي عنه التيار الداخلي (في التسجيل ب) وزوال الاستقطاب (في التسجيل أ).

- العلاقة قنوات النمط 1 وافتتاح قنوات النمط 2 (في المنحى) ينتهي عنه تيار خارجي بطيء (في التسجيل أ) وعودة الاستقطاب (في التسجيل أ).

- غلق القنوات 2 مفتوحة (في المنحى) ينتهي عنه تيار خارجي (في التسجيل ب) وفرط استقطاب (التسجيل أ).

الصلة المضمنة  
جـ. نمط القنوات ومصدر تيار


ـ. قنوات النمط 1: قنوات فولطية خاصة بشوارد الصوديوم  $\text{Na}^+$ .

ـ. قنوات النمط 2: قنوات فولطية خاصة بشوارد البوتاسيوم  $\text{K}^+$ .

ـ. مصدر التيار الداخلي: دخول كمية من شوارد الصوديوم  $\text{Na}^+$  من الوسط الخارجي إلى هيولى الليف.

ـ. مصدر التيار الخارجي: خروج كمية من شوارد البوتاسيوم  $\text{K}^+$  من هيولى الليف إلى الوسط الخارجي.

١-١-٢ الرسم



١.٢.٣.٤.٥: تسببات متزايدة للتدفق  
٦.٧.٨.٩: كثافة متزايدة من الأستيل كولين

#### تبرير الإجابة

عند زيادة شدة النبطة في الخلية قبل مشبكية، يزيد تواتر كمونات العمل الناجحة عنه، وعند وصولها إلى النهاية المخوية فما تؤدي إلى تحرير كمية متزايدة من المبلغ العصبي الأستيل كولين، فینفتح عدد متزايد من القنوات الكيميائية لشوارد  $\text{Na}^+$  وتدخل كمية متزايدة منها من الشق المشبكى إلى هيولى الخلية بعد مشبكية مولدة فيها تيارات داخلية ذات شدة متزايدة كذلك.

#### ٢- التوضيح

البروتينات المدرسة هي القنوات الفولطية لشوارد الصوديوم والبوتاسيوم.



عند إحداث تببة فعال على مستوى الخلية قبل المشبكية، تفتح القنوات الفولطية لشوارد الصوديوم  $\text{Na}^+$  وتتدفق كمية منها إلى هيولى الليف العصبي فبسبأ عنها تيار كهربائي داخلي ينتجه عنه زوال في الاستقطاب.

تغلق قنوات الصوديوم المرتبطة بالفولطية تدريجياً وتفتح قنوات البوتاسيوم المرتبطة بالفولطية محدثة تبباً خارجياً فيعود الاستقطاب ثم تغلق قنوات البوتاسيوم المرتبطة بالفولطية تدريجياً. ينتشر زوال الاستقطاب على طول الليف العصبي لتوزيع القنوات الفولطية فيه.

#### كـ التمرير 03

السكسيتيل كولين هو جزيء يستخدم في الطب الاستعجالي لإجراء تقنية التثبيت الرغامي (تمرير أنبوبة رغامية من خلال الفم والحنجرة والأحبال الصوتية ثم يدخل القصبة الهوائية وبذلك يؤمن وصول الأكسجين للمرضى). تطلب هذه التقنية ثبات الأحبال الصوتية (تحكم بها عضلات صوتية). لعله طريقة تأثير السكسيتيل كولين على العضلات الصوتية فتحل دراسة التالية:

#### الجزء الأول




١- انطلاقاً من معطيات الشكل (ا) صـف طـريقـة عـمل الأـستـيـلـ كـولـينـ عـلـىـ مـسـطـوـ المشـبـكـ العـصـبيـ

٢- من معطيات الشكل (ب) قـارـنـ بـيـنـ جـزـيـتـيـ السـكـسـيـتـيلـ كـولـينـ وـالـأـستـيـلـ كـولـينـ.

الجزء الثاني

**السلة الفنية**  
 تحديد طرق تأثير السكينيل كولين وعلاقته بعمل الأستيل كولين لتحقق الدراسة التالية:  
 تم قياس نشاط عضلة العَل (عضلة الساق) استجابة لتبينيات متالية من خلال حقن جرعات متزايدة من السكينيل كولين، الشروط التجريبية ونتائجها ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (02) حيث يُظهر  
 حقن السكينيل كولين بالسهم الأبيض، كل خط يقابل تقلص الاستجابة للتغيير وتحل إيقاع الخط  
 قمة الانكماش.  
**ملاحظة:** آلة عمل عضلات الحال الصوتية مثال لعمل العضلات العضلية.  
 يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة شرح لطريقة تفكيك التوابل العصبية على مستوى الشلة العضلية.



الشكل (١) العمل الأسيطيل كولين إستراز على تحمل الأسيطيل كولين وزوال تأثيره في أقل من 5 ملي ثانية من المرجع أن تستجيب ألياف العضلات لتأثيرات جديدة من الأدوية العصبية. عمل الكريستاز الكاذب (المسلول عن إزالة السكسيتيل كولين) بطيء ويفنى السكسيتيل كولين لمدة 10 دقائق تقريباً في الشق المتشبكي وفقاً لفيزيولوجيا التناقض العصبي العضلي وأآلية عمل الكروز. ن ويدر وغور وآخرون. نوفمبر 2011 الشكا (٢)

الشكل (ب)

- ١- حلل نتائج الشكل (١) من الوثيقة (٢).  
 ٢- اعتماداً على ...

الإجابة النموذجية

- ٤- وصف آليّة عمل الاستيبل كمكواين هو ناقل عصبي يعمل بشكل خاص على مستوى المشابك العصبية العضالية: يتم تثبيت الاستيبل كمكواين الذي يحرره الرمز المشبك على للستقبلات الموجودة على الغشاء.

الجزء الأول

- نحو ٥٥ درجات الحرارة في الاتصال العصبي،  
حيث القناة المرتبطة بالكيمياء، مما يسمح لـ  $\text{Ca}^{2+}$  بالدخول بشكل كبير إلى الخلية العضلية مهدداً إلى انتباها.  
إضافة إلى ذلك، ينفصل الأستيل كولين عن المستقبل ويتحلل بواسطة الإنزيم أستيل كولين إستاز.  
**٢- المقارنة**  
في الشكل (ب) من الوثيقة (٠١) يمكننا أن نرى أن جزيء السكبيتيل كولين يتكون من خلال ما يوضحه الشكل (ب) من الوثيقة (٠١) من جزيئين مناصفين جزئياً، أستيل كولين.  
حيث الاختلاف ينبع السكبيتيل كولين عن الأستيل كولين في الوزن الجزيئي حيث الأستيل كولين أقل.  
حيث أن السكبيتيل كولين يمكنه أن يرتبط بمستقبل الأستيل كولين.  
**الجزء الثاني**  
**١- التحليل**  
عند حفظ جرعة صغيرة من السكبيتيل كولين (١٦ ميكروغرام)، فإننا نلاحظ أن قوة تقلص النعل لم يتم مقارنة بالانكماش قبل الحفظ.  
عند القيام بحقن جرعة أكبر (٧٠ ميكروغرام)، فإننا نلاحظ أن قوة الانكماش تتحفظ بشكل كبير قبل العودة إلى القوة الأولية للانكماش.  
حيث أن جزيء السكبيتيل كولين يؤدي إلى استرخاء العضلة.  
**٢- تبيين آلية عمل السكبيتيل كولين والقائمة من استعماله**  
تعمل عضلات الجسم الصوتية بنفس الطريقة التي تعمل بها عضلة النعل.  
شكل (ب): تدهور الناقلات العصبية في الشق المشبكي.  
إنما في الوثيقة (٠١) أن الأستيل كولين قد تحلل بواسطة الإنزيم أستيل كولين إستاز في الشق المشبكي.  
هذا التحلل يزيد مفعول الناقل العصبي في ٥ مللي ثانية.  
من ناحية أخرى، يتحلل السكبيتيل كولين أيضاً بواسطة إنزيم، ولكن مدة تحله أطول بكثير حيث يبقى جزئياً في الشق المشبكي لمدة ١٠ دقائق، وبالتالي يمكن أن يستمر في العمل.  
إن هذه الدواء الذي له شكل ثلاثي الأبعاد قريب من الأستيل كولين (الشكل ب - الوثيقة ٠١)، يرتبط بفتح قناة الصوديوم (القناة المرتبطة بالكيمياء)، وبالتالي لا يسبب تقلص العضلات (الوثيقة ٢).  
إضافة إلى ذلك، نظرًا لأن مفعول هذا الجزيء يزول ببطء شديد، فإنه يمنع تقلص عضلات الجبل الصغرى لفترة كافية للطبيب لإجراء التشريح الراغم.

التمرين 04

يسكب سم العقرب الموت عند الندييات بسبب حدوث اضطراب في وظيفة الجهاز العصبي.  
من أجل نهم طريقة تأثير سم العقرب على بعض جوانب النشاط الكهربائي للليف العصبي، تحقق تجارب على الالاف عصبية نزمت لها  $F_1$  و  $F_2$ .



السلة الـ ١٥  
الكتور من النوع ب هي الكتور الفولطية  $I_{NO^+}$  لأن افتتاحها ينطوي على مرحلة عودة الاستقطاب

استدلال ناتج التجربة ٢  
غيرك الإشعاع على مستوى الكتور الفولطية من النوع أ دليل على أن السم يؤثر على الكتور الفولطية  $I_{NO^+}$ .

استدلال جدول الوثيقة (٣)  
من ١٣ إلى ١٤: عدد الكتور الفولطية  $I_{NO^+}$  / المفتوحة في وحدة المساحة هو نفس العدد الملاظر الوثيقة (٢).

بعد ١٤: عدد الكتور الفولطية  $I_{NO^+}$  / المفتوحة في وحدة المساحة يبقى مرتفعا.

إذن سم العقرب يمنع انغلاق الكتور الفولطية لشوارد الصوديوم مما يتسبب في تدفق داخلي غير طبيعى مرتفع ودام لشوارد الصوديوم ينجم عن ذلك زيادة في فترة زوال الاستقطاب مما يعيق عودة الاستقطاب لمرفقة عمل الكتور الفولطية لشوارد البوتاسيوم.

بالتالي سم العقرب يمنع غلق الكتورات المرتبطة بالفولطية الخاصة بالصوديوم مما يؤدي إلى استمرار تدفق وحدوث خلل في النشاط الكهربائي للبف العصبي وبالتالي حدوث اضطراب في نقل الرسائل العصبية.

## ٥٥ - التمرين

مرض الباركينسون الذي يعرف باسم الشلل الارتاعي هو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي. من الأعراض الشائعة عند الأشخاص المصابين بهذا المرض الارتاع، تصلب العضلات، فقدان التوازن، فقدان بعض الحركات الإرادية، الأوهام، عدم القدرة على التركيز، بطء في الحركة والكلام... يبحث بر خلال هذا الموضوع عن أسباب هذا المرض العصبي والعلاج المقدم للمصابين به.

### الجزء الأول


الدوبيامين مادة كيميائية يفرزها الجسم بشكل طبيعي تلعب دور هرمون ونقل عصبي، وها دور كبير في عمل الدماغ كما تساعد على حركة الجسم.

تواجد الأجسام الخلوية للعصوبات الدوبامينية (الميتوجة والمفيزة للدوبيامين) في منطقة صغيرة من الدماغ تدعى المادة السوداء، ومحاورها الأسطوانية تندى إلى عدة مناطق أخرى من الدماغ.

الشكل (أ) من الوثيقة (٠١): يظهر مفتر تواعد العصوبات الدوبامينية على مستوى الدماغ.

الشكل (ب): ملاحظة مجهرية مقطع من نسيج المادة السوداء عند شخص سليم وأخر مصاب بمرض الباركينسون.

الشكل (ج): رسم يوضح طريقة عمل الدوباميدين على مستوى المشبك عصبي - عصبي.



١- بالاعتماد على الشكل (ج) للوثيقة (٠١)، صُف طريقة عمل الدوباميدين على مستوى المشبك عصبي - عصبي.

٢- حلل الصورتين المخجريتين من الشكل (ب).

٣- افتح فرضيتين لتفسير سبب فقدان الحاليا الدوبامينية وبالتالي سبب مرض الباركينسون.

**الجزء الثاني**  
أقرب حالات مرض الباركينسون تصب الأشخاص فوق سن الستين، ولكنه وجد أن بعض الأشخاص يصابون بهذا المرض في سن مبكر. يبحث من خلال هذا الجزء عن العوامل والأسباب المولدة لظهور مرض الباركينسون في سن مبكرة.

لقد أجريت العديد من الدراسات ووجد أن المرض له علاقة ببروتين يسمى الباركين تشفر له مورثة تدعى park2.

تظهر الوثيقة (٠٢) جزء من التابع النكيبيودي للسلسلة الغير ناسخة لأليل الشخص سليم وأليل الشخص المريض بالباركينسون للمورثة park2.

رقم التكليبات	أليل الشخص
5' ... TGC ATT ACG TGC ACA GAC GTC AGG ... 3'	السليم
5' ... TGC ATT ACG TGC AGA GAC GTC AGG ... 3'	أليل الشخص للصاب

## (02) الوثيقة

1- باستغلال تلك معلومات الوثيقة (02) بين سبب ظهور مرض الباركنسون في سن مبكر وصادر على صحة إحدى القرضيبين المفترضتين سابقاً.

## الإجابة النموذجية

## الجزء الأول

## 1- الوصف

- الدوبامين ناقل عصبي يتم تركيبه على مستوى العصبون قبل مشبكى ويغزو ضمن حويصلات مشبكى
- عند وصول موجة زوال الاستقطاب إلى النهاية المخورية للعصبون قبل مشبكى، يتم تحرير عصبون (الدوبامين) في الشق المشبكى.
- يتشر الدوبامين في الشق المشبكى (وسط خارج خلوي) ويثبتت على مستقبلاته الغشائية التي للعصبون بعد مشبكى.
- افتتاح القنوات الكيميائية وتندق الشوارد نحو الوسط الداخلى مما يتبع عنه تغير في الكمون على مستوى العصبون بعد مشبكى.
- مصر الدوبامين في الشق المشبكى، يعاد امتصاصه من قبل العصبون قبل مشبكى بواسطة مستقبلات غشائية، وما يبقى منه في الشق المشبكى يتم تفكيكه بواسطة إنزيمات خاصة.

## 2- التحليل

يمثل الشكل (ب) ملاحظة مجهرية لمقطع من نسيج المادة السوداء في الدماغ عند شخص مصاب وشحذ سليم:

في مقطع المادة السوداء لشخص سليم، نلاحظ عدداً كبيراً من العصبونات الدوبامينية، بالمقابل نلاحظ في مقطع الشخص المصاب بمرض الباركنسون عدداً قليلاً جداً من تلك العصبونات.

تستنتج أن مرض الباركنسون مرتبط بفقدان الخلايا العصبية الدوبامينية (المفرزة للدوبامين).

## 3- المقتراب فرضيتين

الفرضية 1: فقدان العصبونات الدوبامينية قد يعود لكوكما أصبحت غير وظيفية (غير قادرة على إنتاج أو إطراح الدوبامين) فتضمر وقوت.


الفرضية 2: فقدان العصبونات الدوبامينية بسبب إصابة فيروسية تؤدي إلى موتها.

## بـ التمرن 01


بحكم المولود الجديد تدريجياً في حركاته نتيجة تغيرات فيزيولوجية من بينها تلك التي تمس المشابك المحيطة خلال نضج الخلايا العصبية. معرفة كيف يتم ذلك تفتح عليك الدراسة التالية:

## الجزء الأول

ثم قياس تغيرات التيار الأيوني والكمون الغشائي على مستوى الغشاء بعد مشبك مشبك بعد يوم من الولادة وبعد شهرين منها. النتائج مبينة في الوثيقة (01).



- استخرج أهم ميزات البروتينات الغشائية الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (02).
  - تأكيد من صحة الفرضية المقترنة باستعمالك لمعطيات الوثيقة (02).
  - قدم حلاً مبيناً على أساس علمية لعلاج أشخاص بالغين يعانون من اضطرابات عصبية ناجمة عن تراكم شوارد الكلور في هيولى الخلية بعد مشبكية.
- الجزء الثالث**
- لتحقق آلية عمل المشبك المبطئ عند شخص سليم بالغ مبرزاً دور مختلف البروتينات الغشائية في ذلك باستعمالك لنتائج الدراسة السابقة ومكتسباتك.



- حل معطيات الوثيقة (01) محدداً المشكلة العلمية المطروحة.
- اقترح فرضية حل هذه المشكلة.

### الجزء الثاني

- لتحقيق من صحة الفرضية المقترنة أجريت الدراسة الممثلة في الوثيقة (02) حيث:
- الشكل (أ): يبين توضع بعض البروتينات في الغشاء بعد مشبكى والمتمثلة في نوعين من مضخات شوارد الكلور (Cl) تدعى NKCC1 و NKCC2 بالإضافة إلى المستقبلات القنوية للـ GABA.
  - الشكل (ب): يمثل تغيرات التركيز الداخلي لشوارد الكلور خلال 60 يوماً بعد الولادة.
  - الشكل (ج): يمثل تطور كمية الـ ARNm للمبروتينات الغشائية NKCC1 و NKCC2 خلال 60 يوماً بعد الولادة.

### الإجابة السودوجية

#### الجزء الأول

##### 1- تحليل

ثمل الوثيقة (01) رسمًا مبسطاً لتركيب غربى لمشبك مشيط بعد يوم وبعد شهرين من الولادة، وكذلك تغيرات التبار الأيوني والكمون الغشائى على مستوى الغشاء بعد مشبكى في المشبكين حيث:

**السلسلة الفعلية**

الوحدة 05: دور البروتينات في الاتصال العصبي

الشكل (ب)، وفي وجود تيبيه تنتقل شوارد الكلور من داخل الخلية إلى الشق المشبكى مولدة فرطاً في الاستقطاب.

وتقىد من حيثيات الشكل (ج) استبدال نوعي المضخات عند نضج الخلية العصبية حيث تركيب الـ ARNm الخاص بـ NKCC1 يكون كبيراً عند الولادة ثم يتناقص حتى ينعدم بعد شهرين، وبقابلة زيادة تركيب الـ ARNm الخاص بـ KCC2.

- إذن الفرضية المقترحة صحيحة ونقسمها "بعد يوم من الولادة الخلايا العصبية غير ناضجة وتوجد بها آلة تجعل تركيز شوارد الكلور في هبوب الخلية بعد مشبكية أكبر من تركيزها في الشق المشبكى، وبعد شهرين من الولادة تنسج الخلية العصبية وتتدخل آلية تعكس تيبيه تركيز شوارد الكلور".

3- تقديم حل

ترسب شوارد الكلور في هبوب الخلية العصبية دليل على عدم توقف عمل المضخة NKCC1، وبالتالي يعطى الشخص مواد تتيح عمل هذه المضخات.

### الجزء الثالث

تصل السائلة العصبية إلى النهاية المخورية وتتسرب في انفصال قنوات فولطية خاصة بشوارد الكالسيوم (Ca<sup>2+</sup>) فتدفق كمية منها إلى داخل الرز المشبكى، حيث يتاسب تركيز شوارد الكالسيوم النافذة للخلية مع توافر كميات العمل وتقول أن السائلة العصبية مشفرة بتركيز شوارد الكالسيوم.

يتسبب دخول شوارد Ca<sup>2+</sup> في تحرير المبلغ العصبي عن طريق عملية الإطراح الخلوي حيث يتثبت المبلغ العصبي الـ GABA على المستقبلات الخاصة به في الغشاء بعد مشبكى (مستقبلات قنوية) فتنفتح قنوات (GABA) المرتبطة بالكيمياء، تند شوارد (GABA) مسيبة فرط استقطاب الغشاء بعد مشبكى.

توقف سعة فرط استقطاب الغشاء بعد المشبكى على عدد المستقبلات القنوات المفتوحة خلال زمن معين.

يسمح انغلاق قنوات (GABA) المرتبطة بالكيمياء بالعودة إلى كموم الراحة.

### به التمارين 02

يعاني بعض الأشخاص من تعب عضلي مزمن وهو مرض نادر (يصيب حوالي شخص واحد من 1000)، يتميز بصعوبة في التเคลص العضلي، رؤية مضاعفة ولا يستطيع الأشخاص المصابين به الحافظة على إبقاء عيونهم مفتوحة لفترة طويلة.

### الجزء الأول

مثل الوثيقة (01) تسجيل الطواهر الكهربائية الملتقطة من طرف إلكترودات موضوعة على مستوى الجلد في العضلة ثم ثبيه العصب الحركي الذي يعصبها، النتائج مماثلة في الوثيقة (01) حيث: الشكل (أ) من الوثيقة (01) يمثل تسجيل كهربائي عند شخص سليم، بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل تسجيل كهربائي عند شخص مصاب بالوهن العضلي. تم التسجيلات على مستوى العضلة.

- **السلسلة الفعلية:** بعد إحداث تيبيه فعال في العصون قبل مشبكى، تتحرر حويصلات GABA في الشق المشبكى وتتشتت على مستقبلاتها في الغشاء بعد المشبكى فتنفتح قنوات خاصة بشوارد الكلور وتند شوارد هذه الشوارد من هبوب الخلية بعد مشبكية إلى الشق المشبكى. وتسجل في الغشاء بعد مشبكى تياراً أبيضاً خارجاً وزوالاً في الاستقطاب.
- **بعد شهرين من الولادة:** عند القيام بنفس التجربة السابقة، تحدث نفس النتيجة ولكن شوارد الكلور تند في الإتجاه المعاكس، من الشق المشبكى إلى هبوب الخلية بعد مشبكية. وتسجل في الغشاء بعد مشبكى تياراً أبيضاً داخلياً وفرطاً في الاستقطاب.
- **استنتاج أنه بعد يوم من الولادة المشابك المثبطة تقوم بنفس عمل المشابك المتباعدة.**
- **مشكلة علمية:** كيف نفس تسجيل زوال استقطاب في المشبك المثبطة بعد يوم من الولادة، ثم تسجيل فرط في الاستقطاب في نفس المشبك بعد شهرين من الولادة؟

### 2- اقتراح فرضية

بعد يوم من الولادة الخلايا العصبية غير ناضجة وتوجد بها آلة تجعل تركيز شوارد الكلور في هبوب الخلية بعد مشبكية أكبر من تركيزها في الشق المشبكى، وبعد شهرين من الولادة تنسج الخلية العصبية وتتدخل آلة تعكس تيبيه تركيز شوارد الكلور.

### الجزء الثاني

#### 1- أهم مميزات البروتينات الفشارية

GABA مستقبل قنوي للـ

- توجد بعد الولادة ويستمر وجودها.
- تحيى على قنوات تفتح في وجود المبلغ العصبي الـ GABA.
- تند شوارد الكلور حسب تدرج تركيزها.

NKCC1

- توجد بعد الولادة وتتناقص حتى تخفي من الخلايا العصبية بعد 60 يوماً.
- تند شوارد الكلور عكس تدرج تركيزها (نقل فعال)

KCC2

- لا توجد في غشاء الخلية العصبية بعد الولادة ويتم تركيبها بعد ذلك.
- تند شوارد الكلور عكس تدرج تركيزها (نقل فعال).

### 2- التأكيد من صحة الفرضية

يوضح الشكل (أ) أن الخلية العصبية بعد يوم من الولادة محتوية على المضخات NKCC1 التي تند شوارد الكلور من خارج إلى داخل الخلية العصبية فيصبح التركيز الداخلي لشوارد الكلور كبيراً كما هو موضع في الشكل (ب)، وفي وجود تيبيه تند شوارد الكلور حسب تدرج تركيزها من داخل إلى خارج الخلية بعد شهرين من الولادة، تنسج الخلية العصبية ويتم استبدال هذه المضخات بنوع آخر هي KCC2 تند شوارد الكلور عكس للمضخات السابقة، فيصبح التركيز الداخلي لشوارد الكلور قليلاً كما هو موضع في

شخص غير مصاب	شخص مصاب
+++	-----

(03)

ـ بحة إحدى الفرحيات الساقية.

**الجزء الثالث**

ـ عمليات ووظائف الموضع وبح بررس تفسيري آلة عمل المرض العصبي - العصبي عدد أحصى ملخصاً بخصوص الذهن العصبي.

**الإجابة المودعة****الجزء الأول****1- التحليل المقارن**

ـ في الوبية تسجيلات كهربائية للعصبية عند شخص سليم وأخر مصاب بعد تسمم العصب الريفي الذي منها.

ـ هنا الشخص ثالث تسجيلات متباينة ومتباينة فسجلنا ثلاثة كمومات متباينة عند كل منهما لكن، عند الشخص السليم يلاحظ أن الكمومات الثلاثة المسجلة متباينة تماماً فيما بينها وبين الشخص المصاب يلاحظ تحويل الكمون الأول بمثابة الشخص السليم، أما عن الكمومين التاليين فلاحظ أن معندهما متباقة.

ـ ينتهي أن عصبية الشخص المصاب بالذهن العصبي تتحجب بفعالية أقل للتسهبات المتكررة أو المتالية.

**2- اقتراح فرضيات**

ـ ورقة 1: تناقض في إفراز النوع الكيميائي أستيل كولي.

ـ ورقة 2: وجود ما يغطي عمل مستقبلات العصبية العدالة المشككة.

ـ ورقة 3: حلول في المستقبلات العصبية للأستيل كولي.


**الجزء الثاني****تبين صحة إحدى الفرضيات**

ـ من الوبية (02) من الوبية (02)

ـ يظهر العشاء بعد المشككي عند الشخص السليم كثير النموح وغير الارتفاع وهذا يدل على كثرة مستقبلات الأستيل كولي فيه.

ـ يظهر العشاء بعد المشككي عند الشخص المصاب قليل النموح وصعب أو معدوم الارتفاع تجاهها وهذا يدل على قلة أو غياب مستقبلات الأستيل كولي فيه.

ـ من الوبية (03)



ـ قدم تحليلاً مقارناً لهذه النتائج.

ـ اقترح فرضيات تفسر فيها سبب المرض بالذهن العصبي.

**الجزء الثاني**

ـ التأكيد من إحدى الفرحيات الساقية، ثم إنجاز التحاليل التالية في عمار طيبة مختصة.


ـ التجربة 1: تم إنجاز مقاطع على مستوى مثبات عصبية - عصبية أحضرت لمعالجة حادة حيث استعمل مادة مشعة تم تصوير الإشعاع الذي و ذلك يكشف عن وجود مستقبلات الأستيل كولي التي تذهب إلى سوداء في الوبية (02).



التعرية 2: ثقل الوبية (03) التالية شائع لحالات دم الشخص المصاب والشخص السليم

الجزء الثالث

رسه تفسيري يوضح آلية عمل التشريح العصبي - تفصيلي جداً موسوعة مصادر مصابين بمرض الروهن العقلي



- 1- حل النتائج الحصول عليها في الشكل (ج) من الوثيقة (01).
  - 2- افتح فرضيتين لتفسير آلية تأثير الدواء بالكلوفين على الكمون الغشائي.

الجزء الثاني

للتتحقق من صحة إحدى الفرضيات المفترضتين نعيد التجربة السابقة (الوثيقة 01) ولكن يتم وضع العصبيون المحركي في وسط خال من شوارد الكلور (A). النتائج الحصول عليها مماثلة في الشكل (A) من الوثيقة (02).

مثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة البنية الجزيئية لكل من الـ GABA والباكلوفان. يوجد نوعين من المسقبلات العشائية للأـ GABA متسايمان من حيث البنية:

النوع الأول يدعى GABA<sub>A</sub>، ينشط بواسطة المبلغ الكيميائي الـ GABA ويتوارد على مستوى الغشاء بعد مشبك.

النوع الثاني يدعى GABA<sub>A</sub>، ينشط بواسطة الباكلوفين ويتوارد على مستوى الغشاء قبل مشبكى والغشاء بعد مشبك ..

مثل الشكل (ج) مقر الدور الفيزيولوجي للمستقبلات من النوع GABA<sub>A</sub> على مستوى المشبك.

التمرين 03

الباكلوفين دواء مرض للعضلات يعمل على الجهاز العصبي المركزي ويشمل النخاع الشوكي. يخفف من التشنجات، تقلصات وارتخاء العضلات الناتجة عن أمراض مثل التصلب المتعدد، وحديثاً يستعمل لعلاج الإدمان على الكحول.

يعرض التعرف على طريقة عمل دواء الباكلوفين على مستوى الخلايا العصبية للنخاع الشوكي، نظرًا لعليك الدراسة التالية:

الجزء الأول

على مستوى بعض الخلايا العصبية، تغير العدديد من التجارب باستخدام نفس التركيب التجربى للمثال في الشكل (أ) من الوثيقة (01)، يطبق تبيه فعال على الليف العصبي 1 ثم على الليف العصبي 2. التالع المسجلة على مستوى الجسم الخلوي للعصبون الحركي ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (01).  
حقن في 52 نفس التركيز من الـ GABA أو الباكلوفين. تغيرات الكمون الغشائى على مستوى الجسم الخلوي ممثلة في الشكل (ج) من الوثيقة (01).

الرويّنات في الاتصال المعنوي

الإجابة النموذجية

الجزء الأول  
، التحليل

**الشكل (ج) تسجيلات لغيرات الكهون العثماني في وجود العابا والباكلوفين بدلالة الرمن حيث**

ـ حقن الـ GABA، نلاحظ تسجيل فرط في الاستقطاب غشاء العصبون الحركي (بعد مشبك) سعة 5،  
ـ بما يتم تسجيل فرط في الاستقطاب بستة أكبر (15) على مستوى غشاء العصبون الحركي بعد حقن  
ـ الـ GABA.

يُنْجِعُ أَنَّ الْمَاكْلُوفِينَ لِهِ تَأْثِيرٌ تَبَيِّنُ مِثْلَ تَأْثِيرِ الـ GABA، يُرْفِعُ مِنْ نَشَاطِ الْعَصْبُونِ بَعْدَ مُشَبِّكِ الْمُبَطِّنِ.

**الفرضية 1:** يثبت الباكلوفين على المستقبلات الغشائية بعد مشبكة لـ GABA مسبباً افتتاح القنوات كيميائية للكلور، تدفق هذه الشوارد نحو الوسط الداخلي ينجم عنه إفراط في استقطاب الغشاء بعد نسخ.

**الفرضية 2:** يثبت الباحثون على نوع آخر من المستقبلات الغشائية بعد مشبكة مسبباً تدفقاً لشوارد بـ $\beta$  تأسيم نحو الوسط الخارجي يتحقق عن ذلك فرط في استقطاب الغشاء بعد مشبكى.

الجزء الثاني

يُوسط بدون Cl<sup>-</sup>, لا نلاحظ تغيراً في الكمون العشائري للعصبيون الحركي في وجود الـ GABA, في حين لاحظ تسجيل إفراط في الاستقطاب قيمته - 85 ملي فولط وسعنته 15 في وجود البالكلوفين.


لأن الباكلوكوفين لا يؤثر على نفس المستقبلات العشائية، وهذا يؤكد عدم صحة الفرضية ١: باكلوكوفين يؤثر على المستقبلات العشائية لـ GABA.

استغلال الشكلين (ب) و(ج)

من خلال الشكل (ب): نلاحظ تشابه البنية الجزيئية للباكلوفين والـ GABA<sub>A</sub>.

من خلال الشكل (ج)

نشابه في البنية والمستقبلات العشائية لكل منها، يفسر التأثير المترافق معه إحداث إفراط في استقطاب لغشاء بعد مشككي. ولكن يختلفان من حيث آلية عملهما، فالباكلوفين يثبت على مستقبلات غشائية من نوع  $GABA_A$  تواجد على مستوى الغشاء بعد مشككي، يؤدي ذلك إلى تشطيط بروتين  $\alpha_1 G_i$ . بينما هذا الأخير قنوات أيونية لشوراد  $K^+$  مما يؤدي إلى زيادة نفاذية شوراد  $K^+$  عبر هذه القنوات نحو الوسط خارجي مسببة إفراط في استقطاب الغشاء بعد مشككي. وهذا يؤكد صحة الفرضية 2: ثبات الباكلوفين على نوع آخر من المستقبلات العشائية يؤدي إلى تشطيط قنوات أيونية لشوراد  $K^+$  ومنه يتبع زيادة في تدفق الخارجي لشوراد  $K^+$  الذي يسبب فرطاً في استقطاب الغشاء بعد مشككي.



الوثيقة (02)

- 1- استدل بمعطيات الوثيقة (02) للتأكد من صحة إحدى الفرضيات المقترحبين.
  - 2- استخرج المعلومة الإضافية التي يقدمها الشكل (ج) فيما يخص دور الباكلوفين في تحفيز الشنجان المعلنة.

الجزء الثالث

ستجيئ بالنتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة، أخير خلاصة لأهمية استعمال دواء الباكلوفين في علاج الشحشاحات العضلية.

**النهاية العصبية**

**ثوم الطبيعة والحياة من الأسرار**

**الجزء الثالث**

ـ المعلومات الإضافية على مستوى المشبك وذلك من خلال تقبيله على مستقبلات الكاكتوفين ينهي الشكل، تثبت العصبية على مستوى المشبك مما يؤدي إلى تبييض الرسالة العصبية التي تصل إلى العصبون العصبي، ملحوظةً تكمن في انتشار قيل المشبكى مما يزيد من انتشار العصبية، ومن كثرة عصبية الإفراط الحبوي للأستيل كوكوبين في الشوك المشبكى مما يؤدي إلى إزالة العضلات (تحذيف من النشاط العصبي).

**الجزء الرابع**  
يد معكرونة من العوامل ذات صلة بحدوث التشنج العصبي، فمثل هذا المتعكس أفرم كثرة كثرة لدوره في تحفيز حركات الحركة التي تقوم العضلات خلاها بالانطلاق والاسترخاء والعمل على دفع العضلات أكثر من اللازم، حيث تكون العضلات نشطة بشكل مستمر مما يؤدي إلى عدم مقدرة الشخص والاسترخاء بسبب فرط تقبيل العصبون الحركي.

ـ العمل الشفلي للباكتيريون يتوقف على متى ونوع المستقبلات الغشائية:

ـ على مستوى العشاء بعد مشبكى، يتبين في إفراط استقطاب الغشاء بعد مشبكى (العصبون العصبي).

ـ على مستوى الغشاء قبل مشبكى، يتبين في تبييض إطراح المبلغ الكيميائي مثل الأستيل كوكوبين.

ـ يقوم العصبون الحركي في وجود الباكتيريون بدمج مختلف الرسائل العصبية الواردة إليه: PPSE مع GABA مع الباكتيريون فو سعة أقل نتيجة عمل الباكتيريون، فتكون القيمة الجبرية لتشعب (القضائي) أقل من عملية توليد كمون العمل بعد مشبكى، حيث يبقى الكمون المتولد موضعياً (عليها) يتشر على طول غشاء العصبون الحركي، فتستتر العضلات بزوال التشنج العصبي.

ـ إذن الباكتيريون دواء مشيط للجهاز العصبي المركزي (النخاع الشوكي)، فهو يحظر المستقبلات الغشائية نوع GABA قبل وبعد مشبكى، يترك عمله على زيادة تشريح الخلية بعد مشبكية الذي يبدأ بشكر الخلية قبل مشبكى، وأساسى من النخاع الشوكي بالإضافة إلى تبييضه لعلمية إطراح الأستيل كوكوبين من قبل النهاية العصبية.


ـ باعتبار الباكتيريون مرحاً للعضلات وذا تأثير مركزي، فإن الباكتيريون لا يؤثر بطريقة مباشرة على إفراط الرسالة العصبية على مستوى المشبك العصبي العضلي.

**العنصر 04**

ـ مرض السمن البوتوسي عبارة عن شلل حركي سريع وقاتل سببه ابتلاع سمن البوتوسي من النوع A الذي تقرره البكتيريا كلودستريديوم بوتيلينوم (*Clostridium botulinum*) والتي يكثر وجودها في أنسجة الحيوانات الشائفة للتحلل، الأغذية الفاسدة والزباد.

**الجزء الأول**

ـ مثل الوثيقة (01) آلية تحرير المبلغ العصبي على مستوى المشبك.



- صـ آلـية تـحرـير المـبلغ العـصـبي عـلـى مـسـطـوى المشـبك مـسـتـعينـا بـالـمراـحل المـشار إـلـيـها بـالـأـرقـام (1, 2, 3 و 4).
- سـ سـمـ الـبوـتـولـيكـ (ـبـوتـوكـسـ) مـنـ التـوـرـ Aـ يـؤـثـرـ عـلـىـ مـسـطـوىـ المشـبكـ العـصـبيـ -ـ العـضـلـيـ فـيـ النـهاـيـةـ غـرـبـةـ لـلـعـصـبـيـنـ قـبـلـ مشـبكـيـ. اـقـرـئـ فـرـضـيـنـ لـتـفسـيـرـ طـرـيـقـةـ تـأـثـيرـ سـمـ الـبوـتـولـيكـ مـنـ التـوـرـ Aـ عـلـىـ المشـبكـ

**الجزء الثاني**

- ـ لـفـضـ الـتحقـقـ مـنـ صـحةـ إـحـدـيـ الـفـرـضـيـنـ الـمـقـرـرـيـنـ، تـقـدـمـ لـكـ الـمـعـطـيـاتـ التـالـيـةـ:  
ـ الـمـعـطـيـ الـأـوـلـ: مـنـ أـجـلـ مـلـاحـظـةـ الـعـلـمـ الـجـزـيـ لـسـمـ الـبوـتـوكـسـ Aـ، نـسـتـعـمـلـ تقـنيـةـ الـمـحـرـجـةـ الـكـهـرـيـاـلـيـةـ لـنـفـعـ الـعـصـبـيـنـ (ـسـيـنـتـاـكـسـ)ـ وـ (ـسـنـاـپـ25ـ)ـ الـمـتـواـجـدـيـنـ فـيـ النـهاـيـةـ الـعـصـورـيـةـ لـلـخـلـيـةـ قـبـلـ مشـبكـيـ.  
ـ غـيـابـ سـمـ الـبوـتـولـيكـ Aـ.

**نتائج المحرج الكهربائية مماثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (02).**

- ـ مـلـاحـظـةـ: الـمـحرـجـةـ الـكـهـرـيـاـلـيـةـ هيـ تقـنيـةـ تـسـمـعـ بـفـصـلـ الـجـزـيـاتـ حـسـبـ الـوزـنـ الـجـزـيـيـ. تـنـاسـبـ مـسـافـةـ هـجـرـةـ الـجـزـيـاتـ عـكـسـاـ مـعـ الـوزـنـ الـجـزـيـيـ. تـشـيرـ الـأـرـقـامـ إـلـىـ الـوزـنـ الـجـزـيـيـ وـيـعـرـ عـنـهـ بـالـكـيـلـوـ دـالـتـونـ (ـkdaـ).

ـ الـمـعـطـيـ الـثـانـيـ: يـمـثـلـ الشـكـلـ (ـبـ)ـ مـنـ نفسـ الـوـثـيقـةـ تـأـثـيرـ سـمـ الـبوـتـولـيكـ Aـ عـلـىـ النـشـاطـ الـكـهـرـيـاـلـيـ للـخـلـيـةـ بعدـ مشـبكـيـ.

- ـ مـلـاحـظـةـ: تـسـجـيـلـاتـ الشـكـلـ (ـبـ)ـ تـبـيـنـ النـشـاطـ الـكـهـرـيـاـلـيـ للـخـلـيـةـ بـعـدـ مشـبكـيـ. تـمـثـلـ كـلـ ذـرـوةـ اـتجـاهـ الـأـفـلـ اـسـتـجـابـةـ بـعـدـ مشـبكـيـ.

**الجزء الثاني: دور البروتينات في الاتصال العصبي**

**المصادقة على صحة الفرضية**  
البيانات أشكال الوثيقة (02)

شكل (أ): يمثل نتائج التجربة الكهربائية لـ **SNAP25** والساناكسين في وجود أو غياب سـمـ الـبوتـيلـيكـ منـ التـوـعـ Aـ.

النـسـةـ لـرـوـوتـينـ سـانـاكـسـينـ: في وجود أو غـيـابـ سـمـ الـبوتـيلـيكـ منـ التـوـعـ Aـ مـسـافـةـ التجـرـبـةـ ضـمـنـ الجـمـالـ الـكـهـرـبـاـيـيـ لمـ تـغـيـرـ مـاـ يـدـلـ عـلـىـ أـنـ الـكـلـلـةـ الـجـرـبـيـةـ لمـ تـغـيـرـ فـيـ كـلـاـ الـحـالـيـنـ (37 kDa)ـ وـهـذـاـ يـؤـكـدـ عدمـ صـحـةـ الفـرـضـيـةـ 2ـ (تأـثـيرـ سـمـ الـبوتـيلـيكـ يـكـوـنـ عـلـىـ مـسـطـوـيـ سـانـاكـسـينـ).

النـسـةـ لـرـوـوتـينـ **SNAP25**ـ: في غـيـابـ سـمـ الـبوتـيلـيكـ منـ التـوـعـ Aـ، نـلـاحـظـ بـقـعـةـ سـوـادـ وـاحـدـ قـطـطـ وـتـكـونـ مـسـافـةـ التجـرـبـةـ أـكـبـرـ مـقـارـنـةـ مـعـ مـسـافـةـ الـتـيـ يـقـطـعـهاـ بـرـوتـينـ سـانـاكـسـينـ لـأـنـ كـلـلـةـ الـجـرـبـيـةـ (25 kDa)ـ أـقـلـ مـنـ الـكـلـلـةـ الـجـرـبـيـةـ لـرـوـوتـينـ سـانـاكـسـينـ.

في وجود سـمـ الـبوتـيلـيكـ منـ التـوـعـ Aـ، نـلـاحـظـ وـجـودـ بـقـعـتـينـ مـعـ زـيـادـةـ فيـ مـسـافـةـ التجـرـبـةـ لـكـلـ بـقـعـةـ مـقـارـنـةـ مـعـ تـلـكـ المـسـجـلـةـ فـيـ غـيـابـ سـمـ وـهـذـاـ يـدـلـ عـلـىـ اـخـفـاضـ فـيـ الـكـلـلـةـ الـجـرـبـيـةـ لـلـبـقـعـتـينـ وـلـيـ توـافـقـ أـجـرـاءـ منـ بـرـوتـينـ **SNAP25**ـ وـهـذـاـ دـلـيـلـ عـلـىـ تـفـكـيـكـ بـرـوتـينـ **SNAP25**ـ إـلـىـ أـجـزـاءـ بـاسـطـةـ سـمـ الـبوتـيلـيكـ.

إـذـنـ أـنـ عـلـمـ (تأـثـيرـ سـمـ الـبوتـيلـيكـ منـ التـوـعـ Aـ)ـ يـكـوـنـ فـقـطـ عـلـىـ مـسـطـوـيـ بـرـوتـينـ **SNAP25**ـ المتـواـجـدـ فـيـ الـنـهـاـيـةـ الـخـوـرـيـةـ لـلـخـلـيـةـ قـبـلـ مـشـبـكـةـ قـبـلـ خـلـلـ تـجـرـبـةـ (تفـكـيـكـهـ).


**الشكل (ب)**

في غـيـابـ سـمـ الـبوتـيلـيكـ: نـلـاحـظـ نـشـاطـ كـهـرـبـاـيـيـ كـبـيرـاـ لـلـخـلـيـةـ بـعـدـ مـشـبـكـةـ (قـوةـ الـاستـجـابـةـ بـعـدـ مـشـبـكـةـ)،ـ بـالـقـابـلـ فـيـ وـجـودـ سـمـ الـبوتـيلـيكـ،ـ نـلـاحـظـ نـشـاطـ كـهـرـبـاـيـيـ ضـعـيفـاـ جـداـ لـلـخـلـيـةـ بـعـدـ مـشـبـكـةـ (استـجـابـاتـ بـعـدـ مـشـبـكـةـ فقطـ).

إـذـنـ سـمـ الـبوتـيلـيكـ منـ التـوـعـ Aـ يـسـبـبـ إـخـفـاءـ النـشـاطـ الـكـهـرـبـاـيـيـ لـلـخـلـيـةـ بـعـدـ مـشـبـكـةـ،ـ مـاـ سـيـقـ مـنـ تـخلـصـ مـاـ يـلـيـ:

تفـكـيـكـ (تجـزـيـةـ) بـرـوتـينـ **SNAP25**ـ بـوـاسـطـةـ سـمـ الـبوتـيلـيكـ منـ التـوـعـ Aـ يـمـنـ النـفـاعـ (الـإـرـتـاطـ) مـعـ بـرـوتـينـ سـيـنـاـبـوـرـيفـينـ،ـ مـاـ يـجـعـلـ مـنـ الـمـسـجـلـ إـطـرـاجـ الـحـوـصـلـاتـ الـمـشـبـكـةـ،ـ وـبـالـتـالـيـ مـنـ تـحـرـيرـ الـمـلـبـعـ (الـوـسـيـطـ)ـ الـعـصـيـيـ فـيـ الشـقـ الـمـشـبـكـ.

يـمـنـ سـمـ الـبوتـيلـيكـ منـ التـوـعـ Aـ النـقـلـ الـكـيـمـيـيـ لـلـرـسـالـةـ الـعـصـيـيـ عـلـىـ مـسـطـوـيـ الـمـشـكـ العـصـيـيـ -ـ الـعـضـلـيـ.ـ تـدـلـ هـذـهـ النـتـائـجـ الـمـسـتـخـرـجـةـ عـلـىـ صـحـةـ الـفـرـضـيـةـ 1ـ الـتـيـ تـنـصـ عـلـىـ أـنـ سـمـ الـبوتـيلـيكـ منـ التـوـعـ Aـ يـؤـثـرـ عـلـىـ مـسـطـوـيـ بـرـوتـينـ **SNAP25**ـ المتـواـجـدـ فـيـ الـنـهـاـيـةـ الـخـوـرـيـةـ لـلـخـلـيـةـ قـبـلـ مـشـبـكـةـ.



انطلاقـاـ مـنـ درـاسـتكـ لـنـتـائـجـ الشـكـلـيـنـ (أـ)ـ وـ(بـ)ـ مـنـ الـوـثـيقـةـ (02)ـ،ـ صـادـقـ عـلـىـ الـفـرـضـيـةـ الصـحـيحـ.

**الجزء الثالث**

انطلاقـاـ مـنـ الـمـعـلـومـاتـ الـتـيـ توـصـلـ إـلـيـهـاـ مـنـ خـلـلـ هـذـهـ الـدـرـاسـةـ،ـ أـنـجـزـ رـسـمـ تـخطـيطـلـاـ تـوضـعـ فـيـ كـيـنـيـ.

**الإجابة النموذجية**

**الجزء الأول**

**1- الوصف**

1- غـيـابـ مـعـورـيـةـ فـيـ حـالـةـ رـاحـةـ (حوـصـلـاتـ مـشـبـكـةـ مـغلـقـةـ).

2- وـصـولـ كـمـوـنـ عـمـلـ إـلـىـ النـهـاـيـةـ الـخـوـرـيـةـ يـسـبـبـ فـيـ تـفـاعـلـ الـإـرـتـاطـ بـيـنـ بـرـوتـينـ **SNAP25**ـ وـسـيـنـاـبـوـرـيفـينـ.

3- هـذـاـ تـفـاعـلـ مـعـ **SNAP25**ـ يـسـبـبـ بـدـاـيـةـ ظـاهـرـةـ الـإـطـرـاجـ الـخـلـويـ.

4- تـغـيـرـ الـوـسـيـطـ (الـمـلـبـعـ)ـ الـعـصـيـيـ فـيـ الشـقـ الـمـشـبـكـ.

**2- المقترن فرضيتين**


**الفرضية 1:** سـمـ الـبوتـيلـيكـ منـ التـوـعـ Aـ يـؤـثـرـ عـلـىـ مـسـطـوـيـ بـرـوتـينـ **SNAP25**ـ المتـواـجـدـ فـيـ غـشـاءـ الـهـيـلـيـ الـخـلـويـ فـيـ الشـقـ الـمـشـبـكـ مـاـنـعـاـ بـذـلـكـ اـرـتـاطـهـ (تفـاعـلـهـ)ـ مـعـ بـرـوتـينـ سـيـنـاـبـوـرـيفـينـ مـاـ يـعـقـ عـملـةـ طـرـاجـ الـخـلـويـ.

**الفرضية 2:** سـمـ الـبوتـيلـيكـ منـ التـوـعـ Aـ يـؤـثـرـ عـلـىـ مـسـطـوـيـ بـرـوتـينـ سـانـاكـسـينـ المتـواـجـدـ فـيـ غـشـاءـ الـهـيـلـيـ الـخـلـويـ فـيـ الشـقـ الـمـشـبـكـ مـاـنـعـاـ بـذـلـكـ اـرـتـاطـهـ (تفـاعـلـهـ)ـ مـعـ بـرـوتـينـ سـيـنـاـبـوـرـيفـينـ مـاـ يـعـقـ عـملـةـ طـرـاجـ الـخـلـويـ.

الحمد لله

الجزء الثالث


السنة ٢٠١٣



٠١ (شنبه)

- ١- حدد أهم محورات الجريمة العثمانية (١, ٢, ٣).  
 ٢- فتح فرضيتي تفسير آلية تأثير سوء المفهوم المعمروطة.

الجزء الثاني



(02) 41.3, 3

تحقيق من صحة الفرضيات

تحريض المفسر في الوثيقة (02)

النحو والتاء

**النحوة 1:** تتبه الليف بعضى فل منكى تطبق كمون اصطداعى مفروض، ثم تحلى في آد واحد الدفق الأبوى لشوارد<sup>(٤)</sup> الداخلة ولظهور الكهربائية الناتجة على مستوى العشاء، قيل وبعد مشكى، أشحاحات الخصل عليها مثلثة في شكل<sup>(٥)</sup> من الونقة (٠٢).

**التعريفة 2:** نعيد التحريفة السابقة  
باستعمال نفس التركيب التحريري  
ويمكّن في وجود سوء الفواع  
المحروطة. التسجيلات الخصل  
عليها ممثلة في الشكل (ب) من  
نفس الميغة.

التعريف 05

الواقع المحروظة الحرية تواجد خاصة في الغيط الهادي، تستخدم في صيدها مما يمثل فريستها (قد  
سميت بالمسنة للإنسان).

يختوي الاسم على العديد من الشهادات، أحد هذه الشهادات يسمى صعوبة في التنفس بسبب ضل عضلات الحجاب الحاجز، فقدان التسبيق الحركي وفشل القلب. معرفة آلية تأثير سبب هذه الفوائدة تقع عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول

تلعب الروتينيات دوراً أساسياً في انتقال الرسالة العصبية على مستوى المثلث. نظير الوثيقة (٥١) أعلاه مختلفة من الروتينيات المتواحدة على مستوى المثلث.

1- حدد النتيجة التفريغية للكمون المطبق المفروض على الغشاء قبل المشبك.

2- اتصالاً من تسجيلات الشكل (( )) من الوثيقة (02)، أشرح العلاقة بين الكمون المفروض على الغشاء بعد مشبكى.

في مشبكى والكون المسلح على مستوى الغشاء بعد مشبكى.

3- اتصالاً من تسجيلات الشكل (ب) وبنطقيف الناتج التي توصلت إليها، صادر على صحة إنحراف الرضيبيين المترجحين سابقاً.

**الجزء الثالث**  
الصلة لما سبق ومعلوماتك انجز خلاصة توضح فيها تأثير سبب الواقع المخربوطية على آلية النقل المشبك

### الإجابة النموذجية

#### الجزء الأول أهم مميزات البروتينات الفشائية (3, 2, 1)

مميزات البروتينات الفشائية	الشكلان (مفتوحة وملقنة)
ناتهاجها مرتبط بتغير فرق الكمون الغشائي.	ناتهاجها مرتبط بالقوليفية تواجد في غشاء النهاية الخورية فقط.
ناتهاجها كهربائياً (نسمح بدخول شوارد <sup>2+</sup> ) حسب تدرج التركيز.	ناتهاجها كهربائياً (نسمح بدخول شوارد <sup>2+</sup> ) حسب تدرج التركيز.
ناتجها تكمن في تحفيز هجرة الحويصلات المشبكية وتغيير الماء العصي.	ناتجها تكمن في تحفيز هجرة الحويصلات المشبكية وتغيير الماء العصي.
ناتهاجها مغلقة، مفتوحة، غير منشطة.	ناتهاجها مغلقة بالقوليفية تواجد في الغشاء قبل وبعد مشبكى.
ناتجها كهربائياً (نسمح بدخول <sup>+</sup> ) حسب تدرج التركيز.	ناتجها كهربائياً (نسمح بدخول <sup>+</sup> ) حسب تدرج التركيز.
يلعب دور مستقبل للأستيل كولين ودور قنطرة أيونية في آن واحد.	يلعب دور مستقبل للأستيل كولين ودور قنطرة أيونية في آن واحد.
مستقبل قوي (معدن) - قنطرة الأيونية (المبة كيميائية) لا تفتح إلى بعد تبیث (الأستيل كولين) في موقع نوعي له.	مستقبل قوي (معدن) - قنطرة الأيونية (المبة كيميائية) لا تفتح إلى بعد تبیث (الأستيل كولين) في موقع نوعي له.

#### 2- اقتراح فرضيات

إحدى بديلات سبب الواقع المخربوطية الأكثر فعالية يتسبب في شلل أي عدم وصول التبیث للعضلة وبذلك تفتح الفرضيات التالية:

**الفرضية 1:** يبطّل سبب الواقع المخربوطية لنشاط القنوات الفراغية لشوارد الكالسيوم المتواجد على غشاء النهاية الخورية.

ما يعلن هجرة الحويصلات المشبكية وعدم إطراح الوسيط العصبي (الأستيل كولين) في الشق المشبك.

**الفرضية 2:** يبطّل سبب الواقع المخربوطية لشوارد الكالسيوم الذي يعبر إفراز المبلغ العصبي إلى عدم الناتج للقنوات الفراغية لشوارد<sup>2+</sup> المتواجدة على الغشاء قبل مشبكى يأخذ ذلك العصبي على مستوى المشبك.

مسباً عدم إطراح الأستيل كولين المسئول على انتقال الماء

- السلسلة العصبية  
الفرضية 3: يبطّل سبب الواقع المخربوطية لنشاط القنوات الفراغية لشوارد الكالسيوم المتواجد في الغشاء بعد مشبكى، ثبیث الماء في الموقع شخص لثبت الأستيل كولين.  
الجزء الثاني

1. القيمة التقريرية للكمون المطبق المفروض  
للكمون المفروض على جاني الغشاء يؤدي إلى تغير الكمون الغشائي  $mv = 25$  . وهذا يستوجب إلغاء تكون الراحة ( $mv = 60$  ) وذلك بإرسال كمون قيمة تساوي  $(mv = 35 + 25 - 60)$  وهي قيمة الكمون المطبق المفروض.  
2- الشرح

العلاقة غير مباشرة، حيث تطبيق كمون مفروض على الغشاء يؤدي إلى تغير الكمون الغشائي ( $-25 mv$ ) ما يؤدي إلى افتتاح القنوات الفوليفية لشوارد<sup>2+</sup>. افتتاح هذه القنوات يسمح بتدفق شوارد<sup>2+</sup> ميسية زوال استقطاب الغشاء قبل مشبكى (توليد كمون عمل). تتفاقم موجة زوال الاستقطاب إلى غشاء النهاية الخورية يؤدي إلى افتتاح القنوات الفوليفية لشوارد<sup>2+</sup> ، التدفق الداخلي لهذه الشوارد (تيارات أيونية داخلية تقدر قيمتها بـ  $300 \text{ UA/cm}^2$  ، تغير شوارد<sup>2+</sup> هجرة الحويصلات المشبكية وديها في الغشاء قبل مشبكى خورة الأستيل كولين في الشق المشبكى.

يت الأستيل كولين على المستقبلات الفوليفية للغشاء بعد مشبكى ملداً إلى افتتاح القنوات الكيميائية التي تسمح بدخول شوارد<sup>2+</sup> مولددة كموناً بعد مشبكى تبيهها PPSE قيمة في حدود  $0 mv$  . إذن يضمن الكالسيوم الانتقال من نحط من التسفس إلى خط آخر: الرسائل العصبية المنشورة على مستوى العنصر قبل المشبكى بتواء كمونات العمل تؤدي إلى تغير في كمية المبلغ العصبي الخروجية على مستوى الشبك (تشفر بزاكيز المبلغ الكيميائي) الذي يتسبب في توليد رسائل عصبية بعد مشبكى مشفرة بتواء كمونات العمل.

#### 3- المصادقة على صحة أحدى الفرضيات

في وجود سبب الواقع المخربوطية، عند تطبيق الكمون المفروض، تسجل زوال استقطاب الغشاء قبل مشبكى، وكما نعلم أن تسجيل زوال استقطاب الغشاء قبل مشبكى يعود لنشاط القنوات الفوليفية لشوارد<sup>2+</sup> وهذا يدل على عدم تأثير سبب الواقع المخربوطية على نشاط هذه القنوات وهذا يؤكد عدم صحة الفرضية 2 (سبب الواقع المخربوطية لشوارد<sup>2+</sup>).

بالنسبة للاحظ غياب التيارات الداخلية لشوارد<sup>2+</sup> على مستوى غشاء النهاية الخورية، حيث وجود سبب في عدم افتتاح القنوات الفوليفية لشوارد<sup>2+</sup>. تسجيل كمون راحة على مستوى الغشاء بعد مشبكى يدل على عدم افتتاح القنوات المبوبة كيميائياً في الغشاء بعد مشبكى بسبب عدم إطراح الأستيل كولين في الشق المشبكى، وهذا يؤكد صحة الفرضية 1 (سبب الواقع المخربوطية لشوارد<sup>2+</sup>).

#### الجزء الثالث خلاصة


يشتت سبب الواقع المخربوطية على مستوى القنوات المرتبطة بالقوليفية لشوارد الكالسيوم والمسئولة عن افتتاحها موجة زوال الاستقطاب ملدية إلى تدفق داخلي لشوارد الكالسيوم الذي يعبر إفراز المبلغ العصبي في الشق المشبكى. فيتعق عملها ومن ثم عدم افتتاحها وبالتالي عدم دخول الكالسيوم وعدم إفراز المبلغ العصبي فيحدث خلل في النقل المشبكى يسبب شدلاً لفريسة الواقع المخربوطية.

## المجال 02: تحولات طاقوية

تتوارد الطاقة في الطبيعة على عدة أشكال وتتحول من شكل لأخر باستمرار. تلتفط البكتيريات المختبر الطاقة الضوئية والتي مصدرها الشمس وتعوطها إلى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية التي ترتكب حلال عملية تسمى بالتركيب الضوئي. توصف الخلايا التي تقوم بهذه العملية بذاتيّة التغذية. عند حاجة الخلية للطاقة فإنما تفكك المواد العضوية وتتحرر الطاقة الكامنة فيها وتعطى إلى طاقة قابلة للاستعمال. يسمى هذا التحويل بالتنفس إذا حدث في وجود الأكسجين والتفسير إذا تم في غيابه.



مخطط المجال الثاني: التحولات الطاوية



رسم تخطيطي بين تغذية الخلية النباتية

تحدث عملية التركيب الضوئي أساساً على مستوى الأوراق، ويمكن أن تحدث كذلك في النبات والأعشاب بنسبة أقل.

**وحدة 01: تركيب الضوئي**

في تحليل المحتويين تغيرات شدة التركيب الضوئي وشدة امتصاص البخضور لأطيف الضوء بدلالة طول الموجة يتلخص فيما يلي:

يلاحظ أنه يوجد تطابق بين طيف الامتصاص وطيف النشاط (تناسب طردي)، بحيث كل منها كبير على مستوى الإشعاعات الطيفية (الأحمر والبنفسجي)، ضعيف على مستوى الإشعاعات الوسطية، وبكل بعد عن مستوى الإشعاع الأخضر.

إن، الإشعاعات الأكثر امتصاصاً من طرف البخضور هي الأكثر فعالية في عملية التركيب الضوئي.

### د. مقدمة التركيب الضوئي


**1-3. بنية الصانعة الخضراء**

هي عصبة ذات شكل بيضوي يحيط بما غشاها خارجي وداخلي، يشكل الغشاين معاً غلاف الصانعة.

تحتوي على سائل يسمى الحشوة أو ستروما. تحتوي الحشوة على صفائع حشوية تتوضع عليها كيسات (أنابيب) فوق بعضها وتشكل البذيرية أو الغرانا. تحتوي الحشوة كذلك على حبيبات نشوية، جزيئات ADN، ريبوزومات.

تتميز الصانعة الخضراء ببنية حجرية لأنها مقسمة إلى ثلاثة فضلات (حجيرات): المسافة بين الغشاين، التجويف الذي تمثله الحشوة وتجويف الكيسات.

تحتوي الصانعة على ثلاثة حجيرات يسمح بتوفير ثلاثة أوساط مختلفة من حيث التركيب الكيموجيمي ودرجة الحموضة (pH).



### 2-3. تركيب الصانعة الخضراء

#### أ- حشوة

تحتوي على مواد أيةضية وسبيطة لتركيب الجزيئات العضوية، مرفقات إنزيمية، وعدة إنزيمات أهمها الريبوالوز ثالثي الفوسفات كربوكسيلاز (Rubisco).

#### ب- كيس (تيلاكوايد)

يتركب غشاء الكيس (التيلاكوايد) من طبقة فوسفوليبيدية مضاعفة تحوي على نظامين ضوئيين PSI وPSII، خمسة نوافل للإلكترونات ( $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$ ,  $T'_1$ ,  $T'_2$ )، الإنزيم NADP ريدوكساز والإنسيم ATP ستار.

**السنة الخامسة**  
**علوم الطبيعة والحياة من الأدب إلى...**  
**2. شدة التركيب الضوئي** إما بكمية  $O_2$  المنطلق أو بكمية  $CO_2$  المتصاد.

مع مراعاة شدة التركيب الضوئي، يرى بالعين المجردة مزيج من سبعة أطيفات مخصوصة بين طول الموجة 400 نانومتر (الأخضر الذي يرى بالعين المجردة) وهي: البنفسجي، الأزرق، النيلي، الأخضر، البرتقالي، الأفiolet (البنفسجي) و 700 نانومتر (الأحمر) والأحمر.

### د. طيف الامتصاص وطيف النشاط

**1- طيف الامتصاص**  
هو منحنٍ تقوّي شدة امتصاص الضوء بدلالة طول الموجة.

**2- طيف النشاط**  
هو منحنٍ تقوّي شدة التركيب الضوئي بدلالة طول الموجة.

نماذج شدة التركيب الضوئي باستعمال جهاز طيف الضوئي.

للتوضيح، نماذج شدة التركيب الضوئي باستعمال جهاز طيف الضوئي  $EXAO$ ، حيث يعرض محلول من الصانعات الخضراء في كل مرة إحدى أطيف الضوء وبقياس امتصاص  $O_2$  أو طرح  $CO_2$ .


### الضوء، طول الموجة، الفوتون

. الضوء عبارة عن طاقة كهرومغناطيسية (إشعاع) تنتشر على شكل أمواج متتملة بسرعة كبيرة جداً.


. المسافة التي تفصل بين موجتين تسمى طول الموجة.

. يترك الضوء من عناصر دقيقة تحمل كمية من الطاقة تسمى الفوتونات.

عند وصول الإشعاعات من الشمس، يسمع الغلاف الجوي بمرور الضوء الأبيض المرئي فقط وبمعنى الإشعاعات المضر، بالكتلتين الحية مثل الأشعة تحت الحمراء (IR) والأشعة فوق البنفسجية (UV). هذه الإشعاعات تضر بالجزيئات العضوية مثل الأحماض النووي.



السلسلة الضوئية  
التركيب الكيموجيوي لكل من البلاكوبود والخشوة مختلف، وبالتالي لكل منها دور مختلف في عمل التركيب الضوئي.




رسم تخطيطي يمثل بنية البلاكوبود

الصاعات الخضراء المعرضة للضوء تحتوي على حبيبات الشفاء، وغير معرضة للضوء لا تحتوي.  
ونكشف عن الشفاء باستعمال الكاشف ماء اليود الذي يلوونه بالأزرق البنفسجي.

#### نظام ضوئي بنية النظم الضوئي

يوجد النظام الضوئي في غشاء الكيس، وهو معقد بروتيني يحتوي على عدد كبير من أسبعة الضوئي (البلاكوبود وأشباه الجزيئين). الجزء الأكبر منها يشكل أسبعة هولية، وزوج خاص من البلاكوبود يشكل مركز التفاعل.



أسبعة التركيب الضوئي  
رسم تخطيطي يوضح بنية النظم الضوئي


- #### ٤- مراحل التركيب الضوئي
- تم عملية التركيب الضوئي وفق مراحلتين:
- مرحلة كيموضوئية مقرها غشاء البلاكوبود، تشرط وجود الضوء وتحتها أكسدة الماء وطرح  $O_2$ .
  - مرحلة كيموجيويه مقرها الحشوة، لا تشرط الضوء وتحتها إرجاع  $CO_2$ .
- بالاعتماد على المبدأ "التركيب الكيموجيوي يحدد الوظيفة" يمكن تحديد مقر مرحلتي التركيب الضوئي في الصاعات الخضراء بحيث:
- المرحلة الكيموضوئية: يحتوي غشاء البلاكوبود على أنظمة ضوئية بما جزيئات البلاكوبود القادرة على امتصاص الفوتونات الضوئية. كما يحتوي على نوافل تنقل الإلكترونات خلال تفاعلات أكسدة، هذا دليل على أنه مقر تفاعلات أكسدة (مرحلة كيموضوئية).
  - المرحلة الكيموجيويه: يحتوي الحشوة على مواد الأيض الوسيطة لتركيب المواد العضوية: نوافل الفوتونات والـ  $ATP$  وعدد من الإزيمات كـ Rubisco، هذا دليل على أنها مقر تفاعلات إرجاع (مرحلة كيموجيويه).

١٢٣

**نوية تشير أن عملية التركيب الضوئي تتم في مرحلتين.**

#### تجربة التفلور تظير امتصاص اليختنور للفوتونات الضوئية.

نفرض وعاء زجاجي يحتوي على محلول البخضور الخام لضوء أحمر، عند مشاهدة الوعاء من الجانب بالعين المجردة، يظهر محلول بلون أحمر، يسمى هذا بظاهرة الاستئناع.



**النمير:** تُمتص جزيئية البخضور فوتونا ضوئياً، فينتقل الإلكترون أحد ذراتها من مداره الأصلي إلى مدار ذو مستوى طلقي أعلى، وتُصبح جزيئية البخضور في حالة تهجّج. بعد زمن قصير جداً، يعود الإلكترون تلقائياً إلى مداره الأصلي، يحرر الطاقة المكتسبة على شكل إشعاع أحمر وحرارة، وتُعود جزيئية البخضور إلى حالة الاستقرار.

**نَسْجَةٌ:** جَزِينَةُ الْبَخْصُورِ تَمَكَّنَتْ الْفَوْتُونَاتِ الصَّوْنَيَّةِ.

جهاز التنفس

$\text{CO}_2$

$\text{O}_2$

جهاز تنفس النبات

$\text{CO}_2$

$\text{O}_2$

جهاز التنفس

$\text{CO}_2$

$\text{O}_2$

جهاز تنفس النبات

جهاز التنفس

$\text{CO}_2$

$\text{O}_2$

جهاز التنفس

$\text{CO}_2$

$\text{O}_2$

جهاز التنفس

جهاز التنفس

**٤- تحرير و ملاحظة**  
 يتعين معن تصادمات الخصاء للضراء في شروط تحريرية مناسبة في غيب الـ (02) لتوحظ اطلاق  
 الـ (02) لفترة قصيرة ثم يتوقف.  
 عند وضع المعن الساق في الضلاد و امداده بالـ (02) لوحظ ثبيت الـ (02) و تركيب السكر لفترة قصيرة  
 عند وضع المعن في الضوء و الـ (02) يلاحظ اطلاق الـ (02) و ثبيت الـ (02) بصورة مستمرة  
 نتيجة تحدث عملية تركيب في مرحلتين، مرحلة أولى تشرط توفر الضوء و يتبعها اطلاق الـ (02) تسر  
 بمرحلة الكبوضوية و مرحلة مولية لا تشرط الضوء، يتم فيها ثبيت الـ (02) و تركيب السكر تس

#### ١-٤ مرحلة كيمو ضرورية

**تلخص هذه المرحلة في التفاعلات التالية:**

- أكسترا الأنظمة الضوئية.
  - أكسترا ضوئية للماء.
  - إرجاع مستقبل الإلكترونات.
  - فسفرة ضوئية.

١- أكسترا الأنظمة الضوئية

أ- أكسلة الأنظمة الصوتيّة

تستقبل صيغة هواية فوتونا ضوئياً فتهيج وينتقل إلكترون أحد ذراحتها من مدار داخلي (مدار أصلي) إلى مدار خارجي. يعود إلكترون إلى مداره الأصلي فتحرر منه الطاقة المكتسبة وينتقل إلى صيغة هواية مجاورة فتهيجها وهكذا... تصل الطاقة إلى صيغة مركز التفاعل فتهيج بدورها وتحرر إلكترونًا غنياً بالطاقة وينتقل إلى نظام الفحص.


- أصبعه هوائية ت نقط الفوتوسات الضوئية وتنقل طاقتها لأصبعه مركز التفاعل.
  - أصبعه مركز التفاعل تجمع فيها الطاقة الملتقطة من مختلف الجزيئات هوائية وتنأكسد غمرة الكربون في بالطاقة.

### السلسلة الضوئية

وحدة 01: تركيب ضوئي

#### تحليل المحتوى

- يمثل المحتوى الباقي تغيرات تركيز  $\text{H}_2\text{O}$  في الظلام وفي الضوء بوجود مستقبل الإلكترونات بدلاًة الزمن بالاتفاق.
- في الظلام: تركيز الأكسجين في الوسط ضعيف وثابت عند 220 ميكرومول/ل ويستمر الثبات في وجود الضوء.
- في وجود الضوء وإضافة 0.1 مل من المستقبل، يرتفع تركيز الأكسجين تدريجياً حتى يبلغ حوالي 270 ميكرومول/ل ثم يستقر.
- في وجود الضوء وإضافة 0.3 مل، يرتفع تركيز الأكسجين حتى يبلغ 360 ميكرومول/ل ثم يتثبت في الظلام.
- تستنتج أن شروط انطلاق  $\text{H}_2\text{O}$  توفر الضوء ومستقبل للاكترونات.



شرح آلية انتقال الإلكترونات في الأجزاء أ، ب، ج

الجزء أ (من  $\text{H}_2\text{O}$  إلى  $\text{H}_2\text{O}$ ): تحدث أكسدة ضوئية لجزيء الماء ويخرج عنه الإلكترونون يتلقى على  $\text{PSII}$  تلقائياً من كمون أكسدة وارجاع منخفض (0.8 فولط) إلى كمون أكسدة وارجاع مرتفع (1 فولط).

الجزء ب (من  $\text{PSII}$  إلى  $\text{PSI}$ ): يقتصر  $\text{PSII}$  الفوتونات الضوئية فيتغير كمون أكسدته وارجاعه من (1 فولط) إلى (-0.6 فولط) فيتأكسد ويحرر الإلكترونون يتلقائياً في توافق متزايدة كمون الأكسدة والإرجاع  $\text{T1}'$ ,  $\text{T2}$ ,  $\text{T3}$  وترجع  $\text{PSI}^+$  ذو كمون الأكسدة والإرجاع (0.6 فولط).



الجزء ج (من  $\text{PSI}$  إلى  $\text{NADP}^+$ ): يقتصر  $\text{PSI}$  الفوتونات الضوئية فيتغير كمون أكسدته وارجاعه من (0.6 فولط) إلى (-1 فولط) ويتأكسد محرراً الإلكترونون يتلقائياً حسب كمون أكسدة وارجاع متزايد في التلقائين  $\text{T1}'$ ,  $\text{T2}$ ,  $\text{T3}$ ، ويستقبلهما في الأخير  $\text{NADP}^+$  ذو كمون الأكسدة والإرجاع (-0.4 فولط).

ب الالك إلى الـ


### السلسلة الضوئية

ب- أكسدة ضوئية للماء  
بعد أكسدة الأنظمة الضوئية في وجود الضوء، يتأكسد الماء وفق المعادلة:  
 $\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}^+ + \frac{1}{2}\text{O}_2 + 2\text{e}$

جريدة الماء هي المصدر الأول للإلكترونات والـ  $\text{O}_2$  المنتظر.  
تنقل الإلكترونات الناجحة عن أكسدة الماء في السلسلة التركيبية الضوئية ويستقبلها في الأخير مستقبل الإلكترونات على الترتيب التالي:  
- مصير إلكترونات أكسدة الماء: ترجع النظام الضوئي الثاني  $\text{PSII}$  المؤكسد ضوئياً ليسترجع قابلية النسبي من جديد.




- مصير إلكترونات  $\text{PSI}$ : ترجع النظام الضوئي الأول المؤكسد ضوئياً، ليسترجع قابلية النسبي.  
 $2\text{P}_{680}^* \rightarrow 2\text{P}_{680} + 2\text{e}$



- مصير إلكترونات  $\text{PSI}$ : ترجع المستقبل الأخير للاكترونات  $\text{NADP}^+$ .  
 $2\text{P}_{700}^* \rightarrow 2\text{P}_{700} + 2\text{e}$   
 $\text{NADP}^+ + 2\text{e} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{NADPH}_2\text{H}^+$

ج- إرجاع مستقبل الإلكترونات  
في وجود الإلكترونات الناجحة عن أكسدة الماء وتتوفر البروتونات، يقوم الإنزيم  $\text{NADP}$  ريدوكتاز بإرجاع مستقبل الإلكترونات  $\text{NADP}^+$  في الحشوة وفق المعادلة:  
 $\text{NADP}^+ + 2\text{e} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{NADPH}_2\text{H}^+$

■ تجربة هيل تظهر شروط انطلاق  $\text{O}_2$  (عمل التيلاكوبود)  
تم تحضير معلق من التيلاكوبودات المعزولة في شروط تجريبية مختلفة (ضوء وظلام). حيث أضيف للوسط الكاشف فيروسيلون البوتاسيوم  $\text{K}_2\text{Fe}(\text{CN})_4$  بتركيز (0.1 مل) ثم (0.3 مل) الذي يقوم بدور مستقبل اصطدامي للاكترونات وذلك في فترة الإضاءة. لواحد بعد حقن فيروسيلون البوتاسيوم تغير لون محلول الوسط من بني سمر (حالة مؤكسدة) إلى أخضر (حالة مرجعة). نتائج التجربة المدعمة بالحاسوب مماثلة في الوثيقة التالية:



**السلسلة النهرية**

وحدة 01: تركيب ضوئي

(تساوي  $\text{pH}$ ) لا يحدث تركيب  $\text{ATP}$  بدل على أن الفارق في تركيز البروتونات بين الوسطين ضروري لتركيب  $\text{ATP}$ .

**المرحلة الثانية:** تركيز البروتونات الخارجي أكبر من الداخلي ( $\text{pH}$  الوسط الخارجي أقل من  $\text{pH}$  الوسط الداخلي) عند إضافة الحمض للوسط الخارجي لا يحدث تركيب  $\text{ATP}$  بدل ذلك على أن تدفع البروتونات من الوسط الخارجي إلى الوسط الداخلي للكيس لا يتركب  $\text{ATP}$ .

**المرحلة الثالثة:** تساوي تركيز البروتونات بين الوسطين نتيجة دخولها بظاهره العيز من الوسط الخارجي للوسط الداخلي وفي هذه المرحلة كذلك لا يتم تركيب  $\text{ATP}$ .


**المرحلة الرابعة:** إضافة  $\text{NaOH}$  للوسط الخارجي وخلق فارق في تركيز البروتونات بين الوسطين حيث تجروف الكيس حامضي والوسط الخارجي قاعدي مثل حالة الطبيعة في المرحلة الكيموضوئية يتم تشكيل  $\text{ATP}$  بدل على أنه من شروط تركيب  $\text{ATP}$  التفتقخارجي للبروتونات من تجروف الكيس إلى الوسط.

**المرحلة الخامسة:** عند توفير نفس شروط المرحلة الرابعة مع تجروف الكريات المذهبة لا يتم تركيب  $\text{ATP}$  بدل ذلك على أن سلامة الكربة المذهبة شرط من شروط تركيب  $\text{ATP}$ .

إذن يتطلب تركيب  $\text{ATP}$  فرقاً في تركيز البروتونات بين الوسطين الداخلي والخارجي للكيس بحيث يكون تركيزها الداخلي أكبر ( $\text{pH}$  الداخلي أقل) من الخارجي كما يتطلب توفر  $\text{ADP}$  و  $\text{Pi}$  وسلامة الكربة المذهبة. يسمح تجمع البروتونات داخل تجروف الكيس وانتقالها عبر الكربة المذهبة إلى الوسط وفق تدرج تركيزها بتركيب  $\text{ATP}$ .

### ملوك غشاء البلاكويود تجاه البروتونات

- نقل غشاء البلاكويود البروتونات في الاتجاهين:
- نقل عكس تدرج التركيز (من تركيز منخفض إلى تركيز مرتفع): نقل فعال يتطلب طاقة، ويتم عبر الناقل  $T_1$  من الحشوة إلى التجروف.
- نقل حسب تدرج التركيز (من تركيز مرتفع إلى تركيز منخفض): انتشار بسيط لا يتطلب طاقة، ويتم عبر الإنزيم  $\text{ATP}$  ستثار من التجروف إلى الحشوة.



تفاعلات المرحلة الكيموضوئية مرتبطة من أكسدة  $\text{H}_2\text{O}$  إلى إرجاع  $\text{NADP}^+$  وتركيب  $\text{ATP}$ ، وتوقف أي تفاعل منها يؤدي إلى توقف المرحلة. أي لا ينكسد  $\text{H}_2\text{O}$  ضوئياً إلا إذا تأكسد  $\text{PSII}$  إلا إذا تأكسد  $\text{PSI}$  قبله، ولا ينكسد  $\text{PSI}$  إلا إذا توفر مستقبل ولا ينكسد  $\text{PSII}$  إلا إذا توفر مستقبل الإلكترونات.

مثال: تثبيط أحد نوافل الإلكترونات بمادة كيميائية ي يؤدي إلى توقف المرحلة: توقف أكسدة  $\text{H}_2\text{O}$  الضوئية، توقف أكسدة  $\text{H}_2\text{O}$ ، توقف انطلاق  $\text{O}_2$ ، توقف إرجاع مستقبل الإلكترونات، توقف تركيب  $\text{ATP}$ ...

- طبعياً: مستقبل الإلكترونات هو  $\text{NADP}^+$ .
- تجربياً: تعرض  $\text{NADP}^+$  بمستقبل اصطناعي مثل فيروسياور البوتاسيوم،  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$  وبالتالي معادلة الإرجاع تختلف وتصبح:  $4\text{Fe}^{3+} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{Fe}^{2+}$ .
- $\text{NADP}^+$ : ينكونين أميد ثانوي نكليوتيد فوسفات، يسمى كذلك ناقل البروتونات أو مرفاق الإنزيم.
- نوافل الإلكترونات عبارة عن الجزيئات التالية: الناقل  $T_1$ : بلاستوكينون (PG)، الناقل  $T_2$ : ستيوكروم (Cyt bf)، الناقل  $T_3$ : بلاستوسيانين (PC).


### د- فسفرة ضوئية

يتأكسد الماء ضوئياً وتراكم البروتونات الناتجة في تجروف الكيس. وعندما يستقبل الناقل  $T_1$  الإلكترون أثناء انتقاله في سلسلة الأكسدة الإرجاعية، فإنه يستعمل طاقته لضم البروتونات كذلك من الحشوة إلى التجروف. يصبح تركيز البروتونات في التجروف أكبر من الحشوة فتنتشر عبر قنطرة في الإنزيم  $T_1$  لتعديل الفرق في التجروف. تسمم الطاقة المتحررة من خروج البروتونات بفسفرة  $\text{ADP}$  إلى  $\text{ATP}$  في وجود الفوسفات اللاعضوي ( $\text{Pi}$ ) وفق المعادلة:



### تجربة ياغندورف تأثير تركيب $\text{ATP}$ على مستوى الكيس

من أجل معرفة كيفية تشكيل  $\text{ATP}$  في مستوى الصناعات الخضراء تم عزل تيلاكوبات ببنية خاصة ثم خضعت لشروع تجريبية مختلفة (تجربة ياغندورف تعتمد على النظرية الكيموضوئية المبنية).



\* تبين كيفية تشكيل  $\text{ATP}$  اعتماداً على نتائج تجربة ياغندورف التجربة: تم وضع كيسات تيلاكوبات في الطلام وفي وسط ذو  $\text{pH}$  محدد يحتوي على  $\text{ADP}$  و  $\text{Pi}$  بحيث:

المرحلة الأولى: عندما يكون الوسطين الداخلي والخارجي للكيس متساوين من حيث تركيز البروتونات

الكلمة كيميوسوبية مركبة من كلمتين: كيميائية وضوئية.  
كيميائية: يتم فيها إنتاج طاقة كيميائية (خزنة في جزيئات  $\text{ATP}$ ).  
ضوئية: تتطلب وجود الضوء، أو يتم فيها اقتناص الطاقة الضوئية.

## 2-4 مرحلة كيميوسوبية

نسمى المرحلة الكيميوسوبية كذلك بحلقة كالفن ونسون أو مرحلة ثبيت الكربون.

هي سلسلة مغلقة من التفاعلات تحدث في الخضرة، يتم فيها ثبيت  $\text{CO}_2$  وتتركيب الغلوكوز باستعمال نواحى المرحلة الكيميوسوبية.

هذه المرحلة لا تشرط الضوء بشكل مباشر، ويمكن أن تحدث في الظلام إذا توفرت شروطها تحريرياً.

## 1- جزيئات أيبية متشكلة

بعد ثبيت  $\text{CO}_2$ ، يدمج في حمس (05) جزيئات أيبية ومبسطة (مركبات عضوية) على الترتيب التالي:

- المركب الأول: APG (مركب ثلاثي الكربون (د)).

- المركب الثاني: ADPG (مركب ثلاثي الكربون (د)).

- المركب الثالث: PGal (سكر ثلاثي الكربون (د)).

- المركب الرابع: غلوكوز (سكر سادسي HP).

- المركب الخامس: RuDip (مركب خماسي الكربون (د)).


يكشف عن ظهور هذه المركبات بتقنية التسجيل اللوني (الكرموتوغرافيا).

اللونية كالفن تظهر ثبيت  $\text{CO}_2$  ونوع وتسلسل الجزيئات الأيبية الوسطية المدمج فيها.

## خلال عملية التركيب الضوئي.



يستعمل تقنية خاصة تجمع بين التسجيل ذو البعدين والتصوير الإشعاعي الذاتي يتم التعرف على محتوى مستخلص الأشنة الذي يوضح ثبيت  $\text{CO}_2$  المشع ودمجه في مركبات عضوية وسطية مختلفة. النتائج موضحة في الوثيقة التالية:



اليف من استعمال  $\text{CO}_2$  المشع: تتبع مصير الكربون في خلايا الأشنة بعد ثبيت  $\text{CO}_2$ .

اليف من استقبال مستخلص الأشنة في ميثانول مغلي: قتل الخلايا وتوقف التفاعلات.

فتلة استعمال التسجيل الكرموتوغرافي ذو البعدين: فصل مكونات المستخلص.

أول مركب يظهر فيه الإشعاع بعد إدماج  $\text{CO}_2$ : الدـ APG.

يدل ظهور الإشعاع في مركبات أخرى إذا طالت التجربة: على تحول الدـ APG إلى مركبات أخرى.

مقرن تفاعلات المرحلة الكيميوسوبية (دمج الدـ  $\text{CO}_2$ ): الحضرة.

شروط دمج غاز الدـ  $\text{CO}_2$ : حدوث المرحلة الكيميوسوبية.

خلاصة التجربة: الترتيب الزمني للجزيئات المتشكلة في المرحلة الكيميوسوبية: APG ثم TP ثم R ثم HP حيث:

دـ سكر ثلاثي (تربيوز)، HP: سكر سادسي (هكسوز)، R (RudiP): ريبيلوز ثلاثي الفوسفات.

## كروماتوغرافيا (التسجيل اللوني)

نضع كمية من الخليط المراد فصل مكوناته على ورق خاص، ونضع الورق شاقولايا في وعاء يحتوي على مذيب عضوي. ينتقل المذيب في الورق بالخاصية الشعرية (بيتل)، وينقل معه عناصر الخليط بمسافات مختلفة عن البقعة الأصلية حسب وزنها الجزيئي.

نكشف عن المركبات المفصولة بطريقين: إما بمقارنتها (مقارنتها) بنتائج سابقة معلومة، أو نستعمل الكواشف اللونية.

مبدأ التقنية: هجرة مكونات الخليط حسب وزنها الجزيئي.


استعمال التقنية: تستعمل لفصل مكونات محلول (الخليل).

حدد الـ RuDP انطلاقاً من

نتيجة: يتراكب كل من الـ APG والـ RuDP من بعضهما البعض بشكل حلقي، ويُنطلب ذلك توفر الضوء (نواتج المرحلة الكيموحيوية) والـ CO<sub>2</sub>.



### جـ آلية المرحلة الكيموحيوية (حلقة كالفن)

- ثبيت الـ CO<sub>2</sub>: بواسطة الإنزيم Rubisco، يثبت الـ CO<sub>2</sub> على الـ RuDP ويتشكل مركب سداسي الكربون غير مستقر ينطوي إلى جزيئتين من الـ APG.
- نسخة الـ APG: فسفرة الـ APG إلى ADPG مع إمداده ATP.
- إرجاع الـ ADPG: إرجاع الـ ADPG إلى PGal مع أكسدة H<sup>+</sup>.
- تركيب الغلوكوز: يستخدم جزء من الـ PGal في تركيب الغلوكوز C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>.
- تحديد الـ RuDIP: يستخدم جزء آخر من الـ PGal في تحديد الـ RuDIP.



مخطط يمثل تفاعلات المرحلة الكيموحيوية

- في جزيئة الغلوكوز المنشكدة خلال حلقة كالفن، مصدر الكربون والأكسجين هو الـ CO<sub>2</sub>. ومصدر الميدروجين هو أكسدة الناقل NADPH.H<sup>+</sup>، والذي اكتسبها من أكسدة الـ H<sub>2</sub>O في المرحلة السابقة.



والـ APG ثابت.  
أيذ كمية الـ RuDIP.



### ٣- تجربة تظير مقر التنفس

**تجربة:** تضيف أخضر العالوين لمزرعة مهواة وتحتوي على حميرة الخنزير والذكور.  
**أخضر العالوين:** كائنة حيواني، يمكن لون محلوله شفافاً في الحالة المرحة وأخضر عندما يشك.  
**ملاحظة:** تتلون الميتوكوندري في خلايا خميرة الخنزير بلون الأخضر.  
**نتيجة:** الميتوكوندري مقر الأكسدة التنفسية.

#### ٢-١- تركيب الميتوكوندري


تركيب الكيموجلوبين للميتوكوندري متباين حيث يتركب العشاء الداخلي من كمية قليلة من الدهن (20%) وكمية كبيرة من البروتينات (80%) تمثل في نوافل الإنكرونات ( $T_1$  و  $T_2$ ). نوافل الإنكرونات والبروتينات ( $T_1$ ,  $T_2$ ,  $T_3$  و  $T_4$ ). كما يحتوي على الإنزيم ATP سينتاز (إنزيم مركب الطاقة).  
 يحتوي الماء الأساسية على الإزيمات نازعات الأكسجين  $\text{CO}_2$  ونازعات الأكسجين، إنزيمات الإنزيم (عوامل المساعدة)  $\text{NAD}^+$  و  $\text{FAD}$  والـATP.  
 إذن لكل من العشاء الداخلي للميتوكوندري والماء الأساسية وظيفة مختلفة (نوعية) في عملية التنفس.  
 أما العشاء الخارجي فتركيبة مماثلة للعشاء الهيبولي حيث يحتوي على بروتينات دسم بحسب مائة (50%). وليس له دور في عملية التنفس.

#### ٢-٢- مرادفات التنفس

يتم تفكيك مادة الأيض أثناء التنفس الخلوي (الأكسدة الخلوية) في مراحلتين:

- مرحلة أولى على مستوى الهيبولي أين يتم تفكك الغلوكوز إلى حمض اللبنيك.
- مرحلة مواتية على مستوى الميتوكوندري يتم فيها استمرار تفكك حمض اللبنيك.

### ٣- تجربة تظير مادة الأيض المستعملة من طرف الميتوكوندري.



لفرض التعرف على مادة الأيض المستعملة من طرف الميتوكوندري تم عزل الميتوكوندري من خلايا كبد الجرذ بالاستعمال تقنية الطرد المركزي فائق السرعة، تم وضع الميتوكوندري المعزولة في وعاء المقاول الحيوي المغلق بإحكام والمحتوى على محلول منظم. تم قياس كمية الأكسجين داخل الوعاء عن طريق لاقط الأكسجين ضمن إضافة ماء أيض مختلف عن الأزمهن  $\text{Z}_1 = 1$  دقيقة و  $\text{Z}_2 = 2$  دقيقة. نتائج التجربة موجودة في الرسم التالى:

### الوحدة ٠٢: تنفس وتدمير

التنفس والتدمير ظواهر جوية تهدفان إلى تحويل الطاقة الكيميائية للمغذيات إلى طاقة داخلية قابلة للاستعمال من طرف الخلية (ATP).  
 التفس ظاهرة يتم خلالها هدم كلية مادة الأيض في الخلية، وتحويل للطاقة الكيميائية الكامنة في مادة الأيض إلى طاقة قابلة للاستعمال وحرارة.

تشرط عملية التفس توفير المليوكوز (كربوهيدرات)، الماء، وارتفاعات تفسية.  
 مظاهر التفس هي امتصاص  $\text{O}_2$ ، طرح  $\text{CO}_2$ ، هدم مادة الأيض وتحويل طاقة على شكل ATP.  
 التدمير هو هدم جزئي مادة الأيض، يتم خلاله تحويل جزئي للطاقة المخزنة في مادة الأيض إلى طاقة قابلة للاستعمال ضبطها وحرارة.


إلى جانب العناصر المعدنية (الماء والـ  $\text{CO}_2$ ) يفتح عن التدمير مواد عضوية تحتوي على طاقة.  
 التركيب الضوئي غير الخلايا البانية البكتيرية فقط، أما التفس فتشترك فيه الخلايا البانية والحيوانية.

#### ١- التنفس

##### ١-١- مقر التنفس

تحدث عملية التفس في الميتوكوندري، العضية الطاقوية في الخلية.

١-٢- بنية الميتوكوندري  
 تأخذ الميتوكوندري شكلًا متطاولاً، يحيط بها غلاف مكون من غشائين، عشاء خارجي وعشاء داخلي. تفصل بينهما فوضوة بين الغشائين، يحيط العشاء الداخلي بمادة أساسية تسمى المادة الأساسية (ماتريس) وتحدد منه انتشارات عمودية على المور الكبير للعضية باسم الماتريس تسمى بالأغوار.  
 تتميز الميتوكوندري ببنية حجرية لأن بيتهما مقسمة إلى تجويفين يتمثلان في الفرق بين الغشائين والفراء الذي يحتوي المادة الأساسية.



٤- تحليل الملح


ـ أصوات الغلوكوز ينبع ثبات تركيز  $\text{O}_2$ ، وعند إضافة حمض البيروفيك يتلاقص تركيز  $\text{O}_2$  في

الوسط.

ـ ينتج عن هذه الأيض المستعملة من طرف المتكوتوري هي حمض البيروفيك.

## ١- تحلل سكري

ـ تفكك جزيء الغلوكوز على مستوى الهيولى إلى حبيبي حمض البيروفيك وفق المعادلة التالية:



غلوكوز



ـ مخطط يمثل آلية التحلل السكري

## حصيلة التحلل السكري:

ـ انطلاقاً من جزءة غلوكوز واحدة تنتجه جزيئين من حمض البيروفيك،  $2 \text{ATP}, 2 \text{NADH},\text{H}^+$

## ٢- تفكك حمض البيروفيك (أكسدة خلوية)

ـ يتم هدم حمض البيروفيك الناتج عن التحلل السكري في المادة الأساسية للميتوكوندري.

ـ خطوة تحضيرية لحلقة كربوس

ـ يتم فيها تحويل حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق الإنزيم A بواسطة معقد إنزيمي يقوم بنزع الميدروجين

وال( $\text{CO}_2$ ) وفق المعادلة التالية:



## ب- حلقة كربوس

ـ يتم على مستوى المادة الأساسية للميتوكوندري هدم تدرسيجي وتم للأستيل مرافق الإنزيم A وفق تفاعلات

ـ الأكسدة والإرجاع.

ـ يتحدد الأستيل مرافق الإنزيم A مع مركب رباعي الكربون ليشكلا مركبا سداسي الكربون. تطأ على هنا

ـ الآخر سلسلة من التفاعلات ينزع خلالها جزيئين من  $\text{CO}_2$  تحت تأثير إنزيمات نازعات الكربون، وتوجه

ـ الميدروجين الممتثلة في  $\text{NADH},\text{H}^+$  و  $\text{FADH}_2$  إلى  $\text{NAD}^+$  و  $\text{FAD}$  إلى  $\text{FADH}_2$  و  $\text{NADH},\text{H}^+$  (3) جزيئات  $\text{NADH},\text{H}^+$  وجزيء واحدة


ـ في الأخير يتم تحديد المركب رباعي الكربون.

ـ ATP لتشكيل جزيء ADP لتشكل جزيء


## سلسلة الأيض

### ـ ١- الخطوة التحضيرية


#### ـ ١-١- معادلة حلقة كربوس:



ـ معادلة الخطوة التحضيرية وحلقة كربوس:



ـ حمض البيروفيك





### ـ ١-٢- مخطط يمثل تفاعلات الخطوة التحضيرية وحلقة كربوس

- نوع التفاعل الذي يتم فيه تحرير  $\text{CO}_2$  وارجاع مرافق الإنزيم، مثل تفاعل الخطوة التحضيرية،

ـ يسمى: نوع كربوكسيلي تأكسدي.

- تسمى  $\text{NAD}^+$  و  $\text{FAD}$  بـ ناقل البروتونات والإلكترونات، وكذلك المرافق الإنزيمية.

- آلية الفسفرة التأكسدية
- تاكسد المركبات الأنيزيمية ( $NADH, H^+$  و  $FADH_2, H^+$ ) وتعطى الإلكترونات للسلسلة التغذية. تنتقل هذه الإلكترونات في التوافق ( $T_1, T_2, T_3, T_4, T_5$ ) تلقائياً حسب كمون أكسدة وإرجاع متزايد.
- ينتقل  $O_2$  الإلكترونات فيتوxy مع البروتونات الموجودة في المادة الأساسية لتشكيل الماء وفق المعادلة:
- انتقال الإلكترون عبر التوافق ( $T_1, T_2, T_3, T_5$ ) تحرر منه طاقة كافية لاضع البروتونات من المادة الأساسية نحو الغرغاء بين الغشاءين عكس تدرج التركيز، فيتوxy تدرج الكترون كيميائي للبروتونات.
- تنتقل البروتونات المتراكمة في الغرغاء بين الغشاءين إلى المادة الأساسية عبر الكربنة المذابة حسب تدرج التركيز (بظاهره الانتشار). تسمح الطاقة المنحرفة من تدفق البروتونات بفسرة الـ  $ATP$  إلى  $ADP$  في وجود الفوسفات اللاعضوي ( $Pi$ ) في مستوى الكربنة المذابة ( $ATP$  ستاز).
- المعادلة التي تلخص المرحلة كالتالي:



- خلال الفسفرة التأكسدية**
- المعلقي الأول للإلكترونات هو التوافق  $FADH_2, H^+$  و  $NADH, H^+$ .
  - المستقبل الأخير للإلكترونات:  $O_2$ .
  - آلية انتقال الإلكترونات: تنتقل تلقائياً حسب كمون أكسدة وإرجاع متزايد.
  - عند تحرير الغشاء الداخلي للميتوكوندري، الأجزاء الناتجة تتحوصل تلقائياً وتشكل حويصلات بحيث يكون الجزء F1 للإنزيم ATP ستاز في الخارج، عكس ما كان في الصانعة الخضراء (في الداخل). تستعمل هذه الحويصلات في تجسس لتحديد شروط ترسيب  $ATP$ .

- نسي حفقة كرييس نسبة لمكتشفها العام الألماني هانس أدولف كرييس، سعادتها في البداية حلقة لأبحاث الكربوكسيلية، وحيث بعد ذلك بايعه تكريماً له. حصل على جائزة نوبل في الكيميولوجيا وأصبه سنة 1953.

- ينبع مرفق الآنزيم من أكسدة أحاط أمينة وأحماض دمجة في المادة الأساسية للميتوكوندري.

- يمكن للحلقة أن تحصل على الطاقة (ATP) من أكسدة الدسم كذلك في المادة الأساسية للميتوكوندري.

- يمكن للحلقة أن تختلف عن حلقة كرييس.


الحصولة الأولى للخطوة التحضيرية وحلقة كرييس

يُنبع عن تفكك جزيئية واحدة من حمض البيروفيك:  $3CO_2 + 4NADH, H^+ + FADH_2 + ATP$

ج- فسفرة تأكسدية  
هي أكسدة التوافق المرجعة ( $NADH, H^+$  و  $FADH_2$ ) وانتقال الإلكترونات الناتجة عن طريق السلسلة التغذية إلى  $ADP$  مع ترسيب الطاقة بفسرة الـ  $ADP$  إلى  $ATP$ . ويتم ذلك على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري.

### تجربة تظهر سلوك الغشاء الداخلي للميتوكوندري تجاه البروتونات

تم قياس pH الوسط الخارجي لمعلى من الميتوكوندري المعزولة يحتوي على معطر الإلكترونات ( $TH, H^+$ ). يكون الوسط خالياً من الأكسجين في بداية التجربة، ثم يتم حقن جرعتان من الأكسجين أو مادة ثانية تتروفينول (DNP) عند أزمنة مختلفة، النتائج موضحة في المختبر التالي.



### تفسير نتائج التجربة

بعد المختبر البصري تغير درجة pH الوسط الخارجي لمعلى من الميتوكوندريات المعزولة يحتوي على معطر الكربونات ( $TH, H^+$ ) والوسط خالٍ من الأكسجين حيث نلاحظ:

قبل حقن الأكسجين pH الوسط يساوي 7 (معدل)، وبعد حقن الأكسجين نلاحظ تزايد حموضة الوسط بشكل متدر وسريع ( $pH = 1$ )، نظر ذلك بزيادة ترسيب البروتونات في الوسط الناتجة عن أكسدة ( $TH, H^+$ ) داخل الميتوكوندري في وجود  $O_2$  وخروجه بسرعة للوسط.

بعبر الزمن فترتفع pH الوسط تدريجياً إلى أن تعدل ونشر ذلك بالدخول التدريجي للبروتونات عبر الكربونات إلى المادة الأساسية للميتوكوندري، في وجود DNP يرتفع pH بسرعة ونشر ذلك بأن هذه المادة تسرع نفاذية البروتونات عبر الغشاء الداخلي للميتوكوندري.

- شروط ترسيب ATP ثلاثة (03): وجود وسلامة الكربنة المذابة، وجود تدرج في تركيز البروتينات،  $ADP + P_i$ .
- شروط عمل الإنزيم ATP ستار الثان (02): تدرج في تركيز البروتينات، توفر الإنزيم  $ADP + P_i$ .
- شرط ضروري لحدوث التفس، يتدخل في المرحلة الأخيرة فقط (الفسرة الناكسدية) حين ينفث بدور مستقبل الإلكترونات.

علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

.ADP + Pi

- في السلسلة النفسية، التوافق (I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>) عبارة عن بروتينات ترتبط بما أجزاء غير بروتينية: هيدروجين، ذرة حذايد... وهو ما يعكسها خاصية الأكسدة والإرجاع.
- التوافق I<sub>2</sub> وI<sub>3</sub> لا تنسخ البروتينات لأن النقال الإلكتروني عبرها لا يتحرر عنه طاقة كافية لدفع البروتينات.

- توجد مواد كيميائية تقطع عمل التوافق (I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub>, I<sub>3</sub>, I<sub>4</sub>) وتوقف النقال الإلكتروني. هذه المواد سامة بالنسبة للعصوية لأنها توقف السلسلة النفسية، ومن الأمثلة عنها:



- روتيون (Rotenone) (شبيه التوافق I<sub>1</sub>).  
- أنتيميسين A (Antimycin A) المشبطة للنقال I<sub>2</sub>.  
- سيانير (Cyanure): تقطع التوافق I<sub>3</sub>.

- الإنزيم ATP ستار (الكربنة المذابة) في غشاء البلاکوید وفي الغشاء الداخلي للميٹکوئندری متمثال، يوجد اختلاف قليل.  
- الإنزيم ATP ستار يركب حوالي 400 ATP في الثانية.

### 3-2. العلاقة بين مراحل التنفس

مراحل التنفس مسلسلة ومرتبطة بحيث توقف أحدها يؤدي إلى توقف العملية:  
التحلل السكري: يفتح عنه حضر البروفيت الذي يدخل في تفاعلات حلقة كربليس، ويُفتح النقال NADH,H<sup>+</sup> الذي يدخل في تفاعلات الفسفة الناكسدية.  
حلقة كربليس: يتضمنها إرجاع الماء لإنزيم FADH<sub>2</sub> NADH,H<sup>+</sup> FADH<sub>2</sub> اللازمة لحدث الفسفة الناكسدية.  
الفسفة الناكسدية: يتم فيها تجديد التوافق NAD<sup>+</sup> FAD<sup>+</sup> اللازمة لاستمرار التحلل السكري وحلقة كربليس.

فتشاً عن غياب O<sub>2</sub> المستقبل الأخير للإلكترونات، يفتح عنه توقف أكسدة التوافق المرجعية NADH,H<sup>+</sup> FAD<sup>+</sup>، فتوقف السلسلة النفسية ولا يتجدد NAD<sup>+</sup> FAD<sup>+</sup>. وعدم تجدد التوافق المؤكسدة NAD<sup>+</sup> ي يؤدي إلى توقف حلقة كربليس.



### ٣. مقارنة بين الفسفرة التأكسدية والفسفرة الضوئية

أوجه المقارنة	فسفرة ضوئية	فسفرة تأكسدية	النهاية
- سلسلة من تفاعلات الأكسدة والإرجاع.			
- ينتقل الإلكترون في سلسلة نوافل ذات كمون أكسدة وارجاع متزايد.			
- يقع تدرج إلكتروني كيميائي للبروتونات $H^+$ على جانبي الغشاء، أنا، انتقال الإلكترونات.			
- فسفرة ADP إلى ATP على مستوى الإنزيم ATP مستتر في وجود Pi.			
اختلاف	غشاء البلاكرويد في الصانعة الحضراء	الغشاء الداخلي للميتوكوندري	مفر
نوافل الإلكترونات	السلسلة التركيبية الضوئية: $T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6$	السلسلة التركيبية الضوئية: $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$	
معطى الإلكترونات والبروتونات	NADH <sub>2</sub> H <sup>+</sup> و FADH <sub>2</sub>	النواقل المرجحة	
مضخة البروتونات	T <sub>2</sub>	النواقل $T_1, T_3$	
مستقبل آخر لإلكترونات والبروتونات	NADP <sup>+</sup>	ثاني الأكسجين $O_2$	
تحويل الطاقة	تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة قابلة للاستعمال ATP وطاقة كامنة في NADPH <sub>2</sub> H <sup>+</sup>	تحويل الطاقة الكامنة في FADH <sub>2</sub> NADH <sub>2</sub> H <sup>+</sup> إلى طاقة قابلة للاستعمال ATP	

### ٤. حصيلة طاقوية للتنفس

$$\begin{aligned}
 & \text{يت喪 عن أكسدة جزيء واحدة من } NADH_2H^+ \text{ خلال الفسفرة التأكسدية ثلاثة جزيئات من ATP.} \\
 & \text{ويت喪 عن أكسدة جزيء واحدة من } FADH_2 \text{ ثلاثة جزيئات من ATP.} \\
 & \text{تحلل سكري:} \\
 & \quad \text{حصيلة أولية:} \\
 & \quad \text{يت喪 عنها:} \\
 & \quad \text{خطوة تحضيرية وحلقة كربوس:} \\
 & \quad \text{حصيلة أولية:} \\
 & \quad \text{يت喪 عنها:} \\
 & \quad \text{حصيلة طاقوية إجمالية:} \\
 & \quad 2 NADH_2H^+ + 2 ATP \\
 & \quad 2 \times (3 ATP) + 2 ATP = 8 ATP \\
 & \quad 8 NADH_2H^+ + 2 FADH_2 + 2 ATP \\
 & \quad 8 \times (3 ATP) + 2 \times (2 ATP) + 2 ATP = 30 ATP \\
 & \quad 38 ATP
 \end{aligned}$$

### السلة النفعية

### ١١- التخمر كدولت

في الشروط اللاهوائية يحدث لجزيئات حمض البيروفيك تخمر كحولي (في حالة الخمائر).

#### ـ آلية التخمر

يشترك عملية التخمر مع عملية التنفس في التحلل السكري.

#### ـ تجربة تظهر اشتراك التخمر مع عملية التنفس في التحلل السكري.

نحضر مزرتين من خبرة الخبز في إناءين مختلفين يحتوي كل منهما على سكر الغلوكوز المشع ( $G^*$ ). نسق الإناء الأول بالحكم (وسط لا هوائي) ونقوم بتجربة الإناء الثاني باستمار (وسط هوائي). يتم شعور الإشعاع داخل خلايا الخبرة (الهيولى أو الميتوكوندري) بعد فترات زمنية مختلفة، نتيجة الوسط الهوائي موضحة في الجدول (أ) ونتيجة الوسط اللاهوائي موضحة في الجدول (ب).

الهيولى	الميتوكوندري	الوسط	الميتوكوندري	الزمن	الهيولى
$G^*$	$G^*$	زه	$G^*$	زه	$G^*$
$G^*$	$G^*$	زه	$G^*$	زه	$G^*$
P*		زه	P*	P*	زه
$A_1^* + P^*$		زه	$A_1^* + P^*$		زه
$A_2^*$		زه	$A_3^*$		$*CO_2$

$G^*$ : غلوكوز، P\*: حمض البيروفيك،  $A_1^*$  و  $A_2^*$  و  $A_3^*$ : نواتج مشتقة من حمض البيروفيك  
الجدول (أ): وسط هوائي  
الجدول (ب): وسط لا هوائي

#### ـ تحليل مقارن للنتائج

في كل من الوسطين الهوائي واللاهوائي

- في زه: يتواجد الغلوكوز في الوسط.

- في زه: ينفذ الغلوكوز إلى هيولى الخلية.

- في زه: يتم هدم الغلوكوز إلى حمض البيروفيك في الهيولى.

بعد ذلك يحدث في الوسط الهوائي:

- في زه: ينفذ حمض البيروفيك إلى الميتوكوندري ويتحول إلى المركب  $A_1$  فيها.

- في زه: في الميتوكوندري دائمًا، يتأكد المركب  $A_1$  معطياً المركب  $A_2$  و  $CO_2$  بطرح في الوسط.

بينما في الوسط اللاهوائي فيحدث:

- في زه: يتتحول حمض البيروفيك إلى المركب  $A_2$  في الهيولى.

- في زه: يتتحول المركب  $A_2$  إلى  $O_2$  في الهيولى كذلك وبطرح في الوسط.

نستنتج أن الغلوكوز يتحلل إلى حمض البيروفيك في الهيولى في وجود أوكسجين  $O_2$ . ثم يتأكد في

الميتوكوندري في وجود  $O_2$ ، ويتحلل في الهيولى في غيابه.


### III- مقارنة بين التنفس والتلخمر الكحولي

تلخمر كحولي	تنفس	وسط
لاهواي (غياب $O_2$ )	هوائي (وجود $O_2$ )	وسط
ميتوكوندريات قليلة وضامة (ألاخا غير وظيفية)	ميتوكوندريات عديدة ونامية (ألاخا نشطة)	تعضي خلوي
هيولى (خلال سكري + تلخمر)	ميتوكوندري (أكسدة الخلوية + فسفرة تأكسدية)	متر
جزئي: تحرير جزئي للطاقة الكامنة في جزيئة الغلوكوز، وبقى جزء من الطاقة مخزن في جزيئات الإيثanol العضوية قليلة (2 ATP لكل جزيئ غلوكوز)	كلي: تحرير كلي للطاقة الكامنة في جزيئة الغلوكوز، فالـ $CO_2$ الناتج معdeni ولا يحتوي على طاقة	عدم مادة الأيض
$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3CH_2OH + 2CO_2 + 2ATP$	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 28ATP$	نواتج (نطاح في الوسط)
حيثيل	كثير	مردود (كمية المادة العضوية المنتجة - نسبة الشكائر)
		معادلة ايجالية


يتم التلخمر الكحولي في تفاعلين:

- تزع  $CO_2$  من حمض البيروفيك ليصبح أسيتالدهيد (مركب C<sub>2</sub>).

- إرجاع الأسيتالدهيد إلى إيثانول مع أكسدة (تجدد) ناقل  $NADH.H^+$  لاستمرار العملية. فاستمرار التحلل السكري وبالتالي تركيب ATP يتوقف على تجديد نوافل الميدروجين في حالتها المؤكسدة ( $NAD^+$ ). وفق المعادلة التالية:



#### 2. حصيلة التلخمر



مخطط يمثل آلية التلخمر الكحولي

#### حصيلة أولية

بالإضافة لنواتج التحلل السكري (جزيئين من حمض البيروفيك، 2ATP و  $2NADH.H^+$ ) ينتج عن التلخمر الكحولي جزيئين من الإيثانول، وبالتالي الحصيلة الإجمالية هي: جزيئين من الإيثانول،  $2ATP$  و  $2NADH.H^+$ .

#### حصيلة طاقوية

هي الحصيلة الطاقوية للتحلل السكري فقط لأن التلخمر لا ينتج عنه طاقة وهي **2 ATP**.

الوحدة 03: دوصلة التحولات الطاقوية

التدوّلات الطاقوية



يحتاج الكائنات الحية إلى إمداد مستمر من المواد ومن الطاقة لأداء مختلف الوظائف الحيوية والمحافظة على حياتها. تتكون الكائنات العليا (نباتية أو حيوانية) من خلايا مقسمة إلى حجيجات مختلفة (هيلوي، بوكوندري، صانعة حضراء) تحدث فيها تحولات المادة والطاقة تختلف حسب نوع الخلية وشروط نموها.

١-١- خلية نباتية

في الخلايا البينية اليحضرورية أثناء النهار تقوم الخلية بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة بصورة جزيئات عضوية أثناء عملية التركيب الضوئي التي تتم في الصانعة الحضراء. كما تقوم كذلك بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للإستعمال في صورة جزيئات ATP خلال عملية التنفس الخلوي التي تتم في الميتوكوندري. أثناء الليل توقف عملية التركيب الضوئي وتتحصل الخلية البينية على ياقتها من عملية التنفس الخلوي.

## 2-1- خلية غير يخضورية

متناز الخلايا غير المخصوصة (حيوانية، فطريات، بكتيريا...) يقدّرها على تحويل الطاقة الكيميائية المكاملة في الجزيئات العضوية (سكريات، دسم، بروتينات) إلى طاقة قابلة للإستعمال خلال عملية التنفس الخلوي في الظروف المواتية. بعض أنواع الخلايا تستطيع إنتاج الطاقة القابلة للإستعمال دون استعمال الأكسجين عن طريق آلية أخرى تعرف بالتخمر.



خلال عملية التنفس، تُخدم الريكيزة العضوية كلياً، تحرر منها كل الطاقة الكيميائية الكامنة على شكل طاقة قابلة للاستعمال (ATP).


خلال عملية التحمر، تخدم الكريبت العضوية جزئياً، يحرر جزء من الطاقة الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال ATP، ويبقى جزء آخر من الطاقة كامن ويعزز في الجزيئ العضوية الناتجة (الكحول).

## ١٠- جزء التمارين

### تمارين عن التمرين الأول

#### كم التمرين 01

تحتاج الخلية الحية إلى إمداد مستمر من المادة والطاقة لأداء مختلف وظائفها وأدفأتها على حيويتها.  
لدراسة تحولات المادة والطاقة للخلية نقترح الوثيقة التالية:



- سم العضيتيين (س، ص)، صنف الخليتين (أ) و(ب) حسب نمط التغذية.
- مستغلًا الوثيقة، استخرج ما يحدث في الخلية (أ) وعلاقته بما يحدث في الخلية (ب) من حيث التحولات الطاقوية مدعًما إجابتك بمعادلات كيميائية إجمالية.
- تستعمل الخلايا الحية جزيئات ATP للقيام بوظائفها المختلفة، من خلال ما تقدم ومعلوماتك اكتب نصا علميا توضح فيه ترافق تحولات المادة والطاقة عند الخلية (ب) مبرزا أهم النشاطات التي تستهلك فيها الطاقة.

### الإجابة النموذجية

#### ١- العضيتيين وتصنيفهمما

- العضية س: ميتوكوندري

- العضية ص: صانعة خضراء.


#### التصنيف

- الخلية (أ): ذاتية التغذية.

- الخلية (ب): غير ذاتية التغذية.

#### ٢- العلاقة

في الخلية (أ) يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية، وذلك على مستوى الصانعة الخضراء بعملية التركيب الضوئي حسب المعادلة:



تستعمل الخلايا الحية جزيئات ATP في أداء الوظائف المختلفة منها:  
الحركة: حيث تصرف جزء من الطاقة لأنواع مختلفة من الحركة مثل تقلص العضلات وحركة الأسواط وحركة الصبغيات وغيرها...


البناء: تحتاج الخلايا الحية لبناء العديد من المركبات الكبيرة انطلاقاً من جزيئات بسيطة وتصرف لذلك طاقة لتكوين الروابط الجديدة مثل بناء البروتين وبناء السكريات الثنائية والمتمدة وغيرها.

التقل الفعال: تحتاج الخلايا الحية إلى الحفاظ على فرق في تركيز العديد من الأيونات والماء عبر الغشاء وهذا الغرض تصرف الطاقة لنقل المواد عكس تدرج التركيز مثل ما يحدث في أغشية الألياف العصبية للمساندة على ظاهرة الاستقطاب (كمون الراحة).

احفاظه على الحرارة: تحتاج الخلايا والكائنات الحية للمحافظة على درجة حرارة ثابتة ضرورية لعمل الإنزيمات والتفاعلات المختلفة وهذا تصرف طاقة لغرض إنتاج الحرارة إذا كان الوسط بارداً أو تصرف طاقة للتبريد إذا كان الوسط حاراً.

لا يمكن للحياة أن تستمر دون الإمداد المستمر من الطاقة وقدرة على تحويل الطاقة من صورة لأخرى بشكل مستمر.

### رسم جزيئه ATP



الأدينوزين ثلاثي الفوسفات ATP

تكون جزيئه ATP من سكر حمضي هو الريبوz يرتبط على مستوى OH الغليكوزيدي قاعدة الأدينين وعلى مستوى OH ذرة الكربون رقم 5 ثلاثة مجموعات فوسفاتية مرتبطة فيما بينها بروابط ثنائية الأستر غنية بالطاقة.

**السلسلة الفرعية**  
2- استعمال الطاقة


تستعمل الخلايا الحية جزيئات ATP في أداء الوظائف المختلفة أهمها:  
الحركة: حيث تصرف جزءاً من الطاقة لأنواع مختلفة من الحركة مثل تقلص العضلات وحركة الأنسجة  
وحركة الصبغيات وغيرها...

البناء: تحتاج الخلايا الحية لبناء العديد من المركبات الكبيرة انطلاقاً من جزيئات بسيطة وتصرف لذلك طاقة لتكوين الروابط الجديدة مثل بناء البروتين وبناء السكريات الثنائية والمتعددة وغيرها.

النقل الفعال: تحتاج الخلايا الحية إلى الحفاظ على فرق في تركيز العديد من الأيونات والماء عبر الغشاء، وهذا الفرض تصرف الطاقة لنقل الماء عكس تدرج التركيز مثل ما يحدث في أغشية الألياف العصبية للحفاظ على ظاهرة الاستقطاب (كونون الراحة).

الاحفاظ على الحرارة: تحتاج الخلايا والكائنات الحية للحفاظ على درجة حرارة ثابتة ضرورية لعمل الإنزيمات والتفاعلات المختلفة وهذا تصرف طاقة لعرض إنتاج الحرارة إذا كان الوسط بارداً أو تصرف طاقة للتبريد إذا كان الوسط حاراً.

لا يمكن للحياة أن تستمر دون الإمداد المستمر من الطاقة والقدرة على تحويل الطاقة من صورة لأخرى بشكل مستمر.



- سم العضيتيين (س، ص)، صنف الخلتين (أ) و(ب) حسب نمط التغذية.
- مستغلًا الوثيقة، استخرج ما يحدث في الخلية (أ) وعلاقته بما يحدث في الخلية (ب) من حيث التحولات الطاقوية مدعماً إجابتك بمعادلات كيميائية إجمالية.
- تستعمل الخلايا الحية جزيئات ATP للقيام بوظائفها المختلفة من خلال ما تقدم ومعلوماتك أكتب نصاً علمياً توضح فيه تراffic تحولات المادة والطاقة عند الخلية (ب) مبرزاً أهم النشاطات التي تستهلك فيها الطاقة.

### الإجابة النموذجية

#### 1- العضيتيين وتصنيفهم

- العضية س: ميتوكوندري

- العضية ص: صانعة خضراء.


#### التصنيف

- الخلية (أ): ذاتية التغذية.


- الخلية (ب): غير ذاتية التغذية.

#### 2- العلاقة

في الخلية (أ) يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية، وذلك على مستوى الصانعة الخضراء بعملية التركيب الضوئي حسب المعادلة:



### رسم جزيئية ATP




الأدينوزين ثلاثي الفوسفات ATP

تتكون جزيئية ATP من سكر خماسي هو الريبيوز يرتبط على مستوى الأدينين وعلى مستوى OH ذرة الكربون رقم 5 ثلاث جموعات فوسفاتية مرتبطة فيما بينها بروابط ثنائية الأستر غنية بالطاقة.

## كـ التمرين 02

تحتاج الخلايا الحية إلى طاقة باستمرار ل القيام بنشاطاتها المختلفة. ثالث الوئمة الموجة التحولات الطاقوية ضمن خلية بخضورية.



- 1- اكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 8.
- 2- مثل كلها من التحويلين أ و ب بمعادلة كيميائية ملخصة.
- 3- اكتب نصا علميا توضح فيه التفاعلات الأساسية الحاصلة في كل من الع炷تين أ و ب مبرزا التكامل الأيضي بينهما.


## الإجابة المودجية

## 1- البيانات


- 1- غاز ثاني أكسيد الكربون، 2- ماء ( $12H_2O$ ), 3- طاقة ضوئية، 4- ثاني الأكسجين، 5- سكر، 6- ماء ( $6H_2O$ ), 7- حمض بيروفيك، 8- طاقة قابلة للاستعمال (ATP).

2- تمثيل التحويلين أ و ب بمعادلتين  
المعادلة الملخصة للتحويل أ

طاقة ضوئية و يخضور




المعادلة الملخصة للتحويل ب



## 3- نص علمي

الخلية البخضورية ذاتية التغذية تحتوي على صانعات خضراء ومتوكندرات. فما هي التفاعلات الحاصلة في كل الع炷تين؟ وما هو التكامل الأيضي بينهما؟

السلسلة التغذوية تحصل الخلية (ب) على المادة المضوية من الخلية (أ) وتقوم بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة فيها إلى طاقة قابلة للاستعمال (ATP)، وذلك على مستوى المتوكندرى بعملية التنفس حسب المعادلة:




## 3- نص علمي

تحتاج الخلايا غير ذاتية التغذية لإمداد مستمر من المادة والطاقة للقيام بمحظوظ نشاطاتها الحيوية. وللحصول على الطاقة تقوم بحدم جزيئات الغلوكوز (المادة) وتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة فيها إلى طاقة قابلة للاستعمال ATP، وتسمى العملية بالتنفس. فكيف يتم تراقح تحولات المادة والطاقة عند الخلية غير ذاتية التغذية؟ وما هي أهم الشهادات التي تسهلها فيها الطاقة؟


تم عملية التنفس في ثلاثة مراحل:

- أ- التحلل السكري (الغلوكة): مقرها النبول، يتم فيها هدم جزيئات الغلوكوز إلى حمض البيروفيك، مع إرجاع نوافل الهيدروجين  $NAD^+$  وتركيب  $ATP$ ، حسب المعادلة التالية:




- ب- هدم حمض البيروفيك: مقرها المادة الأساسية للميتوكندرى وتم في مرحلتين: الخطوة التحضرية وحلقة كريوس.


تم فيها أكسدة حمض البيروفيك ونحر  $CO_2$  وإنتاج  $ATP$  وارجاع  $NAD^+$ ، حسب المعادلة التالية:



ج- الفسفرة التاكسيدية: مقرها الفضاء الداخلي للميتوكندرى. يتم فيها أكسدة نوافل الهيدروجين  $NADH, H^+$  على مستوى السلسلة التفصية وتنتقل فيها الإلكترونات الناتجة تلقائيا حسب كمود أكسدة وارجاع متزايد. يستقبل  $O_2$  الإلكترونات فيرجع وفق المعادلة:



الانتقال الإلكتروني في السلسلة التفصية تحرر منه طاقة تستعملها النوافل  $T_1, T_3, T_5, T_{11}$  لضخ البروتونات من المادة الأساسية نحو الفراغ بين الغشائين عكس تدرج تركيزه أفيتولد تدرج الكتروكيميائي للبروتونات. تنتقل البروتونات المترافقه إلى المادة الأساسية عبر الأنزيم  $ATP$  ستبيات وتحفظ على فسفرة  $ADP$  إلى  $ATP$  حسب المعادلة التالية:



في الوسط الهوائي، تحصل الخلية على الطاقة من أكسدة الغلوكوز بعملية التنفس. ينتج عنها طاقة معنفة بحيث كل جزيء غلوكوز واحدة تنتج  $38 ATP$  تستعملها الخلية في مختلف أنشطتها، من أهاها: الحفاظ على درجة الحرارة، الحركة، تركيب وأفراز البروتينات، التضاعف الخلوي، نقل الشوارد عكس تدرج تركيزها...

## السلسلة الفرعية

## 2- نص علمي

من بين أهم العلاقات التي تربط الكائنات الحية في الأوساط الحيوية هي التغذية، تزمنها سلسلة غذائية مصدرها الخلايا البخضورية ذاتية التغذية التي تضم إمداداً مستمراً للمادة والطاقة الضخور بـ*بـ*ن جميع النشاطات الحيوية للخلايا غير ذاتية التغذية. كيف تتدخل هذه العضيات في إنتاج وتحويل الطاقة والمادة واستعمالها؟

## 1- تحويل الطاقة على مستوى الصانعات الخضراء ( التركيب الضوئي )

الصانعات الخضراء عضيات توجد في جميع الخلايا البخضورية، تخونى على أنسجة البخضور التي لها القدرة على انتناص الطاقة الضوئية وتحوّلها إلى طاقة كيميائية تخزن في الروابط الكيميائية للمواد العضوية المصونة انطلاقاً من المواد المعدنية ( $H_2O$  و  $CO_2$ ) التي تستمدّها من محيطها المباشر ويتم ذلك في مرحلتين متكمّلتين:

أ- المرحلة الكيموضوئية: تم تفاعلاً لها في وجود الضوء مقرّها التلاكتونيدات التي تخونى أنسجتها على الأصيحة البخضورية التي لها القدرة على إنتناص الطاقة الضوئية، ومن أهم تفاعلاً الأكسدة الضوئية  $H_2O$  وانتقال الأثر بين النظامين الضوئيين PSII و PSI في السلسلة التركيبية. من نوافتها ATP وإرجاع المرافقات الإزيمية  $NADP^+$  إلى  $NADPH, H^+$

ب- المرحلة الكيموجيوجية: مقر حدوث تفاعلاً لها هو الحشوة، وهي تفاعلات كالفن وبنس التي يتم فيها تبّيت  $CO_2$  إلى  $CO_3^-$  بواسطة الإنزيم Rubisco وتؤدي إلى إنتاج جزيئة الغلوكوز الغنية بالطاقة التي تتطلب توفير نوافع المرحلة الضوئية (ATP و  $NADPH_2$ ) وهي نوافع المرحلة الكيموضوئية، ويتم فيها تحويل الطاقة الكيمياوية الكامنة في روابط PSI إلى طاقة كيميائية كامنة في روابط جزيئة الغلوكوز الذي يكتفى على شكل نشا، ويتم فيها تحديد Rubisco. الصانعات الخضراء هي العضيات الوحيدة القادرة على استعمال الطاقة الضوئية لإنتاج جزيئات عضوية غنية بالطاقة

## 2- تحويل الطاقة على مستوى الميتوكوندريات

الميتوكوندريات عضيات توجد في هبولي جميع الخلايا حقيقة النواة التي تقوم بأكسدة المادة العضوية في وجود  $O_2$  أي مقر تحويل الطاقة الكيمياوية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال. تم تفاعلات الأكسدة الخلوية في ثلاثة مراحل:

أ- على مستوى الهيولى الأساسية: تحدث مرحلة التحلل السكري، لا تحتاج تفاعلاً لها، يتم فيها تفكيك الغلوكوز إلى جزيئتين من حمض البيروفيك وهو مادة أيضاً التي تستعملها للميتوكوندريات.

ب- على مستوى المادة الأساسية: تحدث مرحلة الأكسدة التنفسية يتم فيها هدم جزيئة حمض البيروفيك تدريجياً على مرحلتين:

- مرحلة تحضيرية: يتم فيها تفكيك حمض البيروفيك جزيئاً إلى أستيل مرفاق الإنزيم A، يتم فيها نزع  $NADPH, H^+$  وإرجاع  $CO_2$ .


- حلقة كربليس: يتم فيها تفكيك أستيل مرفاق الإنزيم A كلباً إلى  $CO_2$  يطرح بشكل غاز وبروتون  $H^+$  بحمل  $RH_2$ .

## التمرير 03

ضمن الأوساط الحيوية المختلفة تجد سلسلة غذائية يمكن تثيل علاقتها الخلوية كما يلي:

خلية ذاتية التغذية  $\rightarrow$  خلية غير ذاتية التغذية

تقوم هذه الخلية بعدة آلية تسمح لها بإنتاج واستعمال الطاقة بفضل العضيين الممثلين في الوثيقة



- 1- تعرف على العضيين A و B، محدداً الخاصية البنوية التي تميز العضيين.
- 2- أكتب نصاً علمياً فيه كيف تدخل كل من العضيين A و B في استعمال وانتاج الطاقة.

## الإجابة المودجية

1- التعرف على العضيين A و B  
نوعية A: صانعة خضراء.

نوعية B: ميتوكوندري.

نوعية: البنية الحجرية، فالصور الحقيقية تظهر أن القراء الداخلي للعضيين مقسم إلى حجرات.

### الوحدة 03: حوصلة التحولات الطاقوية

#### 2- نص علمي

من بين أهم العلاقات التي تربط الكائنات الحية في الأوساط الحيوية هي الغذاء، تؤمّنها سلاسل غذائية مصدرها الخلايا البخضورية ذاتية التغذية التي تضم إمداداً مستمراً للمادة والطاقة الضروريتان لجميع النشاطات الحيوية للخلايا غير ذاتية التغذية. كيف تتدخل هذه العضيات في إنتاج وتحويل الطاقة والمادة واستعمالهما؟

#### 1- تحويل الطاقة على مستوى الصانعات الخضراء (التوشكيب الضوئي)

الصانعات الخضراء عضيات توجد في جميع الخلايا البخضورية، تحتوي على أنسجة البخضور التي لها القدرة على اقتناص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كيميائية تُخزن في الروابط الكيميائية للمواد العضوية المصنعة اطلاقاً من المواد المعدنية ( $\text{CO}_2$  و  $\text{H}_2\text{O}$ ) التي تستمدّها من غبطها المباشر ويتم ذلك في مراحلتين متكمّلتين:

- المرحلة الكيميوضوئية: تم تفاعلاً تماً في وجود الضوء مقرّها الثلاكتونيدات التي تحتوي أغشّتها على الأنسجة البخضورية التي لها القدرة على اقتناص الطاقة الضوئية، ومن أهم تفاعلاً ثماً الأكسدة الضوئية لـ  $\text{H}_2\text{O}$  وانتقال الـ  $\text{e}^-$  بين النظائر الضوئيين  $\text{PSII}$  و  $\text{PSI}$  في السلسلة التركيبية. من نواتجها  $\text{ATP}$  وإرجاع المراقبات الإزيمية  $\text{NADPH}_2\text{H}^+$  إلى  $\text{NADP}^+$

بـ المرحلة الكيميوضوئية: مقر حدوث تفاعلاً تماً هو الحشوة، وهي تفاعلات كالنس وبنس التي يتم فيها تثبيت  $\text{CO}_2$  إلى الـ  $\text{RubiP}$  بواسطة الإنزيم  $\text{Rubisco}$  وتؤدي إلى إنتاج جزيئة الغلوكوز الغنية بالطاقة التي تتطلب توفير نواتج المرحلة الضوئية ( $\text{ATP}$  و  $\text{NADPH}_2$ ) وهي نواتج المرحلة الكيميوضوئية، ويتّم فيها تحويل الطاقة الكيميوضوئية الكامنة في روابط  $\text{NADPH}_2$  إلى طاقة كيميائية كامنة في روابط جزيئة الغلوكوز الذي يكتف على شكل نشا، ويتم فيها تحديد  $\text{RubiP}$ . الصانعات الخضراء هي العضيات الوحيدة القادرة على استعمال الطاقة الضوئية لإنتاج جزيئات عضوية غنية بالطاقة

#### 2- تحويل الطاقة على مستوى الميتوكوندريات

الميتوكوندريات عضيات توجد في هبولي جميع الخلايا حقيقة النواة التي تقوم بأكسدة المادة العضوية في وجود  $\text{O}_2$  أي مقر تحويل الطاقة الكيميوضوئية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال. تم تفاعلات الأكسدة الخلوية في ثلاثة مراحل:

أ- على مستوى الهيولى الأساسية: تحدث مرحلة التحلل السكري، لا تحتاج تفاعلاً إلى  $\text{O}_2$ ، يتم فيها تفكيك الغلوكوز إلى جزيئتين من حمض البيروفيك وهو مادة الأيض التي تستعملها الميتوكوندريات.

ب- على مستوى المادة الأساسية: تحدث مرحلة الأكسدة التنفسية يتم فيها هدم جزيئة حمض البيروفيك تدريجياً على مراحلتين:

- مرحلة تحضيرية: يتم فيها تفكيك حمض البيروفيك جزئياً إلى أستيل مرافق الإنزيم  $\text{A}$ ، يتم فيها نزع  $\text{CO}_2$  وإرجاع  $\text{NADPH}_2\text{H}^+$ .

- حلقة كريسيس: يتم فيها تفكيك أستيل مرافق الإنزيم  $\text{A}$  كلباً إلى  $\text{CO}_2$  يطرح بشكل غاز وبروتون  $\text{H}^+$  يحمل بواسطة  $\text{RH}_2$ .


**السلسلة الفعلية**  
تقوم الصانعات الخضراء بإرجاع الـ  $\text{O}_2$  (مواد معdenية) إلى مواد عضوية (مثل  $\text{H}_2\text{O}_2$ ،  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ) وذلك بامتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كيميوضوئية كاملة (تركيب ضوئي). المادة العضوية الناتجة (غلوكوز) تتفكك جزئياً في مستوى الطيول، أما تلك المتبقية من المهم (حمض البيروفيك) فتدخل إلى الميتوكوندري. تقوم هذه الأخيرة بحدّم كلّي لحمض البيروفيك ويتم تدريجياً في هاتين المرحلتين تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال ( $\text{ATP}$ ) وتشكل  $\text{H}_2\text{O}$  و  $\text{CO}_2$  (تنفس). يحدث تكامل أيضي بين العضيّتين: جزيئات  $\text{O}_2$  ولما الناتجة عن التنفس يمكن أن تستعمل من طرف الصانعات الخضراء فتم النقل رجعي من العضية غير ذاتية التغذية إلى العضية ذاتية التغذية. نواتج النشاط الأيضي على مستوى العضية الأولى تستعمل من طرف العضية الثانية والعكس صحيح. عمليات النقل المتبادل تسمح بتشكيل حلقة للمادة تربط الصانعات الخضراء بالميتوكوندري بخلقيتين طاقويتين تحويليتين.

#### التعرف على العضيّتين A وب

ضمن الأوساط الحيوية المختلفة تجد سلاسل غذائية يمكن تمثيل علاقتها الخلوية كما يلي:

خلية ذاتية التغذية  $\rightarrow$  خلية غير ذاتية التغذية

تقوم هذه الخلايا بعدة آلية تسمح لها بإنتاج واستعمال الطاقة بفضل العضيّتين الممثلتين في الوثيقة الموارية.



العضية ب

العضية أ

الوثيقة

- 1- تعرف على العضيّتين A وب، محدداً الخواصيّة البنائيّة التي تميز العضيّتين.
- 2- أكتب نصاً علمياً تبيّن فيه كيف تدخل كل من العضيّتين A وب في استعمال وانتاج الطاقة.

#### الإجابة المودجة

1- التعرف على العضيّتين A وب  
العضية أ: صانعة خضراء.

العضية ب: ميتوكوندري.

الخاصية: البنية الحجرية، فالصور الحقيقية تظهر أن الفراغ الداخلي للعضيّتين مقسم إلى حجرات.

### السلسلة المُنْتَهِيَّة

#### السلسلة المُنْتَهِيَّة

- وحدة 03: حوصلة التحولات الطاقوية
- البروتونات من جهتي الغشاء الداخلي للميتوكوندري.
  - الإلكترونات من جهتي الغشاء الداخلي للميتوكوندري.
  - حال التحلل السكري يتم إنتاج:
    - غض البروفيلك و  $\text{CO}_2$  و  $\text{ATP}$
    - غض البروفيلك و  $\text{ATP}$  و  $\text{H}^+$  و  $\text{NADH}_2$ .
    - غض البروفيلك و  $\text{CO}_2$  و  $\text{ATP}$ .
    - أجب بتصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ.
    - تم أكسدة  $\text{NADH}_2\text{H}^+$  خلال كل من تفاعلات التحلل السكري وحلقة كربوس.
    - يتبين عن تحول غض البروفيلك تشكل الأستبل مرفقا الإزيم في المادة الأساسية.
    - الخصيلة الإجمالية للتحلل السكري هي أربع جزيئات  $\text{ATP}$ .
    - تفاعلات حلقة كربوس تنتج ثالثي أكسيد الكربون وتستهلك ثالثي الأكسجين.
    - الميتوكوندريات عضيات تم داخليها تفاعلات التنفس أو التخمر حسب وجود أو غياب الأكسجين.

#### الإجابة النموذجية

- بـ 2، - أـ 3، - دـ 4، - جـ 5.
- خطأ: تم أكسدة  $\text{NADH}_2\text{H}^+$  خلال النسفة الناكسدية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري.
- صحيح.
- خطأ: الخصيلة الإجمالية للتحلل السكري هي جزيئ  $\text{ATP}$ .
- خطأ: تفاعلات حلقة كربوس تنتج ثالثي أكسيد الكربون ولا تستهلك ثالثي الأكسجين.
- خطأ: الميتوكوندريات عضيات تم داخليها تفاعلات التنفس في وجود الأكسجين.


#### نهاية عن التمارين الثاني

#### تمرين 01

لبيان التفاعلات التنسجية المسؤولة عن تحويل الطاقة الكامنة في المادة العضوية وعلاقتها بالبيات الخلوي المتداخلة، نقترح استدلال المعطيات الآتية:

#### الجزء الأول

الأمشاج الذكورية خلايا جنسية تعر المسالك التناسلية الأنوثية من أجل إخراج الويضة، يتم ذلك بفضل حركة أسواعها التي تتطلب طاقة في جزيئات  $\text{ATP}$ . لإنتاج الأمشاج الذكورية حرارة الفركتوز (سكر يشبه الغلوكوز) الموجود في السائل المنوي يتركيز يتراوح ما بين  $1.5 \text{ g/L}$  و  $1.6 \text{ g/L}$  حسب التفاعل:



علم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

جـ - على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري: تحدث فيها تفاعلات الفسفرة الناكسدية في وجود  $\text{O}_2$  حيث تتم أكسدة النوافل المرجحة  $\text{RH}_2$  وتشكل جزيئات ATP الغنية بالطاقة وجزيئات  $\text{H}_2\text{O}$ . وهكذا يمكن للميتوكوندريات في الخلايا تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المواد العضوية (الغلوكوز) بعد تحللها إلى حمض بيروفيلك ثم إلى طاقة قابلة للاستعمال بشكل ATP التي تستعمل في جميع نشاطات الخلية.

تؤمن الصناعات الحضرية في الخلايا بالبخارية للبياناتدخول الطاقة الضوئية إلى العالم الحي وتحويلها في الروابط الكيميائية للمواد السكرية انتلافاً من المواد المعدنية أثناء عملية التركيب الضوئي. هذه المواد العضوية المصونة تحول إلى مواد معدنية في الميتوكوندريات أثناء التنفس في جميع الخلايا الحية لإنتاج الطاقة القابلة للاستعمال ATPATP في النشاط الحضوري.

نشاط العضيان متكم بالضوء تدفق الطاقة في العالم الحي من خلال تدفق المادة وتحولها في الطبيعة، من صنفها المنتج الأول للمسادة العضوية أثناء عملية التركيب الضوئي.

#### تمرين 04

- آخر الأقتراح الصحيح من بين المعطيات الأربع، واتقل الحرف المقابل له على ورقة الإجابة بالشكل التالي: 1 - 2 ... 3 - 4 ... 5 ... 6 - ...
- يتم تحويل  $\text{CO}_2$  الناتج عن هدم الغلوكوز أثناء تفاعلات:

  - تحلل الغلوكوز في الهيول.
  - حلقة كربوس في الميتوكوندري.
  - تحويل حمض البيروفيلك إلى كحول في الهيول.
  - أكسدة تواقيل الإلكترونات في الميتوكوندري.
  - نوعان هدم حمض بيروفيلك واحد داخل الميتوكوندري هي:

    - $3\text{CO}_2 + \text{ATP} + \text{FADH}_2 + 3\text{NADH}_2$
    - $3\text{CO}_2 + \text{ATP} + \text{FAD} + 3\text{NADH}_2$
    - $3\text{CO}_2 + \text{ADP} + \text{FADH}_2 + 4\text{NADH}_2$
    - $3\text{CO}_2 + \text{ATP} + \text{FADH}_2 + 4\text{NADH}_2$

  - تم ظاهرة التنفس الخلوي عبر المراحل التالية:

    - حلقة كربوس، 2 - تحلل سكري، 3 - نسفة ناكسدية، 4 - حضرة تحضيرية.
    - 4 ← 1 ← 3 ← 2 ← 1
    - 3 ← 4 ← 1 ← 2
    - 1 ← 3 ← 4 ← 2
    - 3 ← 2 ← 1 ← 4

- يرتبط إنتاج  $\text{ATP}$  في مستوى الميتوكوندري بشئوه تدرج تركيز:

  - البروتونات من جهتي الغشاء الخارجي للميتوكوندري.
  - الإلكترونات من جهتي الغشاء الخارجي للميتوكوندري.

السلسلة النفعية

- وحدة 0.3: حوصلة التحولات الطاقوية
- الروتونات من جهتي الغشاء الداخلي للميتوكوندري.
  - الإلكترونات من جهتي الغشاء الداخلي للميتوكوندري.
  - خلال التحلل السكري يتم إنتاج:
    - حمض البيروفيك و  $\text{CO}_2$  و  $\text{ATP}$ .
    - حمض البيروفيك و  $\text{ATP}$  و  $\text{NADH, H}^+$ .
    - حمض البن و  $\text{CO}_2$  و  $\text{ATP}$ .
  - أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ.
  - تم أكسدة  $\text{NADH, H}^+$  خلال كل من تفاعلات التحلل السكري و حلقة كربوس.
  - ينبع عن تحول حمض البيروفيك تشكيل الأستبلير مرفق الإنزيم A في المادة الأساسية.
  - الحصيلة الإجمالية للتحلل السكري هي أربع جزيئات  $\text{ATP}$ .
  - تفاعلات حلقة كربوس تنتج ثانوي أكسيد الكربون وتستهلك ثانوي الأكسجين.
  - الميتوكوندريات عضيات تم داخلها تفاعلات التنفس أو التخمر حسب وجود أو غياب الأكسجين.

الإجابة المودعة

- 1- ب، 2- أ، 3- د، 4- ج، 5- ب
- خطأ: تم أكسدة  $\text{NADH, H}^+$  خلال الفسفرة الناكسدية على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري.
- صحيح.
- خطأ: الحصيلة الإجمالية للتحلل السكري هي جزيئات  $\text{ATP}$ .
- خطأ: تفاعلات حلقة كربوس تنتج ثانوي أكسيد الكربون ولا تستهلك ثانوي الأكسجين.
- خطأ: الميتوكوندريات عضيات تم داخلها تفاعلات التنفس في وجود الأكسجين.



نماذج عن التمارين الثانية

تمرين 01

لإبراز التفاعلات التنفسية المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية وعلاقتها بالبنية الخلوية المتدخلة، نقترح استغلال المعيطيات الآتية:

الجزء الأول

الأمثاج الذكرية خلايا جنسية تغير المسالك الناسلية الأنوثة من أجل إخصاب البويضة، يتم ذلك بفضل حركة أنسواتها التي تتطلب طاقة في جزيئات  $\text{ATP}$ ، لإنتاج  $\text{ATP}$  تخدم الأمثاج الذكرية جزيئة الفركوز (سكر يشبه الغلوكوز) الموجود في السائل المنوي يترکيز يترواح ما بين 1.5 g/L و 1.6 g/L حسب التفاعل:



علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

السلسلة النفعية


ج- على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري: تحدث فيها تفاعلات الفسفرة الناكسدية في وجود  $\text{O}_2$ ، حيث تم أكسدة الناقل المرجع RH2 وتشكل جزيئات ATP العنية بالطاقة وجزيئات  $\text{H}_2\text{O}$ . ويمكن للميتوكوندريات في الخلايا تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المواد العضوية (الغلوكوز) بعد تحمله إلى حمض بيروفيك ثم إلى طاقة قابلة للاستعمال بشكل ATP التي تستعمل في جميع نشاطات الخلية.

تؤمن الصانعات الخضراء في الخلايا بالبصورية للنباتات دخول الطاقة الضوئية إلى العالم الحي وتغزيلها في الروابط الكيميائية للمواد السكرية اتصالاً من المواد المعدنية أثناء عملية التركيب الضوئي. هذه المواد العضوية المصعدة تحول إلى مواد معدنية في الميتوكوندريات أثناء التنفس في جميع الخلايا الحية لإنتاج الطاقة القابلة للاستعمال في النشاط الحيوى.  $\text{ATP/ATP}$

نشاط العضيان متكمال يضمن تدفق الطاقة في العالم الحي من خلال تدفق المادة وتحولاتها في الطبيعة، من ضمنها المنشآت الأولى للمادة العضوية أثناء عملية التركيب الضوئي.

تمرين 04


- اختر الأقواء الصحيحة من بين المعيطيات الأربع، وانقل الحرف المقابل له على ورقة الإجابة بالشكل التالي: 1- ...., 2- ...., 3- ...., 4- ...., 5- ...., 6- ....
  - يتم تحويل  $\text{CO}_2$  الناتج عن هدم الغلوكوز أثناء تفاعلات:
    - تحمل الغلوكوز في الهيولى.
    - حلقة كربوس في الميتوكوندري.
    - تحويل حمض البيروفيك إلى كحول في الهيولى.
    - أكسدة نوافل الإلكترونات في الميتوكوندري.
  - يوازن هدم حمض بيروفيك واحد داخل الميتوكوندري هي:
    - $3\text{CO}_2 + \text{ATP} + \text{FADH}_2 + 3\text{NADH, H}^+$
    - $3\text{CO}_2 + \text{ATP} + \text{FAD} + 3\text{NADH, H}^+$
    - $3\text{CO}_2 + \text{ADP} + \text{FADH}_2 + 4\text{NADH, H}^+$
    - $3\text{CO}_2 + \text{ATP} + \text{FADH}_2 + 4\text{NADH, H}^+$
  - تتم ظاهرة التنفس الخلوي عبر المراحل التالية:
    - حلقة كربوس، 2- تحمل سكري، 3- فسفرة تاكسدية، 4- خطوة تحضيرية.
- أ-  $2 \leftarrow 1 \leftarrow 3 \leftarrow 4$   
ب-  $3 \leftarrow 4 \leftarrow 1 \leftarrow 2$   
ج-  $1 \leftarrow 2 \leftarrow 3 \leftarrow 4$   
د-  $3 \leftarrow 2 \leftarrow 1 \leftarrow 4$
- أ- يرتبط إنتاج  $\text{ATP}$  في مستوى الميتوكوندري بنشوء تدرج تركيز:
  - الروتونات من جهتي الغشاء الخارجي للميتوكوندري.
  - الإلكترونات من جهتي الغشاء الخارجي للميتوكوندري.
  - الأمثلج الذكريات من جهتي الغشاء الخارجي للميتوكوندري.




- حدد التفاعلات التنفسية المسؤولة عن إنتاج ATP على مستوى الميتوكوندري.

الجزء الثاني

مثل الوثيقة (02) تغير حركة الأمشاج الذكورية بدلاً لزمن في ظروف تجريبية مختلفة، وتمثل الوثيقة (03) نصيبي المشيج الذكري (الشكل ١) ونفق بببة قطعة المتوسطة (الشكل ب).



(2)



- استناداً إلى ما سبق وباستغلال معطيات الوثائقين (02) و(03) بين أن المشيج الذكري خلية تستعمل عملية التنفس لإنتاج الطاقة الضرورية للحركة.

### الإجابة التموذجية

#### الجزء الأول

التفاعلات التنفسية المسؤولة عن إنتاج ATP على مستوى الميتوكوندري، أكسدة حمض البيروفيك إلى أستيل مراتق الإنزيم.

- تفاعلات حلقة كريسب في المادة الأساسية ويتم فيها: نزع الكربون وتحرير الـ  $\text{CO}_2$ . إرجاع  $\text{NAD}^+$  إلى  $\text{NADH}_2$  و  $\text{FADH}_2$  إلى  $\text{FAD}$ . إنتاج  $\text{ATP}$ .  
- الفسفرة الناكسدية في الغشاء الداخلي للميتوكوندري ويتم فيها: إعادة أكسدة الناقل، إرجاع الـ  $\text{O}_2$  وتكون جزيئات الماء، فسفرة  $\text{ADP}$  إلى  $\text{ATP}$ .

#### الجزء الثاني

تبين أن المشيج الذكري خلية تستعمل عملية التنفس لإنتاج الطاقة الضرورية للحركة  
استغلال الوثيقة (02)

- استقرار حركة الحيوانات المنوية بوجود  $\text{O}_2$  بالرغم من غياب ATP.  
- انخفاض حركة الحيوانات المنوية عند افتقار الوسط لـ  $\text{O}_2$  والـ ATP.



- ارتفاع حركة الحيوانات المنوية إلى قيمتها الأصلية في غياب  $\text{O}_2$  بوجود ATP. هذا يدل على استعمال المشيج الذكري لـ ATP من أجل الحركة كما أنه يصنعها في وجود  $\text{O}_2$ .  
استغلال الوثيقة (03)

- احتواء القطعة المتوسطة للحيوان المنوي على عدد كبير من الميتوكوندريات.  
- يتوفر الحيوان المنوي في قطعته المتوسطة على ميتوكوندريات عديدة تنتج الطاقة اللازمة للحركة عن طريق عملية التنفس.  
إذن فالمشيج الذكري خلية تحوي ميتوكوندريات تقوم بعملية التنفس لإنتاج الطاقة الضرورية للحركة.


لدراسة بعض الطواهر الحيوية المترتبة للطاقة نقترح المعطيات الآتية:

## الجزء الأول

- زرعت خلايا حميرة الجعة (نطر مجهري وجد الخلية) في وسط زرع يحتوي على الغلوكوز، في ظروف تجريبية مختلفة، الظروف والناتج الحصول عليها ممثلة في الوثيقة (01).
- ثُمت بعد ذلك ملاحظة البنية المجهريّة لخلتين من حميرة البيرة مأخوذتين من الوسطين A و B كما هي مبينة في الوثيقة (03).

الناتج الحصول	الظروف التجريبية					الوسط
	كمية الغلوكوز في بداية التجربة بالغرام	مدة الاستهلاك بالغرام	الغلوکوز المستهلك بالغرام	زيادة الكتلة الحيوية لل الخميرة بالغرام		
1	1,97	150	9	150		
ب	0,255	45	90	150		

(1) الوثيقة (1)




1- فسر نتائج جدول الشكل (1).

2- استنادا إلى الوثيقة (03)، أتغير عطفطا تركيبا تبرز فيه مرافق هدم الغلوكوز في الخلية بالنسبة للوسط (1).

الوسط الخلوي	الوسط الخلوي A	الوسط الخارجي	الزمن
B	هيول	مينيكوندرلي	G+++
		هيول	G+
G+++	a.P+	G++	t <sub>1</sub>
a.P++	a.P++, a.K+	a.P++	t <sub>2</sub>
a.K+++		CO <sub>2</sub> +	t <sub>3</sub>



الشكل (1)




لدراسة بعض الظواهر الحيوية المنتجة للطاقة تفتح المطابع الآتية:

## الجزء الأول

- زرعت خلايا خجنة الجعة (نطر مهري وجيد الخلية) في وسط زرع يحتوي على الغلوكوز، في ظروف تغذية مختلفة، الظروف والنتائج الحصول عليها ممثلة في الوثيقة (01).
- ثبت بعد ذلك ملاحظة البنية الخضراء للخلية مأخوذتين من خجنة الجعة مأخوذتين من الوسطين أ و ب كما هي مبينة في الوثيقة (03).

الناتج التجاري	الظروف التجريبية			
	كمية الغلوكوز في بداية التجربة بالغرام	مدة الاستهلاك بالغرام	كمية الغلوكوز بالغرام	الوسط
1,97	150	9	150	 كمية العجينة بعض الموز
0,255	45	90	150	 كمية العجينة بعض الموز

(الوثيقة (1))



334


الوقت (دقيقة)	الشكل (1)	الشكل (2)
0	أ. حمض البيروفيك	أ. غلوكوز
3	ب. إشعاع قوي	ب. إشعاع ضعيف
4	ج. إشعاع متوسط	ج. إشعاع متوسط
5	د. إشعاع قوي	د. إشعاع ضعيف
6	ـ	ـ

المؤشر: كمية العجينة  
الرسوم: a. حمض البيروفيك b. غلوكوز c. إشعاع قوي d. إشعاع ضعيف

الشكل (1)

(الوثيقة (03))

(الوثيقة (03))



- ـ فسر نتائج جدول الشكل (1).
- ـ استناداً إلى الوثيقة (03)، أخيراً خططاً تركيبياً تبرز فيه مراحل عدم الغلوكوز في الخلية بالنسبة للوسط (1).

## الجزء الأول

تفسير نتائج جدول الشكل (أ) استهلاك تام للغلوکوز من طرف خلايا خلية الجعة بوجود  $O_2$  (وسط (أ) هوائي) في مدة تسعة أيام.

تظهر البنية الخضراء خلية الجعة (الشكل أ. الوثيقة 2) وفراة الميتوكوندريات ذات حجم كبير تناسب ظروف الوسط (أ)، يتعلق الأمر بظاهرة التنسف.

- استهلاك غير تام للغلوکوز في الوسط (ب) فهو لا هوائي (غياب  $O_2$ ) بالرغم من مرور 90 يوما.

تظهر البنية الخضراء خلية الجعة (الشكل ب. الوثيقة 2) ندرة الميتوكوندريات، ما يدل على حدوث ظاهرة التخرّر (في الوسط ب).

- في الزمن (أ): انخفاض إشعاع الغلوکوز في الوسط الخارجي وظهوره في الهيول خلايا الوسطين (أ) و(ب) يفسر باستعمال الخلايا نادرة الغلوکوز.


- في الزمن (ب): ظهور إشعاع متوسط في حمض البيروفيك للهيول في الوسطين معه وإشعاعاً ضعيفاً في ميتوكوندريات الوسط (أ) يعني انخال الغلوکوز (تحويله إلى حمض البيروفيك).

- في الزمن (ب): بالنسبة للوسط أختفاء الإشعاع في الهيول وظهوره الكبير في حمض البيروفيك والضعف في أحاضن حلقة كريسبس يدل على استعمال الميتوكوندريات لحمض البيروفيك.

- في الوسط الخارجي يدل على حدوث تفاعلات حلقة كريسبس.

## الجزء الثاني

مخيط تركيبى يبرز مراحل هدم الغلوکوز في الخلية بالنسبة للوسط (أ)



كما في الكائنات الحية الأخرى قد يتعرض النبات الأخضر لاعتداءات خارجية مثل مثلاً قد يتعرض للإصابة بالفطريات.

تتح بعض الفطريات جزيئاً يسمى توتوكسين يصيب النبات الأخضر بداء يسمى الغلوروز ومن أعراضه تصح الأوراق برقاية ثم صفراء مؤدياً إلى موت سريع. يستخدم التوتوكسين أيضاً كمبيد لأشجار الصبار. لفهم استخدام التوتوكسين كمبيد للأعشاب إليك الدراسات التالية:

## الجزء الأول

نقوم بالنباتات الخضراء بعملية التركيب الضوئي الضرورية لحياتها. هذه العملية تتم وفق مرحلتين مرحلة كيموضوئية ومرحلة كيموجوبية. خلال المرحلة الكيموجوبية، يحدث استهلاك ثاني أكسيد الكربون ( $CO_2$ ) وانتاج طاقة كيميائية كامنة. لتحديد طبيعة هذه الطاقة الكيميائية وأصلها، قام أرنون (1958) بإجراء التجارب التالية:

نحضر أوساط تحتوي على حشوة الصانعات الخضراء فقط وتوضع في ظروف مختلفة، يضاف لكل وسط  $CO_2^{14}$  المشع وتقاس الكمية المثبتة منه، التجارب ونتائجها ممثلة في جدول الوثيقة (01) التالية:

كمية $CO_2^{14}$ المثبتة في الحشوة (دقة في الدقيقة)	محتوى الوسط
4000	حشوة في الظلام
96000	حشوة في الظلام في وجود تيلاكوبادات كانت معرضة للضوء.
96000	حشوة في الظلام في وجود ATP ونواتل الهيدروجين $RH_2$

1- حلل النتائج التجريبية الموضحة في جدول الوثيقة (01).

2- حدد نواتج المرحلة الكيموضوئية ومقرها، موضحاً أصل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية التي يتم انتاجها خلال المرحلة الكيموجوبية.

## الجزء الثاني

مثل الشكل (أ) من الوثيقة (02) طيف الامتصاص لأصباغ البخضور ونشاط التركيب الضوئي. كما يمثل الشكل (ب) نتائج تجربة مكملة لتجربة أرنون.

## الجزء الأول

تفسير نتائج جدول الشكل (١)

استهلاك ثام للغلوكوز من طرف خلايا خلية الجمعة بوجود  $O_2$  (وسط (أ) هوائي) في مدة تسعة أيام.

ظهور البنية المخصوصة لخلية الجمعة (الشكل أ. الوثيقة 2) وفرة الميتوكوندريات ذات حجم كبير تتناسب ظروف

الوسط (أ)، يتعلّق الأمر بظاهرة التفسّر.

- استهلاك غير ثام للغلوكوز في الوسط (ب) فهو لا هوائي (غياب  $O_2$ ) بالرغم من مرور ٩٠ يوماً.

ظهور البنية المخصوصة لخلية الجمعة (الشكل ب. الوثيقة 2) ندرة للميتوكوندريات، ما يدل على حدوث ظاهرة التفسّر (في الوسط ب).

- في الزمن (أ): انخفاض إشعاع الغلوكيز في الوسط الخارجي وظهوره في الهيول خلايا الوسطين (أ) و(ب)

يُفسّر باستعمال الخلايا لادة الغلوكيز.

- في الزمن (ب): ظهور إشعاع متواضع في حمض البيروفيك للهيول في الوسطين معاً وإشعاعاً ضعيفاً في

ميتوكوندريات الوسط (أ) يعني انحلال الغلوكيز (تحويله إلى حمض البيروفيك).


- في الزمن (أ): بالنسبة للوسط أ انخفاض الإشعاع في الهيول وظهوره الكبير في حمض البيروفيك والضعف

في أحاض حلقة كريسب يدل على استعمال للميتوكوندريات أحاض حمض البيروفيك.

- في الزمن (ب): تركيز الإشعاع في أحاض حلقة كريسب داخل ميتوكوندريات الوسط (أ) وظهور  $O_2$  مشع

## الجزء الثاني

مختلط ترتكبي يبرز مراحل هذه الغلوكيز في الخلية بالنسبة للوسط (أ)



كما في الكائنات الحية الأخرى قد يتعرض النبات الأخضر لاعتداءات خارجية مثل مثلاً قد يتعرض للإصابة بالفطريات.

تنتع بعض الفطريات جزيئاً يسمى تونوكسین يصيب النبات الأخضر بداء يسمى الغلوروز ومن أعراضه نصبه الأوراق برقاية ثم صفراء مؤدياً إلى موت سريع. يستخدم التونوكسین أيضاً كمبيد عشبي للقضاء على الأعشاب الضارة. لفهم استخدام التونوكسین كمبيد للأعشاب إليك الدراسات التالية:

## الجزء الأول

نقوم بالنباتات الخضراء بعملية التركيب الضوئي الضرورية لحياتها. هذه العملية تتم وفق مرحلتين مرحلة كيموضوئية ومرحلة كيموجيوجية. خلال المرحلة الكيموجيوجية، يحدث استهلاك ثاني أكسيد الكربون ( $CO_2$ ) وإنتاج طاقة كيميائية كامنة. لتحديد طبيعة هذه الطاقة الكيميائية وأصلها، قام أرنون (1958) بإجراء التجارب التالية:

تحضر أوساط تحتوي على حشوة الصانعات الخضراء فقط وتوضع في ظروف مختلفة، يضاف لكل وسط  $CO_2^{14}$  المشع وتقيس الكمية المثبتة منه، التجارب ونتائجها ممثلة في جدول الوثيقة (٠١) التالية:

كمية $CO_2^{14}$ المثبتة في الحشوة (دقة في الدقيقة)	محتوى الوسط
4000	خشوة في الظلام
96000	خشوة في الظلام في وجود تيلوكريدات كانت معرضة للضوء.
96000	خشوة في الظلام في وجود ATP ونواتل الهيدروجين $RH_2$

الوثيقة (٠١)

١- حلل النتائج التجريبية الموضحة في جدول الوثيقة (٠١).

٢- حدد نواتج المرحلة الكيموضوئية ومقرها، موضحاً أصل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية التي يتم انتاجها خلال المرحلة الكيموجيوجية.

## الجزء الثاني

كما في الشكل (أ) من الوثيقة (٠٢) طيف الامتصاص لأصباغ البخضور ونشاط التركيب الضوئي. كما يمثل الشكل (ب) نتائج تحرير مكملة لنجدية أرنون.

## الوحدة 03: حوصلة التحولات الطاقوية

2- نتائج المرحلة الكيمايووضوئية ومقرها وأصل الطاقة الكيمايوائية الحاكمة في الجزيئات الضوئية،

من خلال تاليج تجربة ارلون نجد ان نتائج المرحلة الكيمايووضوئية هي ATP ونواقل الهيدروجين  $RH_2$ .  
مقر حدوث المرحلة الكيمايووضوئية: كيسات البلاكوبيد.  
أصل الطاقة الكيمايوائية الكامنة في الجزيئات الضوئية التي يتم انتاجها خلال المرحلة الكيمايووضوئية هو الطاقة الضوئية.

## الجزء الثاني

تبين أسباب استعمال التونتووكسين كمبيد عشبي


## إستغلال الوثيقة (02)

من الشكل (أ): نلاحظ ان اطوال الموجات الأكثر امتصاصا من طرف البخضور 400 و 700 نانومتر الموجات الطيفية البنفسجية والازرق والأزرق. اطوال الموجات الأقل امتصاصا 550 نانومتر الأخضر.  
كما نلاحظ ان منحنى نشاط التركيب الضوئي يواكب منحنيات الامتصاص حيث كلما زادت شدة امتصاص الضوء زادت شدة التركيب الضوئي هذا يدل على أن للبخضور أهمية كبيرة في عملية التركيب الضوئي وفي حدوث المرحلة الكيمايووضوئية.

من الشكل (ب): كتجربة مكملة لتجربة ارلون عند وضع سترووما (حشوة) في الظلام وكيسات بلاكوبيد كانت معرضة للضوء. في وجود التونتووكسين نلاحظ تثبيت ضعيف لـ  $^{14}CO_2$  4000 دقة في الدقيقة  
هذا يدل على أن التونتووكسين منع تركيب الـ ATP ونواقل الهيدروجين  $RH_2$ .  
نعلم ان التونتووكسين يعمل على الأوراق عن طريق تدمير جزيئات البخضور عدم وجود هذه الأصياغ بغزير لون الأوراق تتحول إلى اللون البرتقالي ثم الأصفر، يؤدي تدمير الكلوروفيل بواسطة مادة التونتووكسين إلى إعاقة المرحلة الكيمايووضوئية وبالتالي توقف إنتاج جزيئات ATP و  $RH_2$  ، الضرورية للمرحلة الكيمايووضوئية لعملية التركيب الضوئي ، وبالتالي بالنسبة لإنتاج الجزيئات الضوئية . هذا يمنع تطور النباتات المعالجة بالتونتووكسين إذن هذا هو التأثير المبيد للأعشاب لهذا الجزيء.

## نماذج عن التمارين الثالث

## كم التصرير 01



الوحدة 03: حوصلة التحولات الطاقوية

من خلال تاليج تجربة ارلون نجد ان نتائج المرحلة الكيمايووضوئية هي ATP ونواقل الهيدروجين  $RH_2$ .  
مقر حدوث المرحلة الكيمايووضوئية: كيسات البلاكوبيد.

أصل الطاقة الكيمايوائية الكامنة في الجزيئات الضوئية التي يتم انتاجها خلال المرحلة الكيمايووضوئية هو الطاقة الضوئية.


## الجزء الثاني

تبين أسباب استعمال التونتووكسين كمبيد عشبي

## إستغلال الوثيقة (02)

من الشكل (أ): نلاحظ ان اطوال الموجات الأكثر امتصاصا من طرف البخضور 400 و 700 نانومتر الموجات الطيفية البنفسجية والازرق والأزرق. اطوال الموجات الأقل امتصاصا 550 نانومتر الأخضر.  
كما نلاحظ ان منحنى نشاط التركيب الضوئي يواكب منحنيات الامتصاص حيث كلما زادت شدة امتصاص الضوء زادت شدة التركيب الضوئي هذا يدل على أن للبخضور أهمية كبيرة في عملية التركيب الضوئي وفي حدوث المرحلة الكيمايووضوئية.

من الشكل (ب): كتجربة مكملة لتجربة ارلون عند وضع سترووما (حشوة) في الظلام وكيسات بلاكوبيد كانت معرضة للضوء. في وجود التونتووكسين نلاحظ تثبيت ضعيف لـ  $^{14}CO_2$  4000 دقة في الدقيقة  
هذا يدل على أن التونتووكسين منع تركيب الـ ATP ونواقل الهيدروجين  $RH_2$ .  
نعلم ان التونتووكسين يعمل على الأوراق عن طريق تدمير جزيئات البخضور عدم وجود هذه الأصياغ بغزير لون الأوراق تتحول إلى اللون البرتقالي ثم الأصفر، يؤدي تدمير الكلوروفيل بواسطة مادة التونتووكسين إلى إعاقة المرحلة الكيمايووضوئية وبالتالي توقف إنتاج جزيئات ATP و  $RH_2$  ، الضرورية للمرحلة الكيمايووضوئية لعملية التركيب الضوئي ، وبالتالي بالنسبة لإنتاج الجزيئات الضوئية . هذا يمنع تطور النباتات المعالجة بالتونتووكسين إذن هذا هو التأثير المبيد للأعشاب لهذا الجزيء.



الشكل (أ)

كبة ثانٍ أكسيد الكربون المشع المشعة في سترووما (الحشوة) مقاسة بالدقة في الدقيقة

معنى الوسط

4000

ستروم (حشوة) في الظلام وكيسات بلاكوبيد كانت معرضة للضوء. في وجود التونتووكسين

الشكل (ب)

الوثيقة (02)

- اعتمادا على ما سبق ومعلوماتك بين أسباب استعمال التونتووكسين كمبيد عشبي مع العلم أنه مسؤول عن الاختفاء التدريجي للبخضور في النبات.

## الإجابة الموزعية

## الجزء الاول

## 1- التحليل

يمثل الجدول كمية  $^{14}CO_2$  المثبتة في الحشوة في أوساط مختلفة حيث نلاحظ:

- عند وضع حشوة في الظلام يكون ثبيت  $^{14}CO_2$  ضعيف 4000 دقة في الدقيقة.

- عند وضع حشوة في الظلام في وجود بلاكوبيدات كانت معرضة للضوء أو في وجود ATP ونواقل الهيدروجين  $RH_2$  يكون ثبيت  $^{14}CO_2$  معتر 96000 دقة في الدقيقة.

نستنتج ان شروط ثبيت  $^{14}CO_2$  في الحشوة توفر ATP ونواقل الهيدروجين  $RH_2$ .

### السلسلة الفعلية

الوحدة 0.3: حوصلة التحولات الطافية  
2- نواتج المرحلة الكيمايوشونية ومقرها وأصل الطاقة الكيمايائية المكاملة في الجزيئات العضوية،

من خلال تجربة ارونون ثبت ان نواتج المرحلة الكيمايوشونية هي ATP ونواتل الميدروجين  $RH_2$ .

مقر حادث المرحلة الكيمايوشونية: كيسات البلاکوید، أصل الطاقة الكيمايائية الكامنة في الجزيئات العضوية التي يتم انتاجها خلال المرحلة الكيمايوشونية هو الطاقة الضوئية.

### الجزء الثاني

تبين أدلة استعمال التوتوكسين كمبيد عشب  
استغلال الوثيقة (02)

من الشكل (أ): نلاحظ ان اطوال الموجات الأكبر امتصاصا من طرف اليخصوص 400 و 700 نانومتر الموجات الطيفية البنفسجي والازرق والأحمر. اطوال الموجات الأقل امتصاصا 550 نانومتر الأخضر. كما نلاحظ ان منحنى نشاط التركيب الضوئي يوافق منحنيات الامتصاص حيث كلما زادت شدة امتصاص الضوء زادت شدة التركيب الضوئي هذا يدل على ان اليخصوص أهمية كبيرة في عملية التركيب الضوئي وفي حدوث المرحلة الكيمايوشونية.


من الشكل (ب): كتجربة مكملة لتجربة ارونون عند وضع سترووما (حشوة) في الظلام وكيسات البلاکوید كانت معرضة للضوء. في وجود التوتوكسين نلاحظ ثبيت ضعيف للـ  $^{14}CO_2$  4000 دقة في الدقيقة.

هذا يدل على ان التوتوكسين منع تركيب الـ ATP ونواتل الميدروجين  $RH_2$ .

نعلم ان التوتوكسين يعمل على الأوراق عن طريق تدمير جزيئات اليخصوص و عدم وجود هذه الأنساغ يغير لون الأوراق فتحول إلى اللون البرتقالي ثم الأصفر، يؤدي تدمير الكلوروفيل بواسطة مادة التوتوكسين إلى إعاقة المرحلة الكيمايوشونية وبالتالي توقف إنتاج جزيئات ATP و  $RH_2$  ، الضرورة للمرحلة الكيمايوشونية لعملية التركيب الضوئي ، وبالتالي بالنسبة لإنتاج الجزيئات العضوية . هذا يمنع تطور البذانات المعاجنة بالتوتوكسين إذن هذا هو التأثير المبيد للأعشاب لهذا الجزيء.

### نماذج عن التجارين الثالث

#### التجربة 01




تطلب الوظائف الحيوية المختلفة طاقة قابلة للاستعمال (في شكل ATP) يتم الحصول عليها من تحول الطاقة الكيمايائية الكامنة في الجزيئات العضوية وللتعرف على بعض آليات هذا التحول نقترح دراسة التالية:

#### الجزء الأول

الشخص (س) مصاب بالعمق، أظهرت التحاليل نقص في حركة نطاقة وتوضيح علاقة هذا النوع من العقم بتحول الطاقة نقدم التجربة التالية: نخزن

### علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

### السلسلة الفعلية



الشكل (أ)

كمية ثاني أكسيد الكربون المشبع المثبتة في سترووما (الحشوة) مقامة بدقة في الدقيقة

4000

محبى الوسط

سترومـا (حشـوة) في الظلـام وكـيسـات بـلـاكـوـيدـات كانـت مـعـرضـة لـلـضـوءـ، في وجـودـ التـوتـوكـسـينـ

الشكل (ب)

الوثيقة (02)

- اعتمادا على ما سبق ومعلوماتك بين أدلة استعمال التوتوكسين كمبيد عشبي مع العلم أنه مسؤول عن الاحتفاء النسخي للخصوص في النبات.

### الإجابة الموزعية

#### الجزء الأول

##### 1- التحليل

يمثل الجدول كمية  $^{14}CO_2$  المثبتة في الحشوة في أوساط مختلفة حيث نلاحظ:

- عند وضع حشوة في الظلام يكون ثبيت  $^{14}CO_2$  ضعيف 4000 دقة في الدقيقة.

- عند وضع حشوة في الظلام في وجود بلاکویدات كانت معرضة للضوء أو في وجود ATP ونواتل الميدروجين  $RH_2$  يكون ثبيت  $^{14}CO_2$  متغير 96000 دقة في الدقيقة.

نستنتج أن شرط ثبيت  $^{14}CO_2$  في الحشوة توفير ATP ونواتل الميدروجين  $RH_2$ .

الطاقة والحياة من الأثني لـ 3

الناتج من تناول الشخص (س) والثاني من شخص لا يعاني

معدن من الميتوكوندريات الأول مأخوذ من نصف الشخص (س) والناتج من الميتوكوندريات الثاني لا يتأثر في الزمن ز - 3 = نصف نفس التركيز من الناقل  $\text{TH}_2$  ثم يتم تبادل نسبة (0) في المغقر، الناتج الحصول عليها في الويندة (1).

الناتج الناتج من تناول الشخص (س) والثاني من شخص لا يعاني


معدن من الميتوكوندريات الأول مأخوذ من نصف الشخص (س) والناتج من الميتوكوندريات الثاني لا يتأثر في الزمن ز - 3 = نصف نفس التركيز من الناقل  $\text{TH}_2$  ثم يتم تبادل نسبة (0) في المغقر، الناتج الحصول عليها في الويندة (1).

- حمل الناتج الناتج في الويندة (1).
- زنة ورطبات تنشر من خلالها سب قلة حركة الناقل عند الشخص (س).

### الجزء الثاني

من آخر البحث عن علاج وبيان صحة إحدى الفرضيات تفتح الدراسة التالية:

ذمة تصيب نصف الشخص (س) دose مكونا من (Coenzyme Q<sub>10</sub>/200 mg). بعد أشهر من العلاج يلاحظ استعادة الناقل حركتها تدريجياً ورافق ذلك حدوث حل لزوجته. لتوضيح كيفية تأثير الدواء نقدم الويندة (2) حيث يمثل الشكل (1) تداعيات تحمل الغرائز (مادة الأيض المستخدمة من طرف الناقل كဓيمر لصادر وهي تنتهي في تحليلها لغلوكوز) بينما يمثل الشكل (2) آلية أكسدة الناقل المرجعة شديدة في مراحل الشكل (1) في وجود (0).



- الشكل من الشكل (1) من الويندة (2) استخرج: عدد جزيئات الـ ATP (المشحونة بشكل مباشر)
- عدد ترافق المرجعة - عدد جزيئات (0) المنظورة الخاص بكل مرحلة من المراحل المشار إليها بالأرقام (1)، (2) و(3) حيث مقدار متغير حدوث كل منها.
- شرح آلية تحمل  $\text{ATP}$  المنوطة في الشكل (2) واستخرج الحصيلة الطاقوية هذه المرحلة.

**وحدة 03: حوصلة التحولات الطاقوية**

السلسلة الفضية

3- فستر آلية تأثير الدواء الذي قدم للشخص (س)، مبرزاً مدى توافق المعلومات المتوصّل إليها مع إحدى الفرضيات السابقة.

**الجزء الثالث**

بالاعتماد على الجزءين السابقيين ومكتسباتك، اشرح العلاقة بين هدم مادة الأيض واستهلاك  $\text{O}_2$  والقيام ب مختلف الوظائف الحيوية.

### الإجابة المودعية

#### الجزء الأول

##### 1- التحليل

يمثل المنهجي تغير النسبة المئوية (%) للـ  $\text{O}_2$  في معلقين متماثلين من الميتوكوندريات بدلالة الزمن (د).

المعلق الأول مأخوذ من ناطف الشخص (س) مصاب بالعمق والثاني من شخص لا يعاني العميق.

- من 0 د إلى 3 د: قبل إضافة الناقل  $\text{TH}_2$ ، النسبة المئوية للـ  $\text{O}_2$  ثابتة في المعلقين عند 100 %.

- من 3 د إلى 7 د: بعد إضافة الناقل  $\text{TH}_2$  إلى المعلقين، النسبة المئوية للـ  $\text{O}_2$  تبقى ثابتة 100 % في معلق الشخص المصاب بالعمق، وتتناقص في معلق ميتوكوندريات الشخص السليم بشكل سريع حتى تکاد تندم في الدقيقة 7.

تستنتج أن ميتوكوندريات الشخص (س) المصاب بالعمق ليست قادرة على أكسدة الناقل المرجعة ولا تُنتج كمية من الـ ATP كافية لحركة ناطفة.

##### 2- اقتراح فرضيات

- إنزيم أكسدة الناقل المرجعة غير وظيفي.
- أحد نوافل الإلكترونات في السلسلة التنفسية غير وظيفي.
- الإنزيم ATP مستثناً غير وظيفي.

#### الجزء الثاني


##### 1- عدد الجزيئات

$\text{CO}_2$	نواتل مرجة	ATP	المفتر	المرحلة
/	$2\text{NADH} \cdot \text{H}^+$	2	هيولى	1- تحمل سكري
2	$2\text{NADH} \cdot \text{H}^+$	/	مادة أساسية للميتوكوندري	2- خصوة تضليلية حلقة كريبيس
4	$6\text{NADH} \cdot \text{H}^+$ $2\text{FADH}_2$	2	مادة أساسية للميتوكوندري	3- حلقة كريبي


##### 2- شرح آلية تحمل الـ ATP والمحصلة الطاقوية

##### آلية تحمل الـ ATP

على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري، تتأكسد الناقل المرجعة  $\text{NADH} \cdot \text{H}^+$  حسب المعادلة التالية:



**السلسلة التفافية**  
تنقل الإلكترونات الناتجة في التوابل (T1, T2, T3, T4, T5) تلقائياً من كمون أكسدة وإرجاع منخفض إلى كمون أكسدة وإرجاع مرتفع.  
يستقبل O<sub>2</sub> الإلكترونات ويرجع ويرتبط مع البروتونات الموجودة في المادة الأساسية لتشكيل جزيء الماء حسب المعادلة:



انتقال الإلكترونات في السلسلة التفافية تحرر منه طاقة تستعملها التوابل T1, T3, T5 في ضخ البروتونات من المادة الأساسية نحو الفراغ بين الغشائين عكس تدرج تركيزها فينشأ تدرج في تركيز البروتونات. تستقبل البروتونات المتراكمة في الفراغ بين الغشائين إلى المادة الأساسية عبر قناة في الإنزيم ATP ستبيّن حسب تدرج تركيزها وتحفزه على فسفرة ADP إلى ATP في وجود الموسفات اللاعضوي (Pi).

#### - الحصيلة الطاقوية

- التوابل المرجحة الناتجة في مرحلة التحلل السكري:  $2 NADH.H^+ \rightarrow 2 NAD$
- التوابل المرجحة الناتجة في الخطوة التحضيرية:  $2 FADH_2 \rightarrow 2 FAD$
- التوابل المرجحة الناتجة في حلقة كرييس:  $2FADH_2 + 6NADH.H^+ \rightarrow 2FAD + 10NADH.H^+$
- الحصيلة الأولية:  $10NADH.H^+ \rightarrow 10NAD + 34ATP$
- ينتج عن أكسدة جزيئة  $FADH_2$  ثلاث جزيئات ATP.
- ينتج عن أكسدة جزيئة  $NADH.H^+$  جزيئتين ATP.
- الحصيلة الطاقوية:  $(3 \times 10) + (2 \times 2) = 34ATP$
- 3- التفسير مع إبراز مدى توافق المعلومات مع إحدى الفرضيات


الدواء الذي قيل للشخص (س) المصاب يعمل نفس عمل ناقل الإلكترونات T<sub>2</sub> حيث يستقبل الإلكترونات الناتجة من أكسدة الناقل T<sub>1</sub> وينقلها للرجوع الناقل T<sub>2</sub> المؤكسد وهذا بشكل دوري. تستمر تعاملات السلسلة التفافية التي تبدأ بأكسدة التوابل المرجحة وتنتهي بإرجاع ثاني الأكسجين. تسبب هذه التعاملات في نشأة تدرج في تركيز البروتونات وتحفيز الإنزيم ATP ستاز على فسفرة ADP إلى ATP وبالتالي يتم تشكيل ATP الذي تستعملها النطاف في حركتها الطبيعية لتصل إلى البوصلة وتلقيها وبما في ذلك الشخص المصاب من العقم.

- إبراز مدى توافق المعلومات المتوصل إليها مع إحدى الفرضيات السابقة توافق المعلومات المتوصل إليها مع الفرضية المقترنة رقم 1 التي تقول بأن أحد نوائل السلسلة التفافية غير وظيفي ونرصلنا في الدراسة أنه الناقل T<sub>2</sub>.


#### الجزء الثالث

#### شرح العلاقة


يتم هدم مادة الأيض في الخلية في ثلاث مراحل:  
التحلل السكري (الغلكتوز) في الحيوان: ليس لها علاقة باستهلاك O<sub>2</sub> وتحدث في وجوده وفي غيابه.  
يتم فيها تحويل الغلوكوز إلى حمض البيروفيك حسب المعادلة التالية:



**السلسلة الفضية**  
الخطوة التحضيرية وحلقة كرييس في المادة الأساسية للميتوكوندري: لها علاقة غير مباشرة باستهلاك O<sub>2</sub>, فهو ضروري لحدوث الفسفرة التأكسدية التي يتم فيها تجديد التوابل المرجحة NAD<sup>+</sup> و FAD<sup>+</sup> NAD<sup>+</sup> FAD<sup>+</sup>. تم هذه المرحلة حسب المعادلة التالية:



الفسفرة التأكسدية في الغشاء الداخلي للميتوكوندري: لا تحدث إلا في وجود O<sub>2</sub> الذي يلعب دور المستقبل الأخير للإلكترونات الناتجة عن أكسدة التوابل المرجحة (FADH<sub>2</sub>, H<sup>+</sup>) و NADH<sub>2</sub>, H<sup>+</sup>). كما يتم فيها ترکیب ATP حسب المعادلة:



تستعمل الخلايا الطاقة القابلة لاستعمال ATP الناتجة عن هدم مادة الأيض في مختلف الوظائف الحيوية من بينها: النشاط الإنزيمي، الدفاع عن الذات، الاتصال العصبي، بناء المادة الحية... الخ.

#### تمرين 02

تندفر بعض الكائنات الحية منها نوع من البكتيريا المسماة Cyanobacter بقدرتها على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة.

لفهم الآليات التي تسمح لهذه البكتيريا بالتحويل الطاقي المشار إليه نعرض الدراسة التالية:  
الجزء الأول

أخرجت سلسلة من التجارب على كائن حي وحيد الخلية (أشنة خضراء الكلوريلا):

التجربة الأولى: تعتمد هذه التجربة على معايرة نسبة 0<sub>18</sub>/0<sub>16</sub> في غاز ثاني الأكسجين خلال المراحل التجريبية التالية:


المراحل الأولى: تم تعریض معلق أشنة كلوريلا للضوء في وجود ماء غني بـ O<sub>18</sub> المشع حيث نسبة 0<sub>18</sub>/0<sub>16</sub> فيه تساوي 0.85% الذي يضاف إليه مادة NaHCO<sub>3</sub> (مصدر لCO<sub>2</sub>).

المراحل الثانية: أعيدت نفس مراحل التجربة السابقة باستعمال الماء العادي وإضافة HCO<sub>3</sub> الغنية بـ O<sub>18</sub> مشع حيث نسبة 0<sub>18</sub>/0<sub>16</sub> فيه تساوي 0.85%.

ملاحظة: نسبة 0<sub>18</sub>/0<sub>16</sub> في المركبات الكيميائية العادية: H<sub>2</sub>O و NaHCO<sub>3</sub> تساوي 0.2%

التجربة الثانية: توضع تباكيونات في وسط يحتوي على ماء عادي وحال من HCO<sub>3</sub>, يضاف له مادة DCPIP ويتابع خلال التجربة تطور تركيز O<sub>2</sub> وتغير لون الوسط.

**السلسلة النفسية**  
تنقل الإلكترونات الناتجة في التوابل (T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub>, T<sub>4</sub>, T<sub>5</sub>) تلقائياً من كمون أكسدة وإرجاع منخفض إلى كمون أكسدة وإرجاع مرتفع.  
يستقبل الإلكترونات ويتبع ويرتبط مع البروتونات الموجودة في المادة الأساسية لتشكيل جزيء الماء حسب المعادلة:



التقابل الإلكترونيات في السلسلة النفسية تحرر منه طاقة تستعملها التوابل T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub>, T<sub>5</sub> في ضخ البروتونات من المادة الأساسية نحو الفраг بين الغشائين عكس تدرج تركيزها فينشأ تدرج في تركيز البروتونات. تستقبل البروتونات المترافقمة في الفраг بين الغشائين إلى المادة الأساسية عبر قناة في الإنزيم ستينياز حسب تدرج تركيزها وتحفظ على فسفرة الـ ATP إلى ADP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi).

#### - الحصيلة الطاقوية

- التوابل المرجحة الناتجة في مرحلة التحلل السكري: 2 NADH.H<sup>+</sup>
- التوابل المرجحة الناتجة في الخطوة التحضيرية: 2 NADH.H<sup>+</sup>
- التوابل المرجحة الناتجة في حلقة كريبيس: 2FADH<sub>2</sub> و 6NADH.H<sup>+</sup>: 2FADH<sub>2</sub> 10 NADH.H<sup>+</sup> و 6H<sub>2</sub>O
- ينتج عن أكسدة جزئية ATP ثلاثة جزيئات ATP.
- ينتج عن أكسدة جزئية FADH<sub>2</sub> جزيئتين ATP.
- الحصيلة الطاقوية: (3 x 10) + (2 x 2) = 34 ATP

- 3- التقسيم مع إبراز مدى توافق المعلومات مع إحدى الفرضيات
- تقسيم آلية تأثير الدواء الذي قدم للشخص (س)

الدواء الذي قُيل للشخص (س) المصاب بعمل نفس عمل ناقل الإلكترونات T<sub>2</sub> حيث يستقبل الإلكترونات الناتجة من أكسدة الناقل T<sub>1</sub> وينقلها للرجع الناقل T<sub>2</sub> الموكسد وهكذا بشكل دوري. تستمر تفاعلات السلسلة النفسية التي تبدأ بأكسدة التوابل المرجحة وتنتهي بإرجاع ثاني الأكسجين. تتسبب هذه التفاعلات في نشأة تدرج في تركيز البروتونات وتحفيز الإنزيم ستينياز على فسفرة الـ ATP إلى ADP وبالتالي يتم تشكيل ATP الذي تستعملها النطاف في حركتها الطبيعية لتصل إلى البوسطة وتلقيها وبمفع الشخص المصاب من العقم.


- إبراز مدى توافق المعلومات المتوصّل إليها مع إحدى الفرضيات السابقة  
توافق المعلومات المتوصّل إليها مع الفرضية المقترنة رقم 1 التي تقول بأن أحد توابل السلسلة النفسية غير وظيفي وتوصلنا في الدراسة أنه الناقل T<sub>1</sub>.

#### الجزء الثالث


#### شرح العلاقة

بم هدم مادة الأيض في الخلية في ثلاث مراحل:


التحلل السكري (الغلوكوز) في الحيوي: ليس لها علاقة باستهلاك الـ O<sub>2</sub> وتحدث في وجوده وفي غيابه.  
بم فيها تحويل الغلوكوز إلى حمض البيروفيك حسب المعادلة التالية:



**الوحدة 03: حوصلة التحولات الطاقوية**  
**السلسلة النفسية**  
الخطوة التحضيرية وحلقة كريبيس في المادة الأساسية للميتوكوندري: لها علاقة غير مباشرة باستهلاك الـ O<sub>2</sub>، فهو ضروري لحدوث التسفسة التاكسدية التي يتم فيها تحديد التوابل المرجحة NAD<sup>+</sup> و FAD<sup>+</sup> الضرورية لخدوثها. تتم هذه المرحلة حسب المعادلة التالية:



التسفسة التاكسدية في الغشاء الداخلي للميتوكوندري: لا تحدث إلا في وجود الـ O<sub>2</sub> الذي يلعب دور المستقبل الأخير للإلكترونات الناتجة عن أكسدة التوابل المرجحة (NADH.H<sup>+</sup> و FADH<sub>2</sub>). كما يتم فيها تزكيب الـ ATP حسب المعادلة:



تستعمل الخلايا الطاقة القابلة لاستعمال ATP الناتجة عن هدم مادة الأيض في مختلف الوظائف الحيوية من بينها: النشاط الإلزامي، الدفع عن الذات، الاتصال العصبي، بناء المادة الحية... الخ.

#### ب- التمرير 02

تفرّد بعض الكائنات الحية منها نوع من البكتيريا المسماة *yonobacter* (اليانوباكتر) بقدرتها على تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كامنة.

لفهم الآليات التي تسمح لهذه البكتيريا بالتحويل الطاقوي المشار إليه نعرض الدراسة التالية:  
**الجزء الأول**

أجريت سلسلة من التجارب على كائن حي وحيد الخلية (أشنة خضراء الكلوريلا):  
التجربة الأولى: تعتمد هذه التجربة على معايرة نسبة 0<sup>14</sup>/0<sup>16</sup> في غاز ثاني الأكسجين خلال المراحل التجريبية التالية:  
المراحل الأولى: تم عرض معلق أشنة كلوريلا للضوء في وجود ماء غني بـ O<sup>18</sup> المشع حيث نسبة 0<sup>14</sup>/0<sup>16</sup> فيه تساوي 0.85% الذي يضاف إليه مادة NaHCO<sub>3</sub> (مصدر لـ CO<sub>2</sub>).  
المراحل الثانية: أعيدت نفس مراحل التجربة السابقة باستعمال الماء العادي وبإضافة HCO<sub>3</sub> الغنية بالـ O<sup>18</sup> حيث نسبة 0<sup>14</sup>/0<sup>16</sup> فيه تساوي 0.85%.

ملاحظة: نسبة 0<sup>14</sup>/0<sup>16</sup> في المركبات الكيميائية العادية: H<sub>2</sub>O و NaHCO<sub>3</sub> تساوي 0.2  
التجربة الثانية: توضع تيلاكتوبيدات في وسط يحتوي على ماء عادي وخال من HCO<sub>3</sub>, يضاف له مادة DPIP ويتابع خلال التجربة تطور تركيز O<sub>2</sub> وتغير لون الوسط.

الوحدة 03: حوصلة التجارب الطاقافية

السلسلة الفرضية

كمية $^{14}\text{CO}_2$ المثبتة في الجزيئات العضوية (دقة/دقيقة)	الشروط التجريبية	رقم التجربة
4000	مستخلص ستيوبلازم بكتيري في وسط مظلم + $^{14}\text{CO}_2$ (به كربون مشع)	1
43000	مستخلص ستيوبلازم بكتيري في وسط مظللم + $^{14}\text{CO}_2 + \text{ATP}$	2
97000	مستخلص ستيوبلازم بكتيري في وسط مظللم + $^{14}\text{CO}_2 + \text{ATP} + \text{RH2}$ (نواقل مرجعية)	3
96000	مستخلص ستيوبلازم بكتيري + تيلاكوبيدات معرضة للضوء في وجود $\text{ADP} + \text{Pi}$ ونواقل مؤكسدة (R) ينقل المحضر للظلام ويضاف إليه $^{14}\text{CO}_2$ (04 الوثيقة)	4

1- حلل نتائج الوثيقة (4).

2- من خلال ما سبق تتحقق من صحة الفرضية المقترنة.

**الجزء الثالث**  
باستغلال المعلومات المستخرجة مما سبق ومعارفك الخاصة. ووضح في رسم تخطيطي وظيفي مراحل التحويل الطاقوي المدرسوس على مستوى البكتيريا *Cyanobacter*.

### الإجابة النموذجية

#### الجزء الأول

##### 1- تبيين آلية طرح $\text{O}_2$

من خلال الوثيقة (1)، النسبة المئوية لـ  $\text{O}_2$  في الوسط المطلق مئالية للماء في المرحلة الأولى وتساوي 0.85 % وكذلك في المرحلة الثانية وتساوي 0.20 %. وتختلف عن نسبة 0.01% في  $\text{HCO}_3^-$ .

وهذا دليل على أن مصدر  $\text{O}_2$  المطلق هو الماء وليس  $\text{HCO}_3^-$  أي ليس  $\text{CO}_2$ .

من خلال الوثيقة (2)، في غياب مادة الـ DCPIP، تركيز  $\text{O}_2$  في معلن التيلاكوبيدات ثابت سواء في الظلام أو في الضوء. أما في وجود مادة الـ DCPIP ففي الظلام تركيز  $\text{O}_2$  ثابت والوسط أزرق أما في الضوء فيرتفع تركيز  $\text{O}_2$  ويصبح الوسط شفافاً.

إذن، في وجود الضوء، تقوم التيلاكوبيد بأكسدة الماء وطرح ثاني الأكسجين وإرجاع مستقبل الإلكترونات المادة DCPIP. تقطنق الأنظمة الضوئية PSI وPSII وPSIII وPSIV الكترونات وتتأكسد وتخرج الإلكترونات، ترجع الإلكترونات إلى PSII أو PSI. وبتآكسد الماء وتراجع الإلكتروناته إلى PSII.


علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

السلسلة الفرضية

نسبة $\text{O}_2/\text{O}_2^{14}$ (%) في المركبات الكيميائية		
$\text{O}_2$ المنطلق	$\text{HCO}_3^-$	$\text{H}_2\text{O}$
0.85	0.20	0.85
0.20	0.85	0.20

المرحلة الأولى  
المرحلة الثانية

الوثيقة 1




الوثيقة 2

DCPIP مادة تأخذ لوناً أزرقاً في الحالة المؤكسدة يرمز لها بـ A وشفافاً في الحالة المرجعة يرمز لها بـ AH.)  
النتائج الحصول عليها ممثلة في الوثائقين (1) و(2):

- باستغلالك لنتائج التجارب (1) و(2) ومعلوماتك استدل عن مصدر ثاني الأكسجين المطروح وبين آلية طرحه مدعاً إيجابيك بمعادلات كيميائية.
- لوحظ إنما إنجاز تجارب باستعمال بكتيريا *Cyanobacter* المعرضة للضوء ارتفاع نسبة غاز ثاني الأكسجين في الوسط.
- اقترح فرضية فيما يخص مصدر وآلية طرح ثاني الأكسجين.

#### الجزء الثاني


للتحقق من صحة الفرضية ختم في هذا الجزء بتحديد علاقة *Cyanobacter* بالتحويل الطاقوي المودي إلى طرح ثاني الأكسجين المذكور أعلاه، لذلك ندرج الوثائقين (3) و(4).



الوثيقة 3

344





يتجه  $\text{O}_2$  من أكسدة الماء في وجود الضوء على مستوى البكتيريا الزرقاء *Cyanobacter* لاحتواها تيلاكوبيدات.

تمثل الوثيقة أربع تجارب وتالجها أجريت على مستخلص البكتيريا الزرقاء في شروط تجريبية مختلفة.

- التجربة 01: عند وضع مستخلص ستيولازم بكتيري في وسط مظلم مضافا له  $^{14}\text{CO}_2$  كربونه مشع، يتم تركيب كمية قليلة من الجزيئات العضوية تقدر نسبة الكربون المشع فيها بـ 4000 دقة / دقيقة.

- التجربة 02: عند وضع مستخلص ستيولازم بكتيري في وسط مظلم مضافا له  $\text{ATP}$  و  $^{14}\text{CO}_2$ ، يتم تركيب كمية متوسطة من الجزيئات العضوية تقدر نسبة الكربون المشع فيها بـ 43000 دقة / دقيقة.

- التجربة 03: عند وضع مستخلص ستيولازم بكتيري في وسط مظلم مضافا له  $\text{ATP}$  و  $^{14}\text{CO}_2$  ونواقل مُركبة (RH2)، يتم تركيب كمية كبيرة من الجزيئات العضوية تقدر نسبة الكربون المشع فيها بـ 97000 دقة / دقيقة.

- التجربة 04: عند وضع مستخلص ستيولازم بكتيري مضافا له تيلاكوبيدات معرضة للضوء في وجود  $\text{ADP} + \text{Pi}$  ونواقل مُؤكسدة (R)، يتم تركيب كمية كبيرة من الجزيئات العضوية مماثلة تقريباً للتجربة 03 وتقدر نسبة الكربون المشع فيها بـ 96000 دقة / دقيقة.


نستنتج أن ثبيت  $\text{CO}_2$  في الجزيئات العضوية يتشرط توفر  $\text{ATP}$  ونواقل المرجعة التي يتم تركيبها على مستوى التيلاكوبيدات في وجود الضوء عند توفر  $\text{ADP} + \text{Pi}$  ونواقل مُؤكسدة (R).

في الجزء الأول توصلنا إلى أنه على مستوى التيلاكوبيد، وفي وجود الضوء ومستقبل للإلكترونات، تحدث أكسدة للماء وانطلاق لـ  $\text{O}_2$  وإرجاع لمستقبل الإلكترونات.

وفي الجزء الثاني توصلنا إلى أنه يتم إرجاع النواقل المرجعة على مستوى التيلاكوبيد وتركيب  $\text{O}_2$ ، وأن هذه النواقل تُستعمل في ثبيت  $\text{CO}_2$  وتركيب الجزيئات العضوية.


ومن هنا نستنتج وجود مرحلتين لهذا التحويل الطاقوي، مرحلة أولى يتم فيها أكسدة للماء وانطلاق  $\text{O}_2$  وإرجاع النواقل وتركيب  $\text{ATP}$  وتسمى بالمرحلة الكيموحبية. ومرحلة ثانية يتم فيها ثبيت  $\text{CO}_2$  ودمجه في الجزيئات العضوية وتشترط نواج المرحلة السابقة وتسمى المرحلة الكيموذوالية. ومن الوثيقة (03) وجدنا أن البكتيريا تحوي تيلاكوبيدات.

وهذا يؤكد صحة الفرضية المقترنة وهي مصدر الأكسجين المنطلق هو الماء وليس  $\text{CO}_2$ ، وأالية طرح هي أكسدة الماء على مستوى التيلاكوبيدات في وجود الضوء في المرحلة الكيموذوالية.



- أ- فسر النتائج التجريبية الممثلة بالشكل (1) من الوثيقة (02) مع إبراز نواتج المرحلة المعنية.  
 ب- لخص بمعادلات كيميائية مختلف التفاعلات التي تسمح بتشكيل نواتج هذه المرحلة.  
 2- باستغلال نتائج التجربة 2، استنتج المرحلة المعنية من الظاهرة المدروسة، مقرها وشروط حدوثها.

**الجزء الثالث**  
 من خلال نتائج الدراسة السابقة ومعلوماتك المكتسبة أخيراً ر بما تحظطليا وطبقاً تبرز فيه العلاقة بين مراحل الظاهرة المعنية في هذه الدراسة.



- 1- الشكل (1) من الوثيقة (01) يمثل التركيب التجريبي والنتائج الحصول عليها باستعمال معلق للصانعات الخضراء.  
 أ- استخرج المعلومات التي تقدمها نتائج تجربة الشكل (1) من الوثيقة (01). مسمياً الظاهرة المدروسة.  
 ب- اكتب المعادلة الإجمالية التي تغير عن الظاهرة المدروسة.  
 2- الشكل (2) من الوثيقة (01) يمثل نتائج تجربة لدراسة على أشنة خضراء (الكلوريليا) في وسط مناسب غني بـ  $\text{CO}_2$  وفي درجة حرارة ثابتة مع تعريضه لفترة إضاءة قوية ثم نقله إلى الظلام مع قياس كمية  $\text{CO}_2$  المنشطة.  
 - حلل النتائج الممثلة بالشكل (2).

**الجزء الثاني:** لتحديد بعض تفاعلات ونتائج مراحل الظاهرة السابقة نستعرض التجاريتين التاليتين:

**التجربة 1:** يُعرض معلق من الصانعات الحضراء في درجة حرارة  $25^{\circ}\text{C}$  لشدة إضاءة مختلفة، يتم إيقاف التفاعلات الحيوية بعد كل 3 دقائق وبقياس تركيز كل من  $\text{CO}_2$ ،  $\text{ATP}$ ،  $\text{ADP}$ ، المركب  $R$  مؤكداً (مستقبل الكترونات) وتركيز غاز  $\text{O}_2$ . النتائج موضحة في الشكل (1) من الوثيقة (02).

**التجربة 2:** عرضت صانعات معزولة لشدة إضاءة مثلى ولدمة كافية في وجود  $\text{CO}_2$  ثم تم قياسها.

رُوِّدت الحشوة بـ  $\text{CO}_2$  ذي الكربون المشع، الشروط التجريبية والنواتج مماثلة بالشكل (2) من الوثيقة (02).

## الإجابة المودعة

## الجزء الأول

## 1- المعلومات المستخرجة


- في وجود الضوء، ترکب الصانعات الخضراء سكر الغلوكوز  $C_6H_{12}O_6$ .

- مصدر الكربون في الغلوكوز هو ثاني أكسيد الكربون  $CO_2$ .

- مصدر الأكسجين المنطلق هو الماء  $H_2O$ .

نسمة الظاهرة: التركيب الضوئي.

## بـ المعادلة الإجمالية



## 2- تحليـل المـتحـف

يمثل المـتحـف تـغـير كـمـيـة  $CO_2$  المـشـتـرـكـة بـالـوـحـدـة الـاعـتـارـيـة بـدـلـالـة الزـمـنـ بـالـثـانـيـةـ.

- في إضـاءـة قـوـيـة مـلـدـة 20 دـقـيـقة: يـثـبـت  $CO_2$  كـمـيـة مـعـتـرـة وـثـابـةـ.

- في الـظـلـامـ: تـنـاقـصـ كـمـيـة  $CO_2$  المـشـتـرـكـة تـدرـيجـاـ حـتـى تـكـادـ تـنـعدـ بـعـدـ حـوـالـيـ 17 ثـانـيـةـ.

إذـنـ، يـثـبـت  $CO_2$  لـا يـشـرـطـ وـجـودـ الضـوـءـ بـشـكـلـ مـباـشـرـ، وـلـكـهـ بـشـرـطـ تـوـافـعـ المـرـاحـلـ الـتـيـ تـنـمـ فيـ وـجـودـ الضـوـءـ.

تـسـتـخـدـمـ الـعـلـيـةـ التـرـكـيـبـ الضـوـئـيـ تـنـمـ فيـ مـرـاحـلـيـنـ، مـرـاحـلـ تـشـرـطـ الضـوـءـ تـسـمـيـ المـرـاحـلـ الـكـيـمـوـضـوـئـيـةـ وـمـرـاحـلـ لـا يـشـرـطـ الضـوـءـ تـسـمـيـ المـرـاحـلـ الـكـيـمـوـجـيـوـيـةـ.

## الجزء الثاني

## 1- تـفـسـيرـ النـتـائـجـ

- النـتـيـجـةـ 1ـ: يـرـتفـعـ تـرـكـيزـ  $O_2$  وـيـنـاقـصـ تـرـكـيزـ مـسـتـقـلـ لـلـإـلـكـتـرـوـنـاتـ معـ زـيـادـةـ شـدـةـ الإـضـاءـةـ.


- تـفـسـيرـهاـ: فـيـ وـجـودـ الضـوـءـ، وـمـسـتـقـلـ لـلـإـلـكـتـرـوـنـاتـ مـؤـكـسـدـ وـالـADP~Piـ تـحـدـدـ تـفـاعـلـاتـ المـرـاحـلـ الـكـيـمـوـضـوـئـيـةـ منـ التـرـكـيـبـ الضـوـئـيـ. يـنـاـكـسـدـ المـاءـ وـيـنـجـعـ عـنـ اـنـطـلـاقـ  $O_2$  فـيـرـتفـعـ تـرـكـيزـهـ فـيـ الـوـسـطـ. تـنـقـلـ المـؤـكـسـدـ فـيـنـاقـصـ تـرـكـيزـهـ فـيـ الـوـسـطـ.

- النـتـيـجـةـ 2ـ: يـنـاقـصـ تـرـكـيزـ  $ADP$  وـيـرـتفـعـ تـرـكـيزـ  $ATP$  معـ زـيـادـةـ شـدـةـ الإـضـاءـةـ.

- تـفـسـيرـهاـ: تـنـاـكـسـدـ الـبـرـوتـوـنـاتـ النـاتـجـةـ عـنـ أـكـسـدـةـ المـاءـ وـالـيـ يـضـخـحـاـ النـاقـلـ T2ـ أـنـتـاءـ اـنـتـالـ الـإـلـكـتـرـوـنـاتـ فيـ السـلـسـلـةـ الـتـرـكـيـبـ الضـوـئـيـةـ فـيـ تـحـوـيـلـ الـكـيـسـ وـيـسـبـحـ تـرـكـيزـهـ فـيـ أـكـبـرـ مـنـ الـوـسـطـ، فـتـدـفـقـ عـبـرـ الـازـمـ ATPـ سـيـتـيـازـ وـخـفـرـهـ عـلـىـ فـسـفـرـةـ الـA~T~Pـ إـلـىـ  $ADP$ ـ فـيـنـاقـصـ تـرـكـيزـ  $ADP$ ـ وـيـرـتفـعـ تـرـكـيزـ  $ATP$ ـ.

- وـشـدـةـ تـفـاعـلـاتـ المـرـاحـلـ الـكـيـمـوـضـوـئـيـةـ المـذـكـورـةـ تـعـلـقـ بـشـدـةـ الضـوـءـ، فـعـنـدـمـاـ تـسـتـقـبـلـ الـأـنـظـمـةـ الضـوـئـيـةـ كـمـيـةـ أـكـبـرـ مـنـ الـقـوـيـونـاتـ تـنـاـكـسـدـ بـسـنةـ أـكـبـرـ وـتـرـيدـ شـدـةـ التـفـاعـلـاتـ: أـكـسـدـةـ المـاءـ وـطـرـحـ  $O_2$ ـ، إـرـجـاعـ مـسـتـقـلـ الـإـلـكـتـرـوـنـاتـ المـؤـكـسـدـ وـفـسـفـرـةـ الـA~T~Pـ إـلـىـ  $ADP$ ـ.

- نـوـاجـ المـرـاحـلـ الـمـعـنـيـةـ:  $O_2$ ـ مـنـطـلـقـ،  $ATP$ ـ،  $NADPH_2^+$ ـ.



## بعض التمرين 04


تختصص عضيات خلوية مثل الصانعة الخضراء والميتوكوندري في توفير طاقة قابلة للاستعمال وفق شروط يطلب تحديدها من خلال الدراسات التالية:

## الجزء الأول

1- عززت صانعات خضراء مفتوحة الغلاف ووضعت في وسط خال من  $\text{CO}_2$  ومعرضة للضوء بضاف إليه باستمرار  $\text{NADP}^+$  و  $\text{Pi}$ . فلاحظ انطلاق  $\text{O}_2$ ، إلا أنه لم يتم اصطناع جزيئات عضوية. إذا أعيدت التجربة السابقة مع إضافة كمية محددة من  $\text{CO}_2$  و  $\text{NADP}^+$  و  $\text{Pi}$ ، فإنه بعد مدة يتوقف انطلاق  $\text{O}_2$ . وعند تزويد الوسط بـ  $\text{O}_2$  يتطلق  $\text{O}_2$  من جديد ويتم بناء المادة العضوية.

أنشئ علاقة بين المواد المضافة وانطلاق  $\text{O}_2$  وتركيب المادة العضوية.

2- في تجربة أخرى وضع معلق تيلاكوبيدات في أنبوب اختبار يحتوي على وسط حيوي تركيبه مماثل للستروما وعرض للضوء ثم قيس تغير قيمة  $\text{pH}$  في كل من تجويف التيلاكوبيدات والوسط الحفيظ بما. النتائج المتحصل عليها توضحها الوثيقة (01).



أ- انساب كل منحني إلى الوسط المناسب له.


ب- فسر تغير قيم  $\text{pH}$ .

ج- إذا علمت أن تغير قيم  $\text{pH}$  يرافعه إنتاج  $\text{ATP}$ ، اقترح فرضية تفسر بما تشكل  $\text{ATP}$ .

الجزء الثاني  
مثل الوثيقة (02)آلية تشكيل الطاقة القابلة للاستعمال على مستوى ما فوق بنية الصانعة الخضراء والميتوكوندري.

## الوحدة 03: حوصلة التحولات الطاقوية

## السلسلة الفقهية



## الوثيقة (2)

- 1- سم الظاهرة المواقعة لكل شكل من شكلي الوثيقة (02).
- 2- تحقق من صحة الفرضية المقترنة في الجزء 1.

## الجزء الثالث

- استدل بمعطيات الوثيقة (02) كي تثبت بأن الظاهرتين الممثلتين بشكلي الوثيقة (02) هما ظاهرتان متباينتان.

## الإجابة النموذجية

## الجزء الأول

## 1- العلاقة

في وجود الضوء و  $\text{NADP}^+$  و  $\text{Pi}$  تم مرحلة كيموضوئية ينتج عنها انطلاق  $\text{O}_2$  وتشكل  $\text{ATP}$  و  $\text{NADPH}$ . تشكل المادة العضوية أثناء المرحلة الكيموضوئية يتم بإدخال  $\text{CO}_2$  باستعمال نواتج المرحلة الكيموضوئية.

## 2- مواقعة المحتوى 1

بوافق الوسط الحفيظ المماثل للستروما.  
المتحنى 2 بوافق تجويف التيلاكوبيد.

## ب- التفسير

إن تعرض التيلاكوبيدات للضوء تتحفز الأنظام الضوئية وتحلل الماء ضوئياً، تنتقل الألكترونات عبر السلسلة التركيبية الضوئية إلى أن تصل إلى المستقبل  $\text{NADP}^+$ . تحرر طاقة تستعمل في ضخ  $\text{H}^+$  نحو تجويف التيلاكوبيد مما يؤدي إلى تناقص تركيز  $\text{H}^+$  في الوسط الحفيظ المماثل للستروما. يرقق ذلك بتراكم  $\text{H}^+$  وزياحة تركيزه في تجويف التيلاكوبيد.

## ج- اقتراح فرضية

خروج البروتونات المتراكمة في تجويف التيلاكوبيدات من التجويف إلى الستروما يؤدي إلى تشكيل  $\text{ATP}$ .  
تفيد أي فرضية وجيهة.

## الجزء الثاني

## 1- تسمية الظاهرة

الممثلة في الشكل (أ): فسفرة ناكسدة.

الممثلة في الشكل (ب): فسفرة ضوئية.

## 2- التحقق من صحة الفرضية

يبين الشكل (ب) من الوثيقة (02) أن تراكم  $H^+$  وزيادة تركيزه في تجويف البلاكوبود يؤدي إلى ظهور تدرج كهروكيميائي يولد كمونا غشائيا محركا ينقل البروتونات عبر الكربات المذنبة، مما يؤدي إلى فسفرة ADP إلى ATP بتدخل الإنزيم ATP ستاز، وهو ما يؤكد صحة الفرضية.

## الجزء الثالث

في كلا الظاهرتين تسجل حدوث ما يلي:

- حدوث أكسدة.

- انتقال إلكترونا عبر نظام أكسدة وارجاع لتصل إلى مستقبل محالي.

- تغير طاقة.

- الطاقة الحرارية تستعمل في ضخ  $H^+$  من الوسط الأقل حرارة إلى الوسط الأعلى حرارة من جهة من الغشاء إلى الجهة الأخرى.

- حدوث تراكم  $H^+$  في الجهة الأخرى.

- ظهور تدرج كهروكيميائي يولد كمون غشائي محرك ينقل البروتونات عبر الكربات المذنبة.

- تحدث فسفرة لـ ADP وتشكل الـ ATP بتدخل الإنزيم ATP ستاز.

فالظاهرتان المذكورة متسابقات (فسفرتان تسمحان بتركيب الـ ATP).

## نحو التعبير 05

يمثل التنفس الخلوي مجموعة من التفاعلات التي تمكن الخلايا من إنتاج ATP، ويتم جزء منها في الميتوكوندري.


تعرف هذه التفاعلات أحياناً اضطرابات إثر التعرض لبعض المواد الكيميائية مثل L'antimycine A وهو مضاد حيوي تنتجه بعض الفطريات (فطر Streptomyces) يؤدي تعرض الإنسان لهذه المادة إلى انعكاسات خطيرة على مستوى الأيض الطاقوي للخلايا، لتحديد كيفية تأثير antimycine A نقترح المعطيات الآتية:

## الجزء الأول

تمت إضافة معلق من الميتوكوندريات لوسطين 1 و 2 غنيين بشانى الأكسجين وبمحاذات على ADP و Pi، مع الحفاظ على استقرار  $pH$  في قيمة 7.5 في هذين الوسطين.

- في الوسط 1: تم تتبع تطور تركيز كل من ثانى الأكسجين وATP قبل وبعد ضافة حمض البيروفيك، ويوضح الشكل (أ) من الوثيقة (01) النتائج المحصلة.

- في الوسط 2: تم تتبع تطور تركيز ثانى الأكسجين قبل وبعد إضافة كل من حمض البيروفيك في الزمن 1 و مادة antimycine A في الزمن 2، ويوضح الشكل (ب) من الوثيقة (01) النتائج المحصلة.




- حل النتائج المحصلة في الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة (01).
- اقتصر فرضية تفسر العلاقة بين مادة antimycin A و إنتاج ATP.


## الجزء الثاني

لإثبات صحة الفرضية نقترح ما يلي:

يحتوي الغشاء الداخلي للميتوكوندري على مركبات بروتينية تشكل السلسلة التنفسية، توضح الوثيقة (02) تسلسل تفاعلات أكسدة - ارجاع التي تحدث خلال انتقال الإلكترونات عبر مركبات السلسلة التنفسية وموقع تأثير مادة antimycin A.




الجزء الثالث  
الرسم التخطيطي



كفر التمرين

تقوم الخلايا العضلية بتركيب جزيئات الـ **ATP** الضرورية للقيام بالجهود العضلية باعتماد طرق أيضية هوائية وأخرى لاهوائية (غمر لبني) عند الاحتياج الكبير للطاقة، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يحدث خلل على مستوى الميتوكوندري، عند بعض الأشخاص، ينجم عن هذا الخلل مجموعة من الأعراض من بينها



بالاستعانة بالوثيقة (٠١)، حدد مصدر حمض البيروفيك على مستوى الخلية ثم احسب الحصيلة الطاقوية (عدد جزيئات ATP) لعدم حمض بيروفيك واحد داخلي المترافق تدري.

علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

السلسلة المعرفية

- ١- حدد العلاقة بين منحني انتقال الإلكترونات وكمون أكسدة إرجاع لمختلف مركبات السلسلة التقفسية.

٢- فسر تأثير إضافة المادة Antimycine A على إنتاج ATP من طرف الخلايا ثم تأكيد من صحة الفرضية المقترنة.

الجزء الثالث

لاجابة التمهذحة

الجزء الاول

١٠ - التحليل

- قبل إضافة حمض البيروفيك: استقرار تركيز  $O_2$  في قيمة UA 100 وتركيز ATP في قيمة 30.
- بعد إضافة حمض البيروفيك: انخفاض تركيز  $O_2$  في قيمة UA 35 وارتفاع تركيز ATP ليصل القيمة 100.

- بعد تقاد حمض البيروفيك: استقرار تركيز  $O_2$  في قيمة 35 UA وتركيز ATP في قيمة 100 UA.

- قبل الزمن 11 كان تركيز  $O_2$  شبه مستقرًا في قيمة 100 UA.
- عند إضافة حمض البيروفيك في الزمن 11: انخفض تركيز  $O_2$  ليصل إلى 40 UA.
- بعد إضافة مادة Antimycine A في الزمن 12: استقرار تركيز  $O_2$  في قيمة تقارب 40 UA.
- الاقتراح: فرضية تفسير العلاقة بين Antimycine A واتجاه ATP.

**Antimycine A** تفاعلات الأكسدة التنفسية التي تسمح بإنتاج ATP على مستوى الميتوكوندريات.

الجزء الثاني

- نتقال الإلكترونات غير تناقل السلسلة التنفسية في منحي كمون أكسدة إرجاعية متزايد.
- ينكح مادة Antimycine A الناقل T3 للسلسلة التنفسية مما يؤدي إلى منع انتقال الإلكترونات نحو المستقبل النهائي  $O_2$  ومنه عدم إرجاع  $O_2$  إلى  $H_2O$  وبالتالي عدم استهلاك  $O_2$  (الشكل ب الوثيقة 1).
- يوجد مادة Antimycine A وكبح تدفق الإلكترونات في مستوى السلسلة التنفسية يؤدي إلى توقف ضخ البروتينات  $H^+$  من المادة الأساسية ياخوه الفراغ بين الغشائين ومن ثم عدم تشكيل تدرج في تركيز البروتينات  $H^+$  نحو المادة الأساسية مما يمنع تركيب ATP. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترنة " ينكح Antimycine A تفاعلات الأكسدة التنفسية التي تسمح بإنتاج ATP على مستوى الميتوكوندريات "

## الجزء الثاني

لعلاج بعض الأمراض الفيروسية يتم استعمال مادة (INTI) (inhibiteur de la transcriptase inverse) INTI، ينبع عن العلاج بهذه المادة خلل في إنتاج الطاقة من طرف الميتوكوندريات مما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض من بينها الشعور بالغباء وتغير تركيز حمض اللبني في الدم، يقدم الجدول في الوثيقة (02) نتائج قياس تركيز حمض اللبني الشائع من طرف الخلايا وقيمة  $\text{pH}$  في الدم مع رسوم تفسيرية لميتوكوندريات عند شخصين أحدهما معاج مادة INTI والأخر غير معاج.


رسوم تفسيرية للميتوكوندريات	pH الدم (في حالة راحة)	تركيز حمض اللبني في الدم (في النز)	الشخص غير المعاج مادة INTI
	عادي	Immole	الشخص غير المعاج مادة INTI
	حيضي	أكثر من 5mmole في النز	الشخص المعاج مادة INTI

النقطة الظاهرة في الميتوكوندريات هي صفت من بروتينات السلسلة التنفسية في الغشاء الداخلي للميتوكوندري

## الوثيقة (02)

1- انطلاقاً من معلومات جدول الوثيقة (02) قارن بين النتائج الحصولة عند الشخص المعاج والشخص غير المعاج مادة INTI مستنداً على الأيضي الذي يتأثر بهذه المادة.

2- داء MELAS هو نوع من المرض العصلي المرتبط بخلل على مستوى الميتوكوندريات، من بين أعراضه تراكم الحمض اللبني في الدم والشعور بالغباء عند القيام بأدنى جهد عصلي، تقدم الوثيقة (03) رسمياً توضيحياً لموقع الخلل المرتبط بهذا الداء على مستوى الميتوكوندريات.



- بالاستعانة بالوثيقة (03) فسر آلية تركيب ATP على مستوى العشاء الداخلي للميتوكوندري في الحالة العادية ثم بين تأثير الخلل الملاحظ عند الشخص المصابة بداء MELAS على هذه الآلية.

## الجزء الثالث

باستغلال المعلومات السابقة أخيراً خلاصة توضح من خلالها أن الطريق الأيضي السائد في الحالتين (حالة استعمال مادة INTI وحالة داء MELAS) هو التخمر اللبني مفسراً الأعراض الملاحظة في الحالتين.

## الإجابة النموذجية

## الجزء الأول

مصير حمض البيروفيك على مستوى الخلية


- تحول حمض البيروفيك إلى حمض لبني على مستوى هيول الخلية.
- أكسدة حمض البيروفيك في الميتوكوندري إلى أستيل مرافق الأنزيم ثم هدمه كلياً على مستوى المادة الأساسية (حلقة كرييس).

- الحضيلة الطاقوية لدم جزيرة واحدة من حمض البيروفيك داخل الميتوكوندري:  

$$(4 \text{ NADH}, \text{H}^+) + (1 \text{ FADH}_2) + (1 \text{ ATP}) = (4 \times 3 \text{ ATP}) + (1 \times 2 \text{ ATP}) + (1 \text{ ATP}) = 15 \text{ ATP}$$

استجابة العضلة للتبهيات	نتائج المعايرة بـ mg من ATP في كل g من عضلة طرية		المادة المعايرة	حالة عضلة الضفدع
	قبل التقclus	بعد التقclus		
تبقي العضلة متقلصة طبلة فتره التبئه	1.35	1.35	ATP	عضلة غير محقونة بالأوليغومسين
توقف العضلة عن التقclus بعد وقت قصير من بداية التبئه رغم استمرار تطبيق التبيهات.	0	1.35	ATP	عضلة محقونة بكمية مهمة من الأوليغومسين

الوثيقة (01)



الوثيقة (2)

- اعتماداً على تحليلك لنتائج التجربة 2 ومعلوماتك اقترح فرضية لتفسير تأثير الأوليغومسين في التجربة ١.

### الجزء الثاني

للحتحقق من مدى صحة الفرضية المقترحة نقترح ما يلي:

التجربة 3: لتحديد موقع تأثير مادة الأوليغومسين على مستوى الميتوكوندري، تم عزل ميتوكوندريات بواسطة تقنية الطرد المركزي وتعریضها لنّاشر الموجات فوق الصوتية، فتم الحصول على حويصلات مزرودة بكرات مذنبة على مستوى جهتها الخارجية، أخذت عينة من هذه الحويصلات لتنقية خاصة تمكّن من إقصاء الكرات المذنبة ثم وضعت الحويصلات في وسط تجربتي ملائم يحتوى على ثانى الأكسجين وعلى مركبات غازية  $RH_2$  (ناقل للهيدروجين) إضافة إلى  $ADP+Pi$ ، يقدم جدول الوثيقة (03) نتائج تبع بعض الظواهر التنفسية.

### الجزء الثاني

#### 1- المقارنة

- تركيز الحمض البني في الدم في حالة راحة عند الشخص المعالج يفوق تركيزه عن الشخص غير المعالج.
  - pH الدم عند الشخص المعالج حمضي مقارنة مع pH الدم عند الشخص غير المعالج.
  - ميتوكوندريات الشخص المعالج تتميز بقلة الأعراض وبروتينات السلسلة التنفسية مقارنة مع الشخص غير المعالج.
- نستنتج أن الطريق الأيضي الذي يتأثر بمادة INTI هو التنفس الخلوي.

#### 2- تفسير تركيب ATP في الحالات العاديّة

- تباين  $NADH, H^+$  و  $FADH_2$  تتدفق الإلكترونات عبر عناصر السلسلة التنفسية وتضخ البروتينات  $H^+$  نحو الفراغ بين الغشاءين مما يؤدي إلى تشكيل تدرج في تركيز  $H^+$  نحو المادة الأساسية للميتوكوندري. دخول  $H^+$  من الفراغ بين الغشاءين إلى المادة الأساسية عبر الكرات المذنبة فيما تركيب  $NADH, H^+$  فيحدث تأثير الخلل الملحوظ: الناقل A للسلسلة التنفسية غير وظيفي فيفع ذلك أكسدة  $ATP$ .

### الجزء الثالث

الطريق الأيضي السادس في الحالتين:

- سواء بالنسبة للأشخاص المعالجين ، INTI أو الأشخاص المصابين بداء MELAS ، هناك خلل على مستوى الميتوكوندريات.
- الخلل في هدم حمض البيروفيك على مستوى الميتوكوندري وتحوله إلى حمض لبني على مستوى هبوب الخلية، فالطريق السادس هو التحمر البني.
- زيادة التحمر البني تؤدي إلى تراكم الحمض البني مسببة زيادة حموضة الدم وتركيب كمية ضعيفة من  $ATP$  مما يحدث الشعور بالعياء.

### بعض التمارين 07


يتسبب استعمال بعض المضادات الحيوانية كالأوليغومسين Oligomycine في ظهور عياء عضلي عند الشخص المعالج بهذه المادة، لفهم سبب ظهور هذا العياء العام، نقترح المطاعيم التجريبية التالية:

#### الجزء الاول

التجربة 1: وضع عضلة فخذ ضفدعه في وسط تجربتي مناسب ثم حققت بكمية مهمة من مادة الأوليغومسين، بعد ذلك تم تبييجها خلال مدة كافية بتبيهات فعالة، ثمت معايرة جزيئات  $ATP$  في العضلة، قبل وبعد التقclus، يلخص جدول الوثيقة (01) الناتج الحوصلة.

التجربة 2: بعد توفير وسط ملائم يحتوى على حمض البيروفيك وثنائي الأكسجين، أضيف إليه على التوالي:

- في الزمن ١: ميتوكوندريات.
- في الزمن ٢: كمية مهمة من  $ADP+Pi$
- في الزمن ٣: كمية من الأوليغومسين بعد مدة قصيرة من ٢.



## به التمارين 08

تعتبر الـ ATP جزيئية استقلالية (أيضية) ضرورية للنشاط الخلوي، وتتجدد الخلايا الحية جزيئات ATP انطلاقاً من أكسدة الجزيئات العضوية عن طريقين استقلابيين مختلفين. فصدق تفسير اختلاف مستعمرات سلالتين P و G لحميراة الخنزير وعلاقته بالطريق الاستقلالي المعتمد في تحديد ATP، نقترح الدراسة التالية:

**الجزء الأول**  
تم زرع سلالتي الحمراء P و G في علبتي بترى متضالبتين في وسط جيلوزي تام به 5% غلوكوز وغلي بشيلي الأكسجين، ثم وضعتا في درجة حرارة ثابتة، تبين الوثيقة (01) مظاهر مستعمرات الخماائر في بداية ونهاية هذا الزرع.

الوسط التجاري به حويصلات تحوي كرات مذنبة		الظاهرة التي تم تتبعها	
الوسط التجاري به حويصلات بدون كرات مذنبة	وجود الأوليغومسين	في غياب الأوليغومسين	الظاهرة التي تم تتبعها
+	+	+	إعادة أكسدة RH2
-	-	+	ATP إنتاج
(+): حصول الظاهرة		(-): عدم حدوث الظاهرة	
الوثيقة (03)		الوثيقة (03)	

- اعتماداً على نتائج التجربة 3:
- 1- حدد معللاً إيجابتك موقع تأثير مادة الأوليغومسين ثم تأكيد من صحة الفرضية المقترنة.
- 2- اقترح تفسيراً لسبب ظهور العداء عند استعمال كمية كبيرة من الأوليغومسين.

## الجزء الثاني

آخر رسمًا تخطيطياً توضح من خلاله مقر تأثير الأوليغومسين.

## الإجابة المودجة

الجزء الأول  
التحليل

- تستهلك الميتوكوندري ثالثي الأكسجين.
- تستهلك تفاعلات تجديد ATP كمية كبيرة من ثالثي الأكسجين.
- يوقف الأوليغومسين استهلاك ثالثي الأكسجين.

نستنتج أن الأوليغومسين يتأثر على تفاعلات الأكسدة التنفسية داخل الميتوكوندري.

ترتبط إنتاج ATP بتفاعلات الأكسدة التنفسية على مستوى الميتوكوندري، يؤثر الأوليغومسين على تفاعلات السفرة الناكسدية المولدية إلى إنتاج ATP.

## الجزء الثاني


- 1- موقع تأثير مادة الأوليغومسين والتحقق من الفرضية  
يتأثر مادة الأوليغومسين على مستوى الكربات المذنبة، بحيث تلاحظ عدم إنتاج ATP في الوسط الذي لا يحتوي على كربات مذنبة وفي الوسط الذي يحتوي على الأوليغومسين. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.  
يؤثر الأوليغومسين على تفاعلات السفرة الناكسدية المولدية إلى إنتاج ATP.

## 2- التفسير

عند استعمال كمية مهمة من الأوليغومسين، يظهر العداء نتيجة نقص في تركيب ATP الضروري للنقل العصلي، لأن الأوليغومسين تعيل عمل الكرات المذنبة الضرورية للفسفرة الناكسدية المولدية إلى تركيب ATP.

## الوحدة 03: حوصلة التحولات الطاقوية


السلة المقصبة



الشكل (ب)

الوثيقة (02)

**تجربة 2:** تم وضع مادة **triphenyl-tetrazoium** على مستعمرات خافر كل من السلالة P والسلالة G بالموازاة مع ذلك تم قياس كمية ATP المنتجة من طرف السلالتين P و G وحساب المردود الطاقوي لكل منها، نقدم الوثيقة (03) للنتائج الحصولة.



**ملاحظة:** تستعمل مادة **triphenyl-tetrazoim** من طرف الخافر كمستقبل ثانوي للكبرونات السلسلة التقسيبة في الميتوكوندريات عوض ثانوي الأكسجين، فتحتل تعطى مركب أحمر يدعى **formazon**.

الوثيقة (03)

- استدل بعضاً من الوثائقين (03) و (04) لإثبات صحة الفرضية.
- الجزء الثالث

اعتماداً على ما سبق ومعلوماتك، لخص كيفية حصول الخافر G و P على الطاقة وعلاقة ذلك بتكتائراها.

الإجابة النموذجية

الجزء الأول

- تكتائر خافر كل من السلالتين P و G وتكون مستعمرات.
- حجم مستعمرات السلالة G أكبر من حجم مستعمرات السلالة P.
- فرضية منطقية:

## مظهر مستعمرات الخافر

نهاية الزرع	في بداية الزرع	السلالة P	السلالة G
			(01) الوثيقة

1- علماً أن مستعمرة الخميرة ناتجة عن تكاثر خلايا الخميرة:

- من مقارتك للنتائج الحصول عليها اقترح فرضية لنفس الاختلاف الملاحظ بخصوص مستعمرات السلالتين P و G في علاقتها بالطريق الأيضي.
- الجزء الثاني

قصد تفسير الاختلاف الملاحظ وعلاقته بالأيض الخلوي وإثبات صحة الفرضية نقدم ما يلي:

**تجربة 1:** تم زرع كل من السلالتين P و G في وسطين جيلوزين خاليين من الغلوكوز وغنين بشاني الأكسجين في درجة حرارة ثابتة، ثم تم قياس تطور تركيز ثاني الأكسجين قبل وبعد إضافة نفس كمية الغلوكوز إلى وسطي الزرع. يوضح الشكل (أ) من الوثيقة (02) النتائج الحصولة. مكنت ملاحظة خافر السلالتين المذروستين بالغير الإلكتروني في نهاية هذه التجربة من الحصول على النتائج المبينة في الشكل (ب) من نفس الوثيقة.

ال الخميرة G	ال الخميرة P	عدد الميتوكوندريات
15 في كل خلية	من 4 إلى 5 في كل خلية	مظهر الميتوكوندريات
		الشكل (أ)

## قائمة المصادر والمراجع

- وزارة التربية الوطنية (2012): المنهاج التعليمي لقسم السنة الثالثة ثانوي في مادة علوم الطبيعة والحياة شعبة علوم تجريبية.
  - وزارة التربية الوطنية (2009): الكتاب المدرسي لقسم السنة الثالثة ثانوي في مادة علوم الطبيعة والحياة شعبة علوم تجريبية.
  - وزارة التربية الوطنية (2017): دليل بناء اختبار مادة علوم الطبيعة والحياة لامتحان شهادة البكالوريا.
  - كاملى عبد الكريم (...): أساسيات الكيمياء الحيوية، دار النشر: دار هومه.
  - الأستاذ بو الريش أحمد: مجلة للتفوق، مجلة النجاح، مجلة المستقبل.
  - امتحانات شهادة البكالوريا وطنية وأجنبية (المغرب، فرنسا).
  - وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمملكة المغرب: دليلي للنجاح في مادة علوم الحياة والأرض
- REECE et al, 2004: Campbell Biologie. 4<sup>e</sup> édition. Ed Pearson, Canada.

### كلمة فريق عكاشه

عندما كنا صغاراً أحبينا المطر فكنا ناهب ثديه ونسمعنه به  
وعندما كبرنا أحبينا العلم فجمعنا شعلانا لأجله، وعدتنا العزم على تبصير أنفسنا له  
نحن في البداية فقط، صحيح ليس كباراً ولكن سنكبر معاً...  
بسحاوول... بساوول... ونحاوول تقديم المساعدة دوماً

نحن في انتظار المتفوّفين منكم... تواصلو معنا على صفحة الفيس بوك  
**مكتبة عكاشه Okacha Bookstore**

**السلسلة المنهجية**  
يرجع الحجم الكبير لمستعمرات السلالة G إلى اعتمادها على طريق أيضي هوائي (تنفس) في حين تعتمد خمار السلالة P طريق أيضي لا هوائي (ثخمر) مما يجعل حجم مستعمراتها صغيراً.

### الجزء الثاني

#### ابيات صحة الفرضية استغلال الوثيقة (02)

- بالنسبة للسلالة G: انخفاض مهم في تركيز  $O_2$  بعض إضافة الغلوكوز إلى وسط الرعر.
- بالنسبة للسلالة P: انخفاض طفيف في تركيز  $O_2$  بعض إضافة الغلوكوز إلى وسط الرعر.
- بالنسبة للسلالة G: توفر على ميتوكوندريات نامية (بداخلها أعراض) كبيرة الحجم وعديدة.
- بالنسبة للسلالة P: توفر على ميتوكوندريات غير نامية (بدون أعراض) صغيرة الحجم وقليلة العدد.  
يدل هذا على أن الطريق الأيضي المعتمد من طرف السلالة G هو تنفس والسلالة P تخمر.


#### استغلال الوثيقة (03)

- تلون مستعمرة السلالة G يؤكد أن هذه الخماز ترجع المستقبل النهائي للالكترونات على مستوى السلسلة التنفسية.
- عن طريق التنفس تنتج الخماز G انطلاقاً من هدم جزيئة غلوكوز ATP38 أي مردود طاقوي مرتفع 40%.
- عدم تلون المستعمرة P بالأحمر يدل على عدم إرجاع المستقبل النهائي للالكترونات لاعتادها التخمر الكحولي.
- عن طريق التخمر الكحولي تنتج الخماز P انطلاقاً من هدم جزيئة غلوكوز ATP2 أي مردود طاقوي ضعيف 9%.

إذن: الفرضية "يرجع الحجم الكبير لمستعمرات السلالة G إلى اعتمادها على طريق أيضي هوائي (تنفس) في حين تعتمد خمار السلالة P طريق أيضي لا هوائي (ثخمر) مما يجعل حجم مستعمراتها صغيراً" صحيحة.

### الجزء الثالث

في الوسط الطواهي تسكن خمار السلالة G من الدم الكلي للغلوكوز (التنفس) عبر مراحل تفككه تفاعلات حلقة كربوس والفسفة الناكسدية . لذلك تنتج كمية وافرة من الطاقة المخزنة في الـ ATP تساعدها في تكاثرها السريع.  
تلحأ خلايا خمار السلالة P إلى الدم الحراري للغلوكوز (التخمر) لذلك تنتج كمية ضعيفة من الـ ATP مما يجعل تكاثرها بطيئاً.



بجانب قصر المعارض SAFEX - الصنوبر البحري.  
مقابل محطة الترامواي - حي الصنوبر les pins.

# وكاشة COMPANY

We can help you  
يمكننا أن نساعدك

06 71 09.18.75  
0555.12.63.65

[www.okacha.net](http://www.okacha.net)

- ٩٥ دراية لطلاب الطب والصيدلة
- ٩٥ دراية للحضير الشخص في العلوم الطبية
- ٩٥ دراية لحضيرية للدكتوراه
- ٩٥ دراية لحضيرية لمسابقات الأسالمة
- ٩٥ دراية لكونينية للأسالمة
- ٩٥ دراية لطلاب الجامعات
- ٩٥ دراية لكونينية في البرمجة والإعلان الالي
- ٩٥ دراية لكونينية في الإدارة
- ٩٥ دراية لطلاب البكالوريا

السلسلة الفضية - الدوال من الألف إلى الياء - للأستاذ نور الدين عيساوي - السلسلة الفضية - المتاليات من الألف إلى الياء - للأстاذ نور الدين عيساوي - السلسلة الفضية - الاحتمالات من الألف إلى الياء - للأستاذ نور الدين عيساوي - السلسلة الفضية - الأعداد المركبة من الألف إلى الياء - للأستاذ نور الدين عيساوي - السلسلة الفضية - أدبين - الرياضيات من الألف إلى الياء - للأستاذ نور الدين عيساوي	الرياضيات
السلسلة الفضية - علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء - للأستاذ بن خريف والأستاذ بن مدانى	علوم الطبيعة والحياة
السلسلة الطالب المتفوق: المتفوق في علوم الطبيعة والحياة الفلسفة للطالبة إكرام بوزار، السلسلة الأرجوانية - العلوم الإسلامية للأستاذة بوسعدى نوال	العلوم الاسلامية
السلسلة الخضراء العلوم الإسلامية 08-2020 مواضيع وأسئلة مقتربة للأستاذة بوسعدى السلسلة الأرجوانية علمين- التاريخ والجغرافيا للأستاذ بورنان	التاريخ والجغرافيا
السلسلة الخضراء علمين- التاريخ والجغرافيا 08-20 مواضيع مقتربة للأستاذ بورنان السلسلة الخضراء أدبين- التاريخ والجغرافيا للأستاذ بورنان	
السلسلة الفضية- علمين- الإنجليزية من الألف إلى الياء - الأستاذ عزو زع السلسلة الفضية- أدبين ولغات- الإنجليزية من الألف إلى الياء - الأستاذ عزو زع	الإنجليزية
السلسلة الفضية- أدبين- الفلسفة من الألف إلى الياء - الأستاذ حموده م	الفلسفة
سلسلة الطالب المتفوق: كيف تتحصل على العلامة الكاملة في الفلسفة للطالبة هبة السلسلة الفضية- أدرين- الأدب العربي من الألف إلى الياء - الأستاذ قادرى نع	الأدب العربي
السلسلة الفضية - هندسة الطرائق من الألف إلى الياء - للأستاذة عماري عقيلة - كتاب أذكار الطالب المسلم - - القصص التحفيزية لطلاب البكالوريا	هندسة الطرائق

لمعرفة المزيد عن اصدارات مكتبة عكاشه زوروا موقعنا على الانترنت وصفحتنا على الفيس وانستغرام

[www.okacha.net](http://www.okacha.net)

فريق عكاشة في خدمة العلم دوما

## مكتبة عكاشة ليست مجرد دار نشر



السعر: 650 دج

ISBN: 978-9931-723-82-0



A-27-14

نعت للكتاب



كتاب نعمه بوست



من نهد من طرف



مكتبة عكاشة  
Okacka.bookstore@gmail.com  
03 Rue de Stade Ouled Fayet-Alger-Algerie  
Tel: 05 40 87 38 02 | 06 72 38 82 02 | 05 60 42 09 93  
03 شارع الملعب أولاد فايت الجزائر العاصمة