

علوم الطبيعة والحياة

نماذج أهلية محلولة

- سلسلة مدرسية -

منقوله عن منشورات الشهاب

الأستاذ: جعيجع محمد

متوسطة: الشهيد خنوف لخضر بحمام الضلعه

السنة الدراسية: 2015 - 2016

جدول اختبارات شهادة التعليم المتوسط

المعامل	المدة	الاختبار
5	ساعتان	لغة عربية
2	ساعة و نصف	لغة أمازيغية
3	ساعتان	لغة فرنسية أو اللغة الأجنبية الأولى
2	ساعة و نصف	لغة إنجليزية أو اللغة الأجنبية الثانية
4	ساعتان	رياضيات
2	ساعة	تربيـة إسلامـية
(1 + 2) 3	ساعة و نصف	تارـيخ و جـغرافـيا
1	ساعة	تربيـة مدنـية
2	ساعة و نصف	علوم الطـبـيعـة و الحـيـاة
2	ساعة و نصف	علوم فيـزيـائـية و تـكـنـوـلـوجـيا
1		تربيـة بدـنيـة و رـياـضـية
تضاف النقاط التي تزيد عن العـشـرة إـلـى الـمـجـمـوع قـبـل حـسـابـ المـعـدـل	ساعة و نصف	تربيـة تـشـكـيلـية أو تـرـبـيـة موـسـيقـيـة
27		مجموع المعاملات

ملاحظة : تجرى اختبارات التربية البدنية و الرياضية ، التربية الموسيقية والتربية التشكيلية قبل تاريخ الامتحان. تحدد تواريخ و كيفية إجرائها عن طريق مناشير خاصة.

طبيعة اختبار مادة علوم الطبيعة و الحياة

المعامل : 2

المدة : ساعة و نصف (1h30)

يتضمن اختبار مادة الرياضيات جزأين إجباريين :

الجزء الأول (12 نقطة)

تمرينان من نوع استرجاع المعرف يمسان مجالات مفاهيمية مختلفة للمنهاج ، و توزع نقاط هذا الجزء على عدد التمارين وفق درجة تعقدتها .

يشكل التنقيط المسند للجزء الأول ما يقارب ثلثي العلامة .

الجزء الثاني (8 نقاط)

يتمثل هذا الجزء في وضعية إدماجية لغرض تقويمي ، يتحقق من خلالها المتعلم قدرًا من الإدماج . تكون الوضعية مركبة و غير معقدة ، ذات دلالة بالنسبة إلى المتعلم و تراعي فيها درجة التوجيه لمساعدة المتعلم من دون مبالغة ، بما يسمح بقياس قدرته على توظيف موارده لحل مشكلات بنفسه .

يشكل التنقيط المسند للجزء الثاني ما يقارب ثلث العلامة .

كيف تستعمل هذا الكتاب ؟

- إذا أردت التحقق من معلوماتك في نقطة معينة من البرنامج تناول فهرس المحتويات ليوجهك إلى التمرين الذي يتضمن هذه النقطة .

* ستتجدد في نهاية هذا الكتاب فهرسا للمحتويات يبرز رقم التمرين الذي يتضمن النقطة التي تبحث عنها و كذا رقم الموضوع الذي يشمل ذلك التمرين من جهة ، و فهرسا يضم أرقام صفحات كل المواضيع النموذجية المقدمة من جهة أخرى .

- * أجب كتابيا عن التمارين ، قارن إجابتك بالحل المقترح ، ثم صلح أخطاءك .
- أما إذا أردت إجراء اختبار كامل ، الجأ إلى فهرس الكتاب و اختر أحد المواضيع

- ضع نفسك في جو الامتحان و احترم الوقت المحدد .
 - * اقرأ الموضوع كاملا بتركيز حتى تفهم المطلوب منه .
 - * ابدأ دائما بالتمرين الذي تعتبره الأسهل رجحا للوقت .
 - * استعمل المسودة لإنجاز المحاولات بشكل نظيف و منظم .
 - * انقل الحلول إلى ورقة الإجابة بعناية و تنظيم .
 - * بعد الانتهاء من الإجابة و استغلال كل الزمن ، قارئها بالحل المقترن ، قوّم عملك وفق شبكة التقييم المعتمدة في الكتاب ثم صبح أخطاءك .
 - * أعد الاختبار بعد مدة تكون قد راجعت المعرف و الطرائق المستهدفة في مختلف المواضيع .
- لأهم عند الاطلاع على حل تمرين ليس قراءته فقط و إنما دراسته بدقة و تتبع جميع خطواته :
 - * الاطلاع على الحل : الحسابات و النتائج المتوصلا إليها .
 - * استنباط المنهجية المستخدمة لتوظيفها في حل تمرين أخرى .
 - * طريقة تحرير الإجابات .

نصائح عامة لتحضير الامتحان

إذا حضرت نفسك للامتحان و عملت بانتظام و استمرار و إذا كانت مراجعتك مختصرة و منهجية ، كانت لديك فرصة كبيرة للنجاح .
لهذا ندعوك إلى إتباع النصائح التالية :

● استعد للامتحان كل يوم

- حضر لكل درس و راجعه عقب انتهاء دراسته في القسم .
- ضع جدول زمنيا لمراجعتك و استغل الأوقات التي تشعر فيها باللياقة الجيدة و الاستعداد .

- أعط أهمية لكل مواد الامتحان و لا تفضل مادة على مادة أخرى.
- اجمع كل الوثائق التي تساعدك على مراجعة مواد كل مادة: الكتاب، الكراس، الموليات الجيدة و المغطية للبرنامج، الكتاب المدعم للدروس والتطبيقات و رتّبها وفق نظام يسمح إليك بالعودة إليها بأدنى جهد و أقل وقت.
- نوع مراجعتك بين العمل الفردي و العمل الجماعي المفيد.
- استغل ملخصات الدروس أثناء المراجعة.
- أكثر من حل المواضيع النموذجية لامتحانات، و قدم إجاباتك لأساتذتك لتقوينها و توجيهك.
- استعمل الألوان لإبراز ما هو مهم، و اجعل القوانين أو القواعد العامة داخل مستطيلات.
- خصّص وقتاً بعد المراجعة لحفظ المعطيات الرقمية كالقوانين و الإحصاءات.
- إن الكتابة تقضي على شرودك و تمكنك من التركيز، و هي وسيلة هامة لترسيخ المعلومات، و تجعلك تقوم نفسك و تصحيح ذاتك. إن المراجعة بهذه الطريقة بطيئة و لكنها مفيدة و لهذا ننصحك بإتباعها.

• التحضير البدني و النفسي

- امنح نفسك نصيباً من الراحة في برنامج مراجعتك، حتى تسترجع طاقتكم و تحسّن ما استوعبته.
- مارس الرياضة، لتمتحنك الاستعداد البدني.
- من الممكن أن تشعر ليلة الامتحان بالقلق و الاضطراب، فلا داعي لإجهاد نفسك بال المزيد من المراجعة، إلا إذا أردت التأكد من معرفة معينة.

• يوم الامتحان

- استيقظ مبكراً و تناول فطورك.

- تأكد أنك أخذت بطاقة التعريف والاستدعاء و كل الأدوات الضرورية قبل التوجه إلى مركز الامتحان.
- عندما تقدم إليك ورقة الموضوع اقرأه بتمعن و تركيز حتى تفهم المطلوب منه، إذ قد تكون الأسئلة مرتبطة فيما بينها، كما يمكن أن يلمح سؤال معين إلى معلومات هامة. بعدها ابدأ بالتمرين الذي تعتبره الأسهل.
- إن واجهتك صعوبة و أحسست أنها ستأخذ منك وقتاً أكثر مما يلزم أحلاها و انتقل إلى غيرها ثم عد لها في الأخير فإن الوقت مهم في الامتحان.
- لا تبق في تمرين واحد مدة أطول من اللازم.
- عالج كل جزء باستغلال الوقت الذي خصصته له.
- استعمل مسودة لكل تمرين.
- استعمل المسودة بشكل منتظم، فسجل — أولاً — عناصر السؤال ثم أجب بطريقة مرتبة و واضحة ثم انقل الحل إلى ورقة الإجابة.
- أكتب بخط واضح و مقروء.
- أشر إلى الجواب عن كل سؤال.
- راجع الحل المتوصل إليه و تحقق من صحته وأنه يلائم السؤال المطروح قبل إعادة ورقتك.
- استغل كل مدة الامتحان و لا تعد ورقة الإجابة قبل انتهاء الوقت.

نشاط الإدماج

١ — تعريف النشاط الإدماجي:

هو نشاط تعلمى، و تتمثل وظيفته الأساسية في جعل المتعلم يجند مجموعة من مكتسباته (معارف و مهارات و مواقف) التي تحصل عليها. يمكن أن تتخلل نشاطات الإدماج مختلف فترات التعلم.

٢ — أهمية النشاطات :

إن تطوير كفاءة ما عند التلميذ يعني جعله مؤهلاً لحل وضعية إشكالية.

ينبغي أن يتعلم التلميذ حل هذا النوع من الوضعيات من خلال نشاط منظم لهذا الغرض.

3 – مميزات النشاط الإدماجي:

- نشاط يرتكز على التلميذ.
- النشاط الإدماجي يجعل التلميذ يجند مجموعة من الموارد ينبغي أن تكون متنوعة مع الحرص على أن يكون تجنيدها بكل مترابط و غير متراكب.
- يهدف النشاط الإدماجي إلى تحقيق كفاءة معينة.
- النشاط الإدماجي مبني حول وضعية ذات دلالة مستوحة من محيط التلميذ.
- هو نشاط قابل للملاحظة و التقييم.

4 – بعض النصائح التطبيقية:

4 – 1 ما يجب كتابته على المسودة:

- استخراج الفعل المفتاحي الذي يوجهك إلى طبيعة العمل المطلوب منك مثلاً : (قارن ، وازن ، مثلّ ، عالّل).
- كتابة العلاقات الحرافية التي تعتمد عليها في حل التمارين.
- استخراج العلاقات الفرعية.
- إجراء العمليات الحسابية.
- احترام المصطلحات و الرموز و الوحدات الدولية.
- ترتيب الإجابة في كل تمرين.
- عليك بالتعبير بلغة علمية صحيحة.

4 – 2 بناء الإجابة:

- مراعاة مدى ارتباط إجابتك بالموضوع المقترن.
- إتقان الرسومات و تزويدها بالعنوان و البيانات اللازمة.
- نقل الإجابات بخط واضح دون تشطيف.

بعض النصائح التطبيقية الخاصة بعادة علوم الطبيعة و الحياة

I – تنظيم الوقت

- عند حصولك على الموضوع قم بقراءته لمدة 5 min .
- خصص للجزء الأول (تمرين 1 و 2) 40 min (أي 20 min لكل واحد). وللجزء الثاني (الوضعية الإدماجية) 35 min .
- إعادة قراءة الإجابة في النهاية و مراقبتها مدة 10 min .

II – التمرينان الأول و الثاني

1 – طريقة تخليل كل تمرين

- قراءة كل تمرين و استخراج المصطلحات المفتاحية لتحديد جوانب الموضوع و تفادي الخروج عنه .
- استخراج الأفعال المفتاحية التي توجهك إلى طبيعة العمل المطلوب منك (صف، حدد، بيّن، قارن، ...).
- استعمال المسودة لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بالدرس المستهدف و التي تراها مناسبة مع مضمون الموضوع.
- إلغاء بعد ذلك المعلومات التي تعتبرها خارجة عن حدود الإطار الذي جاء به السؤال و الحفاظ على تلك التي تبني بها إجابتك.

2 – بناء الإجابة

- جمع المعلومات حول فكرة أو فكرتين أساسيتين تبني عليهما الإجابة مع توظيف الكلمات المذكورة في السؤال بأسلوب سليم يسوده الطابع العلمي (معارف علمية تبرهن به ما جاء في الأسئلة).
- تدعيم الإجابة برسوم — إذا أمكن — مرفقة بالعنوان المناسب و كل البيانات ، أو بجدوال أو بخططات واضحة.

3 — ما ينتظره منك المصحح

الحرص على أن تكون الإجابة :

- وجيهة و غير خارجة عن الموضوع.
- كاملة تشمل جميع جوانب الموضوع المحددة دون التفصيل غير الضروري.
- استعمال المصطلحات العلمية بشكل دقيق و معين.
- صحيحة، فإن إجابة تهمل فيها جانباً أحسن من إجابة مفصلة و خاطئة.
- مبنية، ذكر فكرة واحدة في كل فقرة تستعمل فيها الملاحظات و الشرح قبل ذكر النتيجة.
- كتابة واضحة حالية من التشطيب.

4 — الأخطاء التي يجب تفاديتها

- كتابة جزء من الدرس لا يتماشى مع السؤال المطروح يعتبر خروج عن الموضوع .
- تجنب الإجابة بشكل فوضوي و الحرص على ترتيب المعلومات بشكل متسلسل و واضح.
- إهمال الوثائق و الرسوم التوضيحية.

III — الوضعية الإدماجية

1 — طريقة تحليل الوضعية

- قراءة الوضعية بكاملها.
- قراءة الوثائق المرفقة.
- كتابة المعلومات المتماشية مع الإطار العام للوضعية على المسودة.
- تعين المصطلحات المفتاحية وتعريفها.
- تسجيل التعليق الخاص بكل وثيقة على المسودة حتى تستطيع الإجابة عن كل سؤال.
- انتقاء المعلومات المناسبة للسؤال المطروح.

2 — بناء الإجابة

- تقديم و عرض الأحداث التجريبية (مثلا: مقارنة بين منحنيين ، نتائج مدونة في جدول ...) ، و إذا أمكن إبراز المعلومة التي تسمح لك بالتعليق على الوثائق.
- استخراج النتيجة الخاصة بالتعليق و صياغتها باستعمال الكلمات المستعملة في السؤال حتى تكون الإجابة ملائمة.

3 – ما ينتظرك منك المصحح

- ملاحظة مدى ملائمة إجابتك للوضعية.
- استخراج المعلومات من الوثائق و تزويد كل معلومة بتفسيرها البيولوجي، إضافة إلى استعمال منهجية التحليل في تحرير الإجابات و ليس السرد.

4 – الأخطاء التي يجب تفاديتها

- القراءة الخاطئة للسؤال المرافق للوثائق.
- سرد الدرس دون استعمال الوثائق للتحليل على الإجابات.
- شرح الوثائق دون التطرق للآليات البيولوجية.

ملاحظة


اتباع هذه الإرشادات يزيد من فرص نجاحك و إهمالها يمكن أن يتسبب في رسوبيك.

النصوص

الموضوع الأول 1

التمرين الأول (٥٦ نقط)

انحرز في الوثيقة الموجلة مقطعاً عرضاً في عضو معين، لكن المراحل متعددة.




- 1 — ما اسم العضو الذي أخذت منه هذه الأشكال؟
- 2 — ضع عنواناً لكل شكل.
- 3 — رتب الأشكال حسب تسلسلها الزمني.
- 4 — أذكر متى نلاحظ كل شكل خلال الدورة الجنسية.

التمرين الثاني (٥٦ نقط)

هدف معرفة أماكن تواجد العصبونات المتدخلة في القوس الانعكاسي و دور كلٌّ من الجذور الأمامية والخلفية للنخاع الشوكي ، أجريت تجارب قطع على مستوى الجذور كما هو موضح في الوثيقة (1). (أجريت التجارب على حيوانات مختلفة).

و النتائج الملاحظة إثر هذا القطع هي كالتالي:



— القطع في A : ضمور الألياف العصبية المتواجدة على يسار القطع. مع فقدان للإحساس في المنطقة مع بقاء للحركة الإرادية للمنطقة.

— القطع في B : ضمور الألياف العصبية المتواجدة على يمين القطع، مع فقدان للإحساس في المنطقة و بقاء للحركة الإرادية للمنطقة.

— القطع في C : ضمور الألياف العصبية المتواجدة على يمين القطع، مع فقدان للحركة الإرادية وبقاء الإحساس الخاص بالمنطقة.

1 — حل هذه النتائج (مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل خلية مسؤولة عن نواها تضمر **<ترول>**).

2 — ماذا تستنتج ؟

3 — مثل برسم تخطيطي واضح و عليه كافة بيانات القوس الانعكاسي و العناصر المتدخلة فيه.

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

يحتاج الإنسان يوميا إلى كميات متفاوتة من الأغذية المختلفة المصدر (نباتية، حيوانية ومعدنية)، و تتركب هذه الأغذية من مواد عضوية بسيطة تمثل في الغلوسيدات، الدسم، و البروتينات. غالبية الأغذية النباتية تحتوي على غلوسيدات و أهمها هو الغلوسيد المعقد المتمثل في النشاء الموجود في الخضر، العجائن و البقوليات.

تعرض كل هذه الأغذية إلى تحولات فيزيائية و كيميائية تغير شكلها و لونها داخل الأنوب الهضمي.


لتتعرف على التحولات التي تطرأ على الأغذية في الأنوب الهضمي لديك مجموعة من الوثائق.

— فحص مجهرى للنشاء النبيء (الوثيقة 1).

— فحص مجهرى للنشاء المطبوخ (الوثيقة 2).

— هضم مطبوخ النشاء في مختبر في ظروف مختلفة (الوثيقة 3).

— هضم النشاء في وسط حامضي (الوثيقة 4).



باستعمال هذه الوثائق و مكتسباتك :

- ١ فسّر عدم تحول النشاء في الأنوب ١ .
- ٢ حدّد الشروط الضرورية لتحول الأغذية في النوب المضمي .
- ٣ اقترح النتائج التي يمكن التوصل إليها في الأنوب ٢ و ٣ في هذه الظروف التجريبية ، ثم استخلص مفهوم الأثر النوعي للأنزيمات .
- ٤ هل حموضة الوسط تؤثر في نشاط الأنزيمات ؟ علل إجابتكم .
- ٥ لخص في جدول كل التحولات التي تطرأ على المواد البسيطة (الغلوسيدات مثل النساء ، البروتينات و الدسم) مبرزا نوع الأنزيمات المؤثرة في كل نوع من الغذاء ، ثم حدّد نواتجها .

الخلول

الموضوع الأول 1

التمرين الأول (06 نقط)

0,5

1 — اسم العضو : هذه الأشكال أخذت من عضو هو : المبيض.

2,5

2 — العنوان المناسب لكل شكل :

أ — الإباضة. ب — رسم تخطيطي لجريب أولي. ج — رسم تخطيطي لجسم أصفر.

د — رسم تخطيطي لجريب ناضج. ه — رسم تخطيطي لجريبات ابتدائية.

1

3 — التسلسل الزمني : ه — ب — د — أ — ج .

1

4 — ملاحظة الأشكال : نلاحظ الأشكال هـ ، ب و د أثناء المرحلة الجريبية.

1

— أما الشكل ج فنلاحظه في المرحلة الصفارية.

التمرين الثاني (06 نقط)

1 — تحليل النتائج :

— القطع في A : ضمور الجزء الأيسر للقطع دليل على تواجد أنوية (الأجسام الخلوية) لهذه العصبونات على يمين القطع.

0,5

— القطع في B : ضمور الجزء الأيمن للقطع دليل على تواجد أنوية (الأجسام الخلوية) لهذه العصبونات على يسار القطع.

0,5

— قطع للجذر الظاهري أدى إلى فقدان الإحساس دون الحركة دون الحركة دليل على أن الجذر الظاهري جد حسي.

0,5

— القطع في C : ضمور الجزء الأيسر للجزء للقطع دليل على أن أنوية (الأجسام الخلوية) لهذه العصبونات متواجدة على يمين القطع.

0,5

— قطع الجذر البطني أدى إلى فقدان الحركة دون الإحساس دليل على أنه جذر حركي.

2 — الاستنتاجات :

— أنوية العصبونات **الحسية** للجذر **الظاهري** متواجدة في **العقدة الشوكية**.

— أنوية العصبونات **الحركية** للجذر **البطني** متواجدة في **المادة الرمادية للنخاع الشوكي**.

0,5


3 – العناصر المتدخلة في القوس الإنعكاسي:

البيانات : 1 – جذر ظاهري حسي. 2 – عقدة شوكية. 3 – مادة بيضاء. 4 – مادة رمادية. 5 – جذر بطني حركي.

1,25

0,5

0,75



الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 – تفسير عدم تحول النساء في الأنوب 1 :

النشاء الموجود في الأنوب 1 نساء نيء لا يمكن لأنزيم اللعاب أن يحوله إلى غلوسيد أبسط،
يصعب لأنزيم اللعاب أن يهضم النساء النيء.

0,5

2 – تحديد الشروط الضرورية لتحول الأغذية في النوب الهضمي :

0,25

ب – درجة حموضة حسب العضو المركب للأنوب الهضمي، (في الفم الحموضة معتدلة، في المعدة حامضية و في المعى الدقيق قاعدية نسبيا).

0,25

0,25

ج – أنزيمات مناسبة لكل غذاء بسيط.

مثال : أنزيم اللعاب يؤثر في النساء ، المالتاز تؤثر في سكر الشعير ...

3 – أ – مقارنة بين النتائج المتحصل عليها في كل من الأنوب 2 و 3 :

– يتتحول مطبوخ النساء إلى سكر الشعير في وجود أنزيم اللعاب و حرارة حياتية (37°).

0,25

— لا يتحول مطبوخ النشاء في وجود أنزيم البروتياز، لأن هذه الأنزيم لها تأثير في البروتينات فقط.
0,5

ب — يؤثر كل نوع من الأنزيم الموجودة في العصارات الهاضمة في نوع من الجزيئات الغذائية المعددة لذا نقول إن الأنزيمات لها تأثير توسيعى.
0,5

4 — أ — نعم حموضة الوسط تؤثر في نشاط الأنزيمات ، حيث أنزيم اللعاب ينشط في وسط معتدل.
0,5

ب — تعليل : كل نوع من الأنزيم ينشط في وسط له حموضة معينة.
مثال : تنشط أنزيم البروتياز في وسط حامضي أما الأميلاز فتنشط في وسط معتدل.
1

5 — الجدول الذي يلخص كل التحولات التي طرأت على الأغذية البسيطة: 3


نواتج التحول	نوع الأنزيم	الجزئيات الغذائية المعددة
سكر الشعير	الأميلاز (عصارة اللعاب)	النشاء
أحماض أمينية	البروتياز (عصارة المعدة)	البروتينات
أحماض دسمة	اللبياز (عصارة معيشكلية أو معوية)	الدسم

النوصوص

الموضوع الثاني 2

التمرين الأول (06 نقط)


انطلاقاً من معلوماتك المسبقة
و استغلالك للوثيقة التالية :
اشرح الآليات المتدخلة في
انتاج الأجسام المضادة أثناء
الاستجابة الأولية و الثانية.



التمرين الثاني (06 نقط)

تمثل الوثيقة المقترحة عناصر جد مهمة
أخذت لها صورة ابتدائية من خلية
جسمية.

- 1 — ما اسم هذه الوثيقة ؟
- 2 — ما هي العناصر الموضحة فيها؟
- 3 — ما هو جنس الفرد الذي أخذت منه هذه الخلية ؟
- 4 — هل الفرد سليم أو مصاب ؟
- 5 — إذا كان مصاباً، ما اسم العاهة ؟
و كيف حدثت ؟



الوضعية الإدماجية (08 نقط)

يتميز الجدار الداخلي للمعوي الدقيق بوجود بنية خاصة مما تشكل سطح تماس واسع بين الأغذية و الدم. يتراوح طول المعوي الدقيق من 6 إلى 7m و قطره 2cm ويحتوى يومياً معدل 100g من الغلوسيدات، 100g من الدسم، من 50 إلى 100g من البروتينات، من 50 إلى 100g من الأملاح المعدنية، و من 7 إلى 8 لتر من الماء.

— صورة للمعى الدقيق بالأشعة (X) الوثيقة 1.

— صورة للجدار الداخلي لالمعى الدقيق الوثيقة 2.

تحليل الدم الداخل إلى المعى و الخارج منه يحتوي على مغذيات بكميات متفاوتة الوثيقة 3.



الوثيقة 2: بنية الجدار الداخلي
للمعى الدقيق

الوثيقة 1: صورة المعي الدقيق
بالأشعة (x)

الدم الخارج إلى المعى الدقيق (بالغرام)	الدم الداخل إلى المعى الدقيق (بالغرام)	
1,9	0,8	سكر العنب
0,79	0,35	أجاص أمينية
5,4	3	أجاص دسمة
1,94	1,7	كوليستيرول
0,024	0,02	الفيتامينات
الوثيقة 3 : تركيب الدم الداخل و الخارج من المعى الدقيق		

اعتمادا على هذه الوثائق و معلوماتك المكتسبة .

1 — استخرج الخصائص البنوية للجدار الداخلي لالمعى الدقيق.

2 — حدّد مقر امتصاص المغذيات الناتجة عن عملية الهضم.

3 — ما هي العلاقة الموجودة بين الخصائص البنوية لجدار المعى الدقيق و عملية الامتصاص؟

4 — حلّل معطيات الجدول ثم حدّد مصير المغذيات بعد نهاية عملية الهضم.

5 — اقترح فرضية حول مصير المغذيات بعد امتصاصها.

الحلول

الموضوع الثاني 2

التمرين الأول (06 نقط)

شرح الآليات المتدخلة في إنتاج الأجسام المضادة : يتم إفراز للأجسام المضادة بعد مدة زمنية قصيرة من الحقن الأول بمولد الضد، و يتمثل هذا الزمن اللازم **للتعرف** على مولد الضد من طرف الخلايا الملفاوية المتخصصة وهي **الخلايا الملفاوية البائية LB** تم تمايزها إلى **خلايا بلازمية** ممنتجة **لأجسام المضادة** و من ثم إفراز الأجسام المضادة التي يعبر عنها بتصاعد المنحني، (الاستجابة الأولية).

2

— كما تتدخل كذلك **الخلايا الملفاوية البائية ذات الذاكرة (LBM)** الناتجة كذلك عن **الملفوایات (LB)** التي **تحتفظ بذاكرتها على بنية مولد الضد.**

1

— و عند التعديل من مفعول مولد الضد بارتباط الأجسام المضادة به يتناقص إفراز هذه الأخيرة ثم يتوقف عن تعديل جميع مولدات الضد.

0,5

— عند التلامس الثاني مع نفس مولد الضد تتدخل **الخلايا الملفاوية البائية ذات الذاكرة (LBM)** بسرعة لمعرفتها المسبقة بمولد الضد، فيتم تمايز سريع للخلايا البائية إلى خلايا بلازمية ممنتجة **لأجسام المضادة** الذي يكون بشكل سريع و كبير و يعبر عنه بتصاعد الكبير للمنحني، (استجابة ثانوية).

1,5

— تبقى **الأجسام المضادة** متواجدة بكثرة في العضوية بالرغم من التعديل من مفعول مولدات الضد.

1

— إذا الاستجابة المناعية الثانوية ناتجة عن الذاكرة المناعية.

التمرين الثاني (06 نقط)

1 — **اسم هذه الوثيقة :** الطابع النووي.

1

2 — **العناصر الموضحة فيها :** هي الصبغيات.

0,5

3 — **جنس الفرد الذي أخذت منه هذه الخلية :** أنثى.

0,5

4 — **الفرد مصاب.**

0,5

5 — **اسم العاهة :** عاهة تورنر (syndrome de Turner) .

0,5

السبب : أثناء تشكل الأعرas و عند انفصال الصبغيات المتماثلة عن بعضها في إحدى

1

الخلايا الأم لم ينفصل أحد أزواج الصبغيات الجنسية عن الآخر.

1

— فكانت لأحد الأعراس صيغة : $x + 22$ و العروس الثاني : $O + 22$.

عندما حدث إلقاء أصبحت الصيغة : $44 + x$ أي 45 صبغي عوضاً عن 46 صبغي كما هو في الحالة العادمة.

1

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 — استخراج الخصائص البنوية للجدار الداخلي للمعي الدقيق : يتميز الجدار الداخلي

للمعي الدقيق بوجود اثناءات عليها زغابات معوية كثيرة غنية بالشعيرات الدموية، حيث

1

تشكل مساحاتها الإجمالية حوالي $200m^2$ مما يشكل سطح تماس واسع جداً.

2 — مقر امتصاص المغذيات الناتجة عن عملية الهضم هو : سطح التماس الواسع الذي

1

تشكله الرغابات المعوية التي تحتوي على شبكة معقدة من الشعيرات الدموية.

3 — العلاقة الموجودة بين الخصائص البنوية لجدار المعي الدقيق و عملية الامتصاص

هي : البنية المتميزة للجدار الداخلي للمعي الدقيق تشكل سطح تماس واسع بين الأغذية و

1

الدم.

4 — تحليل معطيات الجدول ثم تحديد مصير المغذيات بعد نهاية عملية الهضم :

أ — من خلال تحليل الجدول نستنتج أن كمية المغذيات أقل في الدم الداخلي للمعي الدقيق و

1

كميتها أكثر في الدم الخارج منه.

ب — تنتقل المغذيات الممتصة على مستوى السطح الداخلي لجدار المعي الدقيق نحو الدم و

1

البلغم.

5 — اقتراح الفرضية حول مصير المغذيات بعد امتصاصها : ينقل الدم مجموعة من

المغذيات إلى الكبد الذي يقوم بتخزين الجلوكوز الفائض حتى يوزعه حسب حاجيات

العضوية أثناء قيامها بنشاطاتها المختلفة و تنظيم توزيع المغذيات الأخرى المتمثلة في الماء،

1,5

الأملاح المعدنية، الفيتامينات والأحماض الأمينية.

— ينقل البلغم مجموعة ثانية من المغذيات في شبكة من الأوعية البلغمية ليصبها في الأوعية الدموية، على مستوى الوريد تحت الترقوة و هكذا تلتقي مرة أخرى كل المغذيات في الدم الذي يقوم بتوزيعها على كل أعضاء الجسم.

1,5

تمثل هذه المغذيات في الماء، الأملاح المعدنية، الأحماض الأمينية و الحلويين.

التمرين الأول (06 نقط)

تمت دراسة تطور العدوى بفيروس السيدا (SIDA) عند مجموعة من الأشخاص المصابين بدلالة سعة الاستجابة المناعية المقدرة بكمية الأجسام المضادة المفرزة و النتائج تمثلها منحنىات الوثيقة 1 .

وصف مختلف المراحل :

المرحلة 1 : مرحلة العدوى دون علامات خصوصية.

المرحلة 2 : انفاس العقد اللمفاوية.


المرحلة 3 و 4 : نقص عمل الجهاز المناعي دون ظهور علامات مرضية.

المرحلة 5 و 6 : ظهور، ثم تطور خطير للأعراض المرضية المسؤولة عن موت المريض.

1 — حلل هذه النتائج.

2 — كيف تتم العدوى بالسيدا ؟

3 — ما هي سبل الوقاية ؟




التمرين الثاني (٥٦ نقط)

يعاني بعض الأشخاص من مرض وراثي خطير هو الانسداد المخاطي للرئتين (Mucoviscidose) و الذي يصيب الأطفال منذ صغرهم. و يتمثل في اضطرابات تنفسية ناجمة عن الإفراز غير الطبيعي للمخاط.

تمثل الوثيقة الموالية الشجرة العائلية لعائلة بعض أفرادها مصابون بالمرض.

- 1 — هل عامل المرض عامل سائد أم متعدد؟ لماذا؟
- 2 — المرأة B2 حامل و تريد معرفة هل هناك خطر لإنجابها لطفل مريض، ما هي حظوظ المرأة لإنجاب طفل سليم؟ علل إجابتك بتفسير وراثي.
- 3 — أكتب النمط التكعيبي لـ A4 ، للأبوين و للأفراد A1 ، A2 ، A3 ، A4




الوضعية الإدماجية (٤٨ نقط)

يحتاج الوسط الداخلي المزيد من المغذيات و غاز ثنائي الأكسجين حسب الاحتياجات اليومية للشخص. يقوم هذا الوسط الداخلي بتوزيع هذه المغذيات على كافة خلايا الجسم لاستعمالها في نشاطاتها المختلفة : إنتاج الطاقة، أداء عمل عضلي، تحديد الأنسجة المتلفة، و تركيب جزيئات عضوية جديدة.

- تحليل جدول يظهر تركيب البلازمما الوثيقة 1 .
- مقاومة معطيات من خلال جدول يظهر استهلاك العضلات للجلوكوز و غاز ثنائي الأكسجين أثناء النشاط و أثناء الراحة الوثيقة 2 .
- تحليل صورة تبين استعمال خلايا الغدة المعنكولة للأحماض الأمينية الناتجة عن عملية الهضم. اعتمادا على الوثائق التالية و معلوماتك المكتسبة.


غاز ثانوي الأكسجين	الجييكوز	الحالة
5ml	13mg	العضلة أثناء النشاط
7,7ml	28mg	العضلة أثناء الراحة

الوثيقة 2 : جدول يظهر استهلاك العضلة للمغذيات



الوثيقة 1 : تركيب بلازما الدم

الوثيقة 3 :
استعمال
الأحماض الأمينية
في تركيب الإنزيمات



استعمل هذه الوثائق و مكتسباتك لتتوصل إلى :

- 1 تحديد كيفية نقل المغذيات الناتجة عن عملية الهضم إلى خلايا الجسم.
- 2 وضع مقارنة بين أهم السوائل التي ترکب الوسط الداخلي .
- 3 شرح عملية التنفس الخلوي و نواتجها في بضعة أسطر .
- 4 استخلاص دور الأغذية و ثانوي الأكسجين في العضوية .
- 5 اقترح مجالات استعمال المغذيات كالأحماض الأمينية، الغلوسيدات، و الدسم.

التمرين الأول (06 نقط)

- 1 — **تحليل النتائج** : خلال السنة الأولى من الإصابة **تمو الفيروسات** بكميات كبيرة، إلا أن ظهور **استجابة مناعية** يقلل من كميات هذه الفيروسات، و تبقى في **حالة حضانة** (ساكنة) حتى السنة الرابعة، خلال هذه الفترة **تصل سعة الاستجابة أقصى قيمة لها**. 2
- **تضارب كميات الفيروسات** بعد السنة الرابعة و تؤدي إلى **تضارب الاستجابة المناعية** و التي تصل إلى أدنى سعة لها (تنعدم) خلال 10 سنوات من بداية العدوى، و هذا يؤدي إلى **أعراض مرضية خطيرة** تؤدي إلى الموت.
- 2 — **تم العدوى بالسيدة عن طريق الدم بعدة طرق** :
- 0,5
- 0,5
- 0,5
- العلاقات الجنسية الغير مشروعة.
- نقل الدم غير مراقب.
- استعمال نفس الحقنة من طرف عدة أشخاص، خاصة عند المدمنين على المخدرات.

3 — الوقاية :

- 1
- الابتعاد عن العلاقات الجنسية غير المشروعة.
- مراقبة الدم.
- استعمال إبرة الحقنة الطبية بشكل فردي.

التمرين الثاني (06 نقط)

- 1 — **حامل المرض** : عامل المرض متنحي لأن الأبوين A1 و A4 سليمان لكنهما حاملان للمرض و أنجبا B4 مريضة.
- 2 — المرأة B2 حامل و تريد معرفة حضوظها في إنجاب طفل سليم و هل هناك خطر إن تنجب طفل مريض؟

التعليق : B2 أبوها سليمان لكن يحملان عامل المرض المتنحي نرمز له بـ M ، يعني أثناء تشكيل البوياضة الملقة التي أعطت B2 تحمل إما عاملين **ما ما** (سليمة) أو عامل المرض **M** و العامل السليم **ما**.

1

— إذا كان الزوج سليما **ما ما** هنا كل نسلها يكون سليما **سا سا أو سا س** .

— إذا كان الزوج حاملا للمرض **سا س** فهنا احتمالان إما يكون طفلهما **سا سا أو سا س** أو احتمال ثالث **س س** ، إذا هناك احتمال واحد فوق ثلاثة.

3 – النمط التكيني لـ A4 : هو حتما **سا س** لأنه سليم و أنجب طفلة مريضة.

أنماط أباء : A3 ، A2 ، A1

هي إما : **سا س × سا س** أو **سا س × سا س**
يعني أحد الأبوين مريض (أب) (أم)

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 – طريقة نقل المغذيات الناتجة عن عملية الهضم إلى خلايا الجسم توضح كالتالي :

— يمتص الدم مجموعة من المغذيات :

1,5 (ماء، أملاح معدنية، جليكوز، أحماض أمينية و فيتامينات) .

— يمتص البلغم بمجموعة ثانية من المغذيات :

1 (ماء ، أملاح معدنية ، أحماض دسمة و الحلوين).

تلتقى هذه المغذيات في الدورة الدموية و على مستوى الشعيرات الدموية، تترشح منها حتى

0,5 تمر إلى السائل البيني الذي يوصل هذه المغذيات إلى الخلايا.

2 – المقارنة بين أهم السوائل المركبة للوسط الداخلي :

— يحتوي الدم على كريات دموية حمراء (التنفس) و على البلازم الذي يحتوي على البروتينات، الماء و العناصر الذائبة.

0,5

— يحتوي السائل البيني على عناصر البلازم، يعتبر الوسيط الدم و الخلايا.

0,5

— يحتوي السائل اللمفاوي على جزء من عناصر السائل البيني لا يختلف عن تركيب البلازم و يجري في أوعية لمفاوية.

0,5

3 – شرح عملية التنفس الخلوي و نواتجها : تحدث عملية التنفس على مستوى الخلايا،

تستقبل هذه الأخيرة ثنائي الأكسجين و المغذيات و يتم تأكسد هذه المغذيات و خاصة

1,5 الجليكوز في وجود O_2 حيث ينتج عن هذه العملية إنتاج الطاقة مع طرح الفضلات.

4 — استنتاج دور الأغذية و غاز ثاني الأكسجين في العضوية هو :

1

إنتاج الطاقة في أول الأمر ثم تركيب جزيئات عضوية جديدة.

5 — مجالات استعمال المغذيات كالأحماض الأمينية، الغلوسيدات و الدسم تتمثل كما

يليه :

— الأحماض الأمينية تدخل في تركيب بروتينات جديدة لبناء العضوية مثلا.


0,5 — الغلوسيدات و الدسم تدخل في إنتاج الطاقة للحصول على الحرارة الحياتية.

النصوص

الموضوع الرابع

التمرين الأول (٥٦ نقط)

قياس نسبة الأجسام المضادة في دم مولود جديد عمره 12 شهراً، ممثلة في منحنى الوثيقة 1 ، لهذه الأجسام المضادة مصدران مختلفين (A1) و (A2) .



كيف تفسر ذلك ؟ (اعتمد على المنحنى) .

التمرين الثاني (٥٦ نقط)

السيد و السيدة «س» أبوان لأربع بنات ، السيدة «س» حامل من جديد، إحدى صديقاتها قالت لها : هذه المرة حظوظك مرتفعة جداً لإنجاب ولد . باستغلال معلوماتك في الوراثة :

- 1 — حدّد ما هو الفرق بين الإناث و الذكور من الناحية الوراثية.
- 2 — ما هو جوابك لهذه السيدة ؟ هل ما قالته صحيح ؟
- 3 — من يحدد جنس المولود الأب أم الأم ؟ لماذا ؟

الوضعية الإدماجية (٤٨ نقط)

يتناول عبد الهادي و أفراد عائلته أثناء الوجبات اليومية أطباقاً غذائية متنوعة خاصة في وجبة الظهر، تحتوي هذه الوجبة دائماً على طبق نشوي، أغذية طازجة (فواكه أو خضر) مطبوخة، غذاء لبني مثل الجبن أو غذاء بروتيني مثل البيض، اللحم، أو السمك، مواد دسمة مثل الزيت الذي يضاف عند تحضير هذه الأطباق و في الأخير قطعة من الحلويات أو غذاء سكري.

لكن أخيه هشام الذي هو في سن السادسة له سلوكيات غذائية مخالفة لأفراد عائلته؛ حيث تعود على الأكل خارج الأوقات المحددة و خاصة عند مشاهدته التلفاز و هذا رغم تحذيرات والديه.

تمثل الوثائق التالية :

— تحليل جدول يبين الحاجيات الطاقوية عند الأطفال في سن السادسة و المراهقين في سن التاسع عشرة.

— قاعدة حسابية لاستخراج مؤشر الكتلة الجسمية.


— صور مختلفة حول حالات مرضية يسببها الإفراط في التغذية.

$$م . ك . ج = \frac{\text{الوزن (kg)}}{\text{الطول}^2 (m)}$$


الوثيقة 2 :
قاعدة حساب مؤشر الكتلة الجسمية

الأطفال :	
5852 kJ / j	من 1 إلى 3 سنوات
9196 kJ / j	من 7 إلى 9 سنوات
10868 kJ / j	من 10 إلى 12 سنة
المراهقين :	
15048 kJ / j	من 16 إلى 19 سنة

الوثيقة 1 : جدول الحاجيات الطاقوية



شريان مسدود بالكوليستيرول



شريان سليم

الوثيقة 3 : حالات مرضية مختلفة بسببها البدانة

باستعمال الوثائق المرفقة و باستعمال مكتسباتك :

— 1 استخلص القاعدة المتبعة للوصول إلى التوازن الغذائي .

— 2 استنتاج من خلال المعطيات المقترحة كيف يتطور وزن هشام عند بلوغه سن 15 .

— 3 حدّد بالتقريب مقدار مؤشر البدانة عند هشام و ما هي الأعراض التي تظهر عليه ؟

4 – إحصاء كل الأمراض التي يخلفها الإفراط في التغذية و عوائقه على صحة الإنسان.

5 – اقترح في فقرة لا تتجاوز 5 أسطر السلوكيات الغذائية الحسنة للمحافظة على سلامه الجهاز الهضمي و الجسم.

الموضوع الرابع 4

التمرين الأول (06 نقط)

1 – تحليل المنحني : يمتلك الرضيع عند ولادته كمية كبيرة من الأجسام (A1) المضادة تبلغ $12g/l$ تقريبا، والتي تبدأ في التناقص بعد الولادة مباشرة تدريجيا إلى أن تنعدم في حوالي الشهر الثامن.

1

– يظهر المنحني (A2) وجود نوع آخر من الأجسام المضادة (A2) في دم الرضيع اعتبارا من الشهر الأول، تزايد كميته في الدم تدريجيا.

1

تصل مجموع الأجسام المضادة أدنى معدل لها في دم الرضيع في حوالي الشهر الخامس (5)، حوالي $(4g/l)$ تقريبا.

1

و تصل إلى معدلات مرتفعة في حوالي الشهر 12 (تفوق $(12g/l)$).

0,75

2 – مصدر الأجسام المضادة (A1) هي : الأم

0,75

– مصدر الأجسام المضادة (A2) ينتجه المولود

3 – التفسير : يكون المولود ذو الشهر (5) أكثر عرضة للأمراض؛ لأن مجموع الأجسام المضادة في الشهر الخامس تصل إلى أدنى معدلاتها مما يتربّع عليه نقص قدرة المولود على مقاومة الأمراض خلال هذه الفترة مما يجعله عرضة للإصابة بالأمراض بدرجة كبيرة.

1,5

التمرين الثاني (06 نقط)

1 – تحديد الفرق : الفرق بين الإناث والذكور، يكمن في الاختلاف الموجود على زوج الصبغيات رقم 23 .

الصبغيات رقم 23 .

– فعند الذكر يكون الصبغيان غير متماثلين، أحدهما قصير والآخر كبير، نرمز لهما بـ 1 . XY

– عند الأنثى يكون الصبغيان رقم 23 متماثلين، و يشبهان X عند الذكر، لهذا نرمز لهما 1 . XX

2 — الجواب لهذه السيدة : أن مقولتها غير صحيحة علميا فأنثناء تشكل الأعراس تنفصل

الصبغيات عن بعضها فكل خلية جنسية تحتوي على نصف الذخيرة الصبغية يعني صبغي من كل زوج و بهذا تنفصل الصبغيات الجنسية عن بعضها.

— هناك احتمال 50% لتشكيل بيضة لأنثى؛ لأن نصف النطاف المتشكلة تحتوي على الصبغي X .

— هناك احتمال 50% لتشكيل بيضة لذكر؛ لأن نصف النطاف المتشكل تحتوي على الصبغي Y .
الإلاعاح مرتبط بالصدفة.

3 — تحديد جنس المولود : الأب هو الذي يحدد جنس المولود؛ لأن الصفات الذكرية

محمولة من طرف الصبغي Y الذي يحمله الذكر.

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 — القاعدة المتبعة للوصول إلى التوازن الغذائي تتلخص كالتالي :

— (4) أغذية متنوعة من الغلوسيدات : عجائن، حلويات، حضر مطبوخة، حضر طازجة وفواكه .

— (2) غذاءان يحتويان على : أ — مشتقات الحليب.

0,5 ب — لحم ، سمك أو بيسن.

— (1) غذاء واحد دسم أو إضافة الدسم في الأطباق الخضراء.

2 — استنتاج تطور وزن هشام عند بلوغه 15 سنة :

— يزداد وزنه عن العادة و يتعرض إلى السمنة (البدانة).

3 — تحديد مؤشر البدانة بالتقريب عند هشام :

عند استعمالنا القاعدة (الوثيقة 2) نحصل على مؤشر الكتلة الجسمية يساوي 24 جسم هشام سليم، إذا تجاوز هذا المؤشر 27 بدانة عند هشام، و إذا تجاوز 32 تصبح البدانة خطرا على هشام في حالة سلوكه الغذائي المتبعد تزداد كتلته الجسمية.

4 — الأمراض التي يخلفها الإفراط في التغذية عديدة مثل :

أضرار الكوليستيرول، داء السكري و الضغط الشرياني.

- عواقب هذه الحالة هو : عدم الاستقرار الصحي و يصبح الشخص معرضا في أي وقت إلى السكتة القلبية أو إلى أمراض أخرى مميتة.

1,5


5 — السلوكيات الغذائية الحسنة للمحافظة على سلامـة الجهاز الهضمي و الجسم تترتب فيما يلي :

- اتباع قاعدة تنوع الأغذية (1-2-4) .
- تنظيم الوجبات الغذائية على أوقات محددة.
- الحرس على نظافة الأغذية و الحفاظ عليها.
- نظافة الأسنان .

2

التمرين الأول (06 نقط)

تنتهي عملية الهضم على مستوى المعي الدقيق و تتحول كل الأغذية إلى مغذيات يتمكن الدم
و البلغم من امتصاصها.



- 1 — اعط تعريفا دقيقا لعملية الهضم.
- 2 — ماذا يمثل الرسم التخطيطي المقابل ؟
- 3 — حدّد مكان وجود هذه البنية المتميزة.
- 4 — ضع البيانات مكان الأرقام باستعمال المفردات
التالية : — أوعية بلغمية — جدار — شبكة بلغمية
— وعاء بلغمي مركري.
- 5 — ضع عنوانا للشكل .
- 6 — ما هي خصائص طريق الامتصاص المبينة في الشكل ؟

التمرين الثاني (06 نقط)

نقوم بحقن فئران بكتيريات عصوية و هي بكثيريا مسؤولة عن مرض خطير هو **الالتهاب الرئوي الحاد**، يوجد نوعان من المكورات الرئوية :

- النوع S : و هو نوع مرض و قاتل و يتميز بيكتيريا لها محفظة ضامة ملساء.
- النوع R : و هو نوع غير مرض و البكتيريا تكون محاطة بمحفظة.
- تحقن الفئران بيكتيريا من نوع S ← الموت الأكيد.
 - تحقن الفئران بيكتيريا من نوع R ← تبقى الفئران حية و لا نلاحظ في دمها بكتيريا ، عكس الحالة الأولى التي بقيت البكتيريا في الدم.
 - نأخذ بكتيريا من نوع R و نحقنها بمحفظة البكتيريا من نوع S ثم نحقن بها الفأر.
- الملاحظة :** يموت الفأر ، و عند تحليل دمه نجد بكتيريا من نوع S.
- 1 — لماذا نجد البكتيريا من نوع S في دم الفأر و لا نجد تلك من نوع R ؟

2 — ما هو سبب وجود بكتيريا من نوع S رغم أنها حرقنا الفأر ببكتيريا من نوع R ؟


3 — هل تستطيع أن تطبق هذه المعالجة في أغراض طبية مفيدة ؟

الوضعية الإدماجية (08 نقط)


قصد عيادة طبيب 3 أشخاص : رضا، فريد و أحمد. لا يشتكي أحmd من أي شيء؛ لكنه يحافظ على صحته و يجري دوريا فحوصات عند الطبيب، أما رضا فيتناهى المخدرات و مصاب بالسيدا و فريد مدمن على الكحول.

طلب الطبيب من الأفراد الثلاثة إشعاعات تبين مقاطع في الدماغ.

عاد الأشخاص الثلاثة بالمقاطع إلى الطبيب و المتمثلة في الوثائق التالية :



فريد (F)




رضا (R)



أحمد (A)

أما المخطط (B) فهو عبارة عن رسم توضيحي لقطع بالدماغ.



1 — مادة بيضاء. 2 — مادة رمادية.

3 — الجسم الكتلي. 4 — الفص الأمامي.

5 — بطين جانبي. 6 — بطين مضغوط من طرف

كتلة غير طبيعية. 7 — فراغ تحت عنكبوتية يحتوي

على سائل شوكي. 8 — توسيع الفراغات تحت

عنكبوتية. 9 — ضمور المخ. 10 — مناطق تحتوي على كتل غير عادية.

بالاعتماد على الوثائق السابقة و معلوماتك المسبقة :

1 — قارن بين الأشكال A — R — F و B . ماذا تستنتج ؟

2 — حاول الطبيب الشرح لرضا ما يحدث لديه فأعطاه وثيقة بها :

يفرز المخ مادة تسمى (المورفين) الطبيعي، لوحظ أنها ثبتت على موقع خاصة بها توجد على مستوى البصلة السياسية التي تعتبر كذلك مقر تنظيم عملية التنفس ، الأشخاص المدمنون على المورفين بجرعات مرتفعة غالبا ما يعانون من حالات النشوة المفرطة و صعوبة التنفس.

- أ — ما هو دور المورفين الطبيعي ؟
- ب — ما هي العلاقة الموجودة بين الأعراض التي تظهر على المدمن بالمورفين و موقع ثبيت الأندورفين أو المورفين الطبيعي ؟
- ج — لماذا أعطى الطبيب رضا هذه الوثيقة ؟
- 3 — أ** — انطلاقا من كل هذه الملاحظات و بالاستعانة بمعلوماتك ، حدّد طبيعة الأضرار الناجمة عن المخدرات و الكحول و أحصها في جدول منظم .
- ب** — ما هي النصائح التي بإمكان الطبيب و بإمكانك أن تقدمها لرضا و فريد ؟

التمرين الأول (06 نقط)

1 – التعريف الدقيق لعملية الهضم : إن عملية الهضم هي عملية تبسيط الأغذية المعقدة مثل الغلوسيدات تحت تأثير إنزيمات هضمية متخصصة حتى تتحول إلى مغذيات بسيطة تصبح قابلة لامتصاص على مستوى المعي الدقيق.


1,5

2 – يمثل الرسم التخطيطي المقابل : مقطعاً طولياً في الزغابة المعاوية يظهر طريق الامتصاص البلغمي.

1

3 – تحديد مكان تواجد هذه البنية المتميزة : توجد هذه البنية المتميزة على مستوى الجدار الداخلي للمعي الدقيق.

0,5



1,5

4 – إعادة الرسم ووضع البيانات :

5 – عنوان الشكل هو :

رسم تخطيطي لزغابة معاوية.

6 – خصائص هذا الطريق من الامتصاص هي :
تنتقل عبر هذا الطريق نواتج تحويل المواد الدسمة فقط (الأحماض الدسمة والحلوين مع كمية من الماء والأملاح المعدنية).

1

التمرين الثاني (06 نقط)

1 – نجد بكتيريا من النوع S في دم الفأر، لأن جهازه المناعي لم يستطع مقاومتها وبلغعتها، بينما البكتيريا من نوع R، فقد قام الجهاز المناعي بمقاومتها وبلغعتها.

2

2 – السبب : حقنا الفأر بخلايا R، لكنه مات و وجدنا في دمه خلايا لبكتيريا من نوع S و السبب في هذا هو : عندما حقنا محتوى S في R، حقنا معها الصبغي البكتيري S الذي اندمج مع الصبغي لبكتيريا R فحوّلها لبكتيريا S، فالصبغي يحمل المعلومة الوراثية، لهذا حدث هنا التغير، فالصبغي S منح صفة السمية الممرضة للصبغي R فأصبحت البكتيريا سمية و قاتلة.

2

3 – التطبيق في أغراض طبية : نستطيع تطبيق هذه المعالجة في أغراض طبية كأن تتحقق مثلاً بكثيرياً بالمعلومة الوراثية المسئولة عن اصطناع **الأنسولين** مثلاً فتصبح البكتيريا قادرة على اصطناعه فيصنف و يستغل لمعالجة المرضى بداء السكري.

2

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 – المقارنة بين الأشكال R – A – F و B :

نلاحظ أنه عند مقارنة دماغ الإنسان السليم العادي (A) مع دماغ الشخص المدمن (F) على الكحول فهذا الأخير يتميز بضمور الكتلة المخية عنه وجود كتل غير طبيعية. أما الشخص المدمن على المخدرات والمصاب بالسيだ (R) فنفس الشيء يلاحظ عليه ولكن بنسبة أكبر، فهناك ضمور مخفي مع كتل عديدة غير طبيعية.

0,5

الاستنتاج : يؤدي كل من الكحول والمخدرات إلى أضرار وإتلاف في الأنسجة الدماغية علماً أن الأنسجة العصبية لا تتجدد، وبالتالي تكون الأضرار خطيرة ومتزمنة.

0,5

1,5

2 – أ – دور المورفين : هو تنشيط الألم و الشعور بالإرتياح.

ب – تحتل المورفين (المخدر) موقع الأندورفين فيشعر الفرد بنوبة مفرطة. لأن الأندورفين **مفعوله مؤقت** لأنه يفكك من طرف أنزيمات و يفرز فقط عند الضرورة، أما المخدرات فتبقي مثبتة على الواقع لمدة طويلة مما يؤدي إلى الإدمان و التعود.

فالشخص يصبح غير قادر على الإستغناء عن هذا الشعور و يبحث عنه باستمرار و بجرعات متزايدة.

0,5

أما فيما يخص صعوبة التنفس فالمورفين يعرقل التنظيم العصبي للتنفس مما قد يحدث اضطرابات تؤدي إلى الموت أحياناً.

0,5

ج – أعطى الطبيب هذه الوثيقة لرضا حتى يستوعب و يفهم ماذا يحدث بدماغه نتيجة ما يتعاطاه من مخدرات و تأثيرها السلبي على الدماغ و على الفرد ككل.

1

3 – أ – أضرار المخدرات و الكحول : 2

المخدرات	الكحول
<ul style="list-style-type: none"> — إتلاف الأنسجة العصبية. — الإصابة بعدة أمراض أهمها السيدا. — الاختلالات النفسية أهمها (الهلع، فقدان الإرادة، نوبات قلق قد تؤدي إلى الإنتحار). — اختفاء الشعور بالمسؤولية، نوبات الصرع، الهلوسة و عدم الإحساس بالواقع. 	<ul style="list-style-type: none"> — إتلاف الأنسجة العصبية، ضمور المخ. — خلل في المنعكسات قد يؤدي إلى الإصابة بحوادث (فقدان التوازن، تباطؤ ردود الفعل الفطري). — تصلب الشرايين و الإصابة بالحوادث الدماغية (الجلطة). — قصور كلوي حاد، ارتفاع الضغط و الإصابة بداء السكري، و الكبد.

ب – النصائح : الإبعاد عن الكحول و المخدرات لما ينجم عنها من أضرار صحية و أضرار اجتماعية حتى يكون أفراد المجتمع سليمين و بالتالي يكون المجتمع صالحا لأن العقل السليم في الجسم السليم و الفرد السليم في المجتمع السليم.

النصوص

الموضوع السادس 6

التمرين الأول (06 نقط)



يمثل المخطط التالي الجهاز التكاثري الذكري عند الإنسان.

يتكون السائل المنوي من النطاف إلى جانب مواد مفرزة من طرف عدة أعضاء. من بين هذه المواد الفركتوز وهو سكر ناتج من الغلوکوز الدموي.

— النطاف الملاحظة على مستوى الخصية و البربخ تكون ساكنة.

— النطاف الملاحظة على مستوى الحويصلات المنوية تكون متحركة.

يحتوي السوط عند النطفة على بروتينات بنوية تشبه البروتينات البنوية للألياف العضلية المتقلصة.

اعتماداً على هذه المعلومات :

1 — أكتب البيانات مكان الأرقام.

2 — ما هي الأعضاء التي تتدخل في إفراز مكونات السائل المنوي ؟

3 — ما هو المصدر المباشر للطاقة التي تستعملها النطاف المتحركة ؟

أكتب المعادلة الكيميائية التي يتم من خلالها تشكيل هذه الطاقة.

التمرين الثاني (06 نقط)

إليك الصور التالية، تعبّر على عملية هضم الأغذية في الأنوب الهضمي.




4



3



2



1

- 1 — رتب هذه الوثائق حسب تسلسلها الزمني.
- 2 — ما هي التحولات التي تطرأ على هذا الغذاء ؟
- 3 — حدّد شروط تحول الأغذية في الأنبوب الهضمي.
- 4 — ما هي نواتج الهضم بعد نهاية هذه العملية ؟

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

قصدت أمينة عيادة طبيب تشتكي من سعال قوي و حاد مرافق بذبذبات تنفسية أثناء الزفير، تتناقص أثناء الشهيق و مرافق بصوت يشبه صياح الديك. قام الطبيب بفحص العقد اللمفاوية المتواجدة على مستوى العنق (الرقبة) فوجدها متتفحة و مؤلمة عند اللمس، فتوصل إلى أن أمينة مصابة بالسعال الديكي و للتأكد من ذلك طلب من أمينة القيام ببعض التحاليل للبحث عن الجراثيم المسؤولة عن ظهور هذه الأعراض المرضية.

- تحليل لللعاب (البزاق) أظهر تواجد بكتيريا (الوثيقة 1).
- تحاليل مختلفة للدم أعطت النتائج المبينة في الجدول (الوثيقة 2).
- فحص مجهرى للعقد اللمفاوية أظهر تضاعف في حجمها إضافة إلى زيادة في عدد الخلايا اللمفاوية B (الوثيقة 3) مع تحول لعدد كبير منها إلى خلايا بلازمية.



العينة (3) بعد 30 يوما	العينة (2) بعد 15 يوم	العينة (1) في نفس اليوم
<ul style="list-style-type: none"> — عدد الخلايا اللمفاوية 5020 . — عدد الكريات الدموية البيضاء أحادية النواة 1270 . 	<ul style="list-style-type: none"> ثبات نسبة الأجسام المضادة ضد السعال الديكي 	<ul style="list-style-type: none"> نسبة قليلة من الأجسام المضادة ضد السعال الديكي
الوثيقة 2		

ملاحظة : العدد العادي للخلايا اللمفاوية يتراوح بين 1000 و 4000 .

و للكريات الدموية البيضاء أحاديد النواة يتراوح بين 200 و 1000 .

— باستعمال الوثائق المرفقة و باستعمال مكتسباتك :

1 — عرّف البكتيريا و اذكر السبب أو الأسباب التي تجعلها مريضة.

2 — حلل معطيات الجدول، مع إظهار سبب ازدياد عدد الكريات الدموية البيضاء أحاديد النواة. ماذا تستنتج ؟

3 — ما هو نوع الخلايا اللمفاوية المتدخلة ؟ عرفها. فسرّ ماذا حدث على مستوى العقد اللمفاوية.

4 — اشرح التفاعل الذي تم بين البكتيريا الخلايا اللمفاوية (B) مع ذكر العناصر المتدخلة خلال هذه الاستجابة مع ذكر نوعها بالتحليل.

5 — هل أكدت أم نفت التحاليل شكوك الطبيب حول المرض ؟ علّل ذلك. لخص الإستجابة في رسم تخطيطي عليه البيانات.

الحلول

الموضوع السادس 6

التمرين الأول (06 نقط)

1 — البيانات :

1 — مشانة بولية، 2 — حويصل منوي، 3 — بربخ، 4 — خصية، 5 — قضيب.

2 — الأعضاء التي تتدخل في إفرازات مكونات السائل المنوي هي :

1

البروستات — الحويصلان المنويان.


3 — المصدر المباشر للطاقة هو :

1

أكسدة الفروكتوز عن طريق ظاهرة الأكسدة و الخلوية.

المعادلة : (E) تعني طاقة.

1,5



التمرين الثاني (06 نقط)

1

1 — ترتيب الوثائق حسب التسلسل الزمني : 4، 2، 3، 1.

2 — التحولات التي طرأت على هذا الغداء : يتحرز الغداء بفعل الهضم الآلي (الفم و المعدة) و الهضم الكيميائي (بواسطة العصارات المختلفة).

1,5

3 — شروط تحول الأغذية في الأنوب الهضمي هي : جزيئات غذائية متنوعة، أنزيم خاص لكل جزيء، درجة حرارة الحياتية و درجة حموضة خاصة لكل أنزيم لقيامها بتحويل الأغذية البسيطة.

2

4 — نواتج الهضم الناتجة عن تحول الجزيئات الغذائية هي :

0,5

— الغلوسيدات : سكر العنب / البروتينات : أحماض أمينية.

0,5

— الدسم : الأحماض الدسمة و الحلويين.

— الجزيئات التي لا تطرأ عليها تحولات هي : الماء — الفيتامينات — الألياف النباتية.

0,5

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 — تعريف البكتيريا و الأسباب التي تجعلها مرضية :

0,5

— البكتيريا كائنات حية دقيقة مجهرية أحادية الخلية .

— يعود السبب الممرض للبكتيريا لتكاثرها السريع و السمية «التوكسينات» التي تفرزها في الدم .

0,5

2 — تحليل الجدول :

— أظهر الدم تواجد الأجسام المضادة منذ الفحص الأول و استمر تواجدها حتى بعد 15 يوما دليلا على حدوث استجابة مناعية .

0,5

— تزايد في عدد الخلايا اللمفاوية و الكريات الدموية البيضاء أحادية النواة التي تتحول إلى بالعات تقوم بابتلاع البكتيريا محاولة الدفاع عن العضوية، دليلا آخر على حدوث استجابة مناعية .

0,5

3 — نوع الخلايا اللمفاوية المتدخلة و طريقة تدخلها :

0,5

أ — الخلايا اللمفاوية المتدخلة هي الخلايا اللمفاوية البائية (B).

ب — **تعريف الخلايا اللمفاوية :** خلايا دفاعية تنشأ و تنضج في نقي العظام و تدعى بالخلايا (B) نسبة لاسم الإنجليزي لنقي العظام (Bone).

0,5

ج — الفحص المجهري للعقد اللمفاوية يبين تزايدا في حجمها، يعود إلى تزايد الخلايا البلازمية المنتجة للأجسام المضادة و التي تعمل محاولة القضاء على البكتيريا بواسطة الأجسام المضادة النوعية .

0,5


4 — **شرح التفاعل الذي تم مع ذكر العناصر المتدخلة :** عند دخول **البكتيريا** إلى العضوية، و التي تعتبر أجساما غريبة، أفرزت التوكسينات التي نشطت **الكريات الدموية البيضاء أحادية النواة** على الانسال و تحويلها إلى **بالعات** و هجرتها نحو مكان تواجد البكتيريا ثم القيام بابتلاعها، و عدم قدرتها على القضاء عليها أدى إلى تنشيط **الخلايا اللمفاوية (B)** في العقد اللمفاوية أين تحولت إلى **خلايا بلازمية** أنتجت **أجساما مضادة** خاصة بالبكتيريا و التي ارتبطت بها للقضاء عليها، و وبالتالي حدوث استجابة **مناعية نوعية خلطية** لتدخل الأجسام المضادة بواسطة الدم .

2

0,5


5 — نعم تأكّدت إصابة أمينة بالسعال الديكي لحدوث استجابة مناعية نوعية.

تلخيص الاستجابة المناعية النوعية الخلطية.



التمرين الأول (06 نقط)

تمثل الوثيقة الموالية مراحل أساسية لظاهرة جد مهمة.



1 – ما اسم هذه الظاهرة ؟


2 – ما هو مقر حدوثها ؟

3 – هناك مرحلة مهمة لم توضح في هذه الوثيقة، ما هي ؟ مثلها برسم تخطيطي.

4 – ما هي المرحلة التي تلي هذه المرحلة. كم تدوم و أين تنتهي ؟

التمرين الثاني (06 نقط)

يتم استعمال المغذيات مباشرة بعد نهاية عملية الهضم، و يقوم الدم و البلغم بنقلها إلى جميع أعضاء الجسم حتى تقوم خلاياه بتوظيف هذه المغذيات في إنتاج الطاقة أو تركيب عناصر عضوية جديدة. تظهر هذه الوثيقة جانبا من جوانب استعمال المغذيات.



- 1** – ما هي العملية التي يتعرض لها الجلوكوز بعد عملية الهضم ؟
- 2** – ضع مقارنة بين الجلوكوز القادم إلى المعي الدقيق والخارج منه، ماذا تستنتج ؟
- 3** – حدّد دور الكبد من خلال الوثيقة المقترحة.
- 4** – اشرح لماذا تنخفض كمية الجلوكوز دون الواحد عندما يعود الدم مرة أخرى إلى المعي.

الوضعية الإدماجية (٤٨ نقط)

تروي ممرضة قروية «كان مرض الكزار جد منتشر عند حديثي الولادة. تلد النساء على الأرض بمساعدة جاراها دون احتياطات وقائية، فيقطع الحبل السري بسكين أو شفرة قديمة مستعملة، أو شيء حاد، و لا يقف التريف، يتم وضع قليل من الطين على السرة». الإصابة بعصيات الكزار تؤدي إلى الموت. لتأكيد ذلك و معرفة نوع الاستجابة بالكزار، إليك الوثائق التالية التي تبين نتائج تجربة أجريت على فئران.

التجربة ٣	التجربة ٢	التجربة ١
حقن عصبات الكزار بعد ١٥ يوماً	حقن مصل ضد عصبات السل فار محسن	حقن بكتيريا الكزار

التعليمات :

- بالاعتماد على النص و الوثائق المرفقة و معلوماتك المكتسبة :
- ١-أ** – كيف نستطيع تجنب الأطفال الإصابة بمرض الكزار ؟
 - ب** – ما هو العامل المسؤول عن هذا المرض ؟
 - ٢** – فسر نتائج تجربة الوثيقة.
 - ٣** – حقنا فئرين بمصل فئران محسنة ثم حقناها بالتوكسين التكرزي فبقاء حية.
 - أ** – ما نوع الاستجابة ؟ و ما هي العناصر المتدخلة ؟ كيف يتم ذلك ؟
 - ب** – ما هي الوسيلة المستعملة في حياتنا للوقاية ضد الكزار ؟ قارنها مع تلك المستعملة في التجربة ٣ .

التمرين الأول (06 نقط)

0,5


1

1

1 — اسم الظاهرة هي : الأمشاج .

2 — مقرها : تحدث في الثلث العلوي من قناة فالوب .

3 — المرحلة المهمة التي لم توضّح : هي اندماج النواتين الذكرية و الأنثوية .



1

الرسم :

4 — المرحلة التي تلي هذه المرحلة هي : مرحلة الحياة الحرة حيث تنقسم البويضة الملقحة

عدة انقسامات ، تدوم من 5 إلى 7 أيام و تنتهي عند التعشيش في جدار الرحم .

التمرين الثاني (06 نقط)

1 — العملية التي يتعرض لها الجلوكوز بعد عملية الهضم هي :

تخزينه على مستوى الكبد على شكل جليكوجين حتى لا تتجاوز نسبته في الدم $1g/l$.

2 — المقارنة بين الدم القادم إلى المعي الدقيق و الدم الخارج منه تتمثل فيما يلي : إن نسبة الجلوكوز الموجود في الدم القادم للمعي الدقيق ضعيفة بالمقارنة مع نسبة الدم الخارج من المعي الدقيق .

1

نستنتج أن : عملية الهضم تزود الجسم بالجلوكوز لسد حاجاته الطاقوية .

3 — تحديد دور الكبد من خلال الوثيقة المقترحة : يقوم الكبد باستقبال الجلوكوز الناتج عن عملية الهضم و يحوله إلى جليكوجين ليخزن على مستوى، كما يقوم هذا الأخير بتعديل نسبته في الدم حتى لا تتجاوز $1g/l$ لتجنب الشخص داء السكري .

1,5

4 — تناقص كمية الجلوكوز دون الواحد :

عند عودة الدم إلى المعي الدقيق تكون كمية الجلوكوز أقل من $1g/l$ لأن الجسم قام باستعمال الكمية الناقصة في نشاطاته العدّة .

1,5

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

١ - أ - يمكن تجنيد الأطفال الإصابة بمرض الكزاز بتوفير شروط صحية جيدة أثناء الولادة «أماكن و وسائل معقمة».

٠,٥ **ب - العامل المسؤول عن هذا المرض هو :** عصيات الكزاز التي تفرز توكسين ميت.

٢ - تفسير النتائج :

٠,٥ التجربة ١ : موت الفأر دليل على أن عصيات الكزاز ميتة.

التجربة ٢ : الفأر المحسن بالأناتوكسين التكززي قبل ١٥ يوما من حقنه بعصيات الكزاز، لا يموت لأن جسمه أنتج مواد خاصة بمولد ضد عصيات الكزاز، و التي وفرت الحماية لهذا الفأر ضد مرض الكزاز.

التجربة ٣ : موت الفئران المحقونة بمولدات ضد الكزاز، رغم حقنه مسبقا بمصل حيوان آخر محسن ضد عصيات السل، هذا لكون المصل يعطي حصانة ضد السل وليس ضد الكزاز.

١,٥ دليل على أن العناصر المستعملة للوقاية من السل مختلفة عن تلك المستعملة ضد الكزاز.

٠,٥ ٣ - أ - نوع الاستجابة : مناعية نوعية خلطية.

— العناصر المتدخلة : الأجسام المضادة.

— ترتبط الأجسام المضادة المفرزة بمولدات الضد «عصيات الكزاز» و تعمل على التعديل من مفعولها، فيزول مفعولها الميت.

٠,٥ ب - تتم الوقاية ضد الكزاز بواسطة اللقاح.


١,٥ ٤ - مقارنة بين العلاج بالمصل و العلاج باللقاح :

المصل	اللقال
المناعة المكتسبة فورية	المناعة المكتسبة بطيئة
المناعة المكتسبة مؤقتة	المناعة المكتسبة دائمة
يستعمل للعلاج	يستعمل للوقاية

النصوص

الموضوع الثامن 8

التمرين الأول (06 نقط)



تمثل الوثيقة الموالية رسماً تخطيطياً لجزء من عضو معين.

1 – ضع البيانات مكان الأرقام.

2 – ضع عنواناً مناسباً لهذا المخطط.

3 – ما هو الدور الأساسي للخلية (7) ؟

4 – هل الظاهرة الموضحة في المخطط ظاهرة دورية أم مستمرة ؟

التمرين الثاني (06 نقط)

يمثل هذا الجدول تركيب كل من حليب الأم و حليب البقرة.

القيمة الطاقوية	الكتور	الفوسفور	الزنك	الحديد	اليوتاسيوم	الصوديوم	المغنيزيوم	الكلسيوم	نيتروجين	بروتينات	لتحفظ	التركيب 100 g /
280 kJ	95	56	0,35	0,05	150	50	12	128	-	3,3	4,7	ـ
	42	14	0,28	0,07	53	14	3	34	0,36	1,3	7,2	ـ

1 – ضع مقارنة بين تركيبيهما.

2 – ما هو الحليب الذي تفضل تقديمها للرضيع في الأشهر الأولى ؟ علل إجابتك.

3 – اقترح فرضية عن تطور نمو الرضيع في حالة تقديم حليب البقر له. ما هي العاقد التي

تنجر عن صحته في هذه الحالة ؟

4 – ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها للأمهات اللواتي يرضعن ؟

الوضعية الإدماجية (08 نقط)



أصيب فيصل أثناء نزهة مع والديه في حديقة الحيوانات بسياح فانتفع أصبعه كما ظهر ارتفاع محلبي في درجة الحرارة و إحساس بالألم، لم يعر الأبوان اهتماماً لما حدث، لكن بعد بضعة أيام من الإصابة، أصيب فيصل بحمى شديدة و آلام حادة كما ظهر احمرار على طول ذراعه المصابة، و لهذا لجأ به والداه إلى عيادة الطبيب الذي فحص موضع إصابته و أجرى عدة فحوصات.

1 – الملاحظة المجرية لقطعة من النسيج المصابة مبينة في الوثيقة 1.

2 — كما أظهرت معايرة العقد اللمفاوية القرنية من مكان الإصابة، زيادة في عدد الخلايا (1) و (2) الممثلة في الوثيقة 2.

ظهور هذه الأعراض دليل على حدوث تفاعل.

اعتماداً على الوثائق التالية و الملاحظات السابقة و معلوماتك المكتسبة.



1 — انطلاقاً من الأعراض التي ظهرت فور إصابته.

أ — سُم هذا التفاعل و اشرح مصدر ظهور تلك الأعراض.

ب — حدّد نوع التفاعل المناعي الذي تم و اذكر مميزاته الأساسية.

2 - أ - سم الخلايا المرقمة في الوثيقة 1 ، من 1 ← 6 .

ب - سم المراحل E - D - C - B - A التي قامت بها الخلية (2) و أذكر اسم الآلية (س) التي تمت.

ج - أذكر مختلف أنواع الخلايا التي لها القدرة على القيام بالآلية (س).

3 - أ - اذكر أسماء العناصر المرقمة من 1 ← 4 في الوثيقة 2 .

ب - اذكر اسم و دور الخلايا (1) و (2) الملاحظة بالمجهر الإلكتروني ، علل إجابتك.

ج - ضع فريضة تبين فيها طبيعة الاستجابة المناعية التي تمت على مستوى العقد اللمفاوية و التي تسمح لك بتحليل زيادة عدد الخلايا (1) و (2) ثم حدّد دور الخلية (2) في هذه الاستجابة .

الموضوع الثامن 8

الحلول

التمرين الأول (06 نقط)

1 – البيانات : 1 – أنبوب منوي، 2 – طالعة نطفة، 3 – نطفة ناضجة، 4 – خلايا الأم للنطاف، 5 – خلايا بيئية، 6 – لمعة الأنابيب، 7 – خلية مغذية، 8 – خلايا الأم في الانقسام.

2,5

2 – العنوان المناسب : رسم تخطيطي لقطع عرضي على مستوى الأنابيب المنوي.

1

3 – الدور الأساسي خلية سرتولي هو : تغذية الخلية الأم للنطاف.

4 – الظاهرة الموضحة ظاهرة مستمرة و ليست دورية كما هو الحال عند المرأة.

1,5

التمرين الثاني (06 نقط)

1 – مقارنة بين تركيب حليب الأم و حليب البقرة : يحتوي حليب البقرة على كميات متفاوتة من العناصر المغذية لكن حليب الأم يحتوي على أكبر كمية من سكر اللاكتوز كما يحوي كميات كبيرة من البروتينات المنحلة و بروتين الليزوزيم (*Lysozyme*) تؤمن حماية ضد البكتيريا .

1,5

2 – الحليب الذي نفضل تغذيه لرضيع في الأشهر الأولى هو : حليب الأم، لأنه يحتوي على سكر اللاكتوز، المواد الدسمة، الحديد، مواد آزوتية غير بروتينية، و بروتين الليزوزيم (مضاد حيوي).

0,5

0,5

– يعطي حليب الأم أحسن المواد لنمو الدماغ.

– يحمي الطفل من العدوى عشرة مرات أكثر من الأطفال الذين يقدم لهم الحليب الصناعي .

0,5

1

– حليب الأم معقم لا توجد فيه الجراثيم.

3 – اقتراح فرضية حول الرضيع في حالة تقديم حليب البقرة له هي :

– ربما لا يكتسب الرضيع مناعة طبيعية تحميه من الأمراض المختلفة.

1

– كما يصبح الرضيع معرضا للأمراض المختلفة.

4 – النصيحة التي يمكن أن نقدمها للأمهات اللواتي ينجبن هي : يجب تقديم الرضاعة

1

بالثدي ثلاثة أشهر على الأقل.

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 – أ – يمثل هذا التفاعل في الاستجابة الالتهابية و تعود أعراضه إلى :

- الانتفاخ ناجم عن اتساع في الشعيرات الدموية مع خروج للسوائل إلى الخلايا المجاورة.
- الاحمرار يعود إلى تجمع الكريات الدموية الحمراء نتيجة تباطئ الدورة الدموية و كذا الإرتفاع المحلي في درجة الحرارة.

0,75

– الألم يعود إلى الضغط على الهايات العصبية الحسية.

ب – نوع التفاعل : الاستجابة الالتهابية.

الاستجابة الالتهابية عبارة عن رد فعل مناعي لا نوعي أي استجابة مناعية لا نوعية.
تتميز بظهور الأعراض المذكورة كما أن الملاحظة المجرية لمكان الإصابة تبين تجمع البالعات التي تجمّع على الجسم الغريب بشكل لا نوعي، تلتهمه و تفككه.

0,75

لا تتطلب هذه الاستجابة تحصينا مسبقا فهي تلقائية فطرية.

2 – أ – اسم الخلايا من 1 ← 6 : 1 – خلية جدار الشعرية، 2 – كريمة دموية بيضاء

متعددة النواة. 3 – كريمة دموية بيضاء أحادية النواة، 4 – كريمة دموية حمراء، 5 – خلية لمفاوية، 6 – ميكرويات (بكتيريا).

ب – تسمية المراحل من A ← E و اسم الآلية (س) : A – التصاق الكريمة بجدار الشعرية، B – انسالل الكريمة، C – جلب الكريمة و التصاقها بالبكتيريا، D – ابتلاع الكريمة، E – تحلل البكتيريا.

1

0,5

الآلية (س) هي : البلعمة.

3 – أ – اسم العناصر من 1 ← 4 : 1 – غشاء هيولي، 2 – نواة، 3 – هيولة، 4

1

– هو يصل به عصيات.

ب – اسم الخلايا (1) و (2) :

الخلية (1) : خلية لمفاوية فهي دائيرية الشكل بنواة دائيرية تشغل تقريبا كل حيز الخلية.

تحتوي على عضيات عديدة و هي مسؤولة عن الاستجابة المناعية النوعية.


الخلية (2) : خلية بالعنة و هي أكبر حجماً من الخلية (1)، ابتلعت عصيات و عملت على تفكيكها بواسطة أنزيمات، فهي مسؤولة عن الاستجابة اللا نوعية و النوعية.

ج - الفرضية : الزيادة في عدد الخلايا اللمفاوية و البالعات يدفع بنا لافتراض أن استجابة مناعية نوعية قد تمت بفضل تعاون نوعين من الخلايا، مما أدى إلى زيادة عددها على مستوى العقد اللمفاوية.

دور البالعات : تتدخل البالعات في الاستجابة المناعية النوعية كخلية عارضة لمولد الضد، تتبع الأجسام الغريبة، تفككها ثم تعرض محدداً لها على غشائتها و تحلب نحوها الخلايا اللمفاوية المتخصصة لتتعرف على غرابة مولد الضد، ثم القضاء عليه.

التمرين الأول (06 نقط)

بهدف معرفة أنواع و مكان تواجد العصبونات المتدخلة في المنعكس الفطري لك الوثيقة



المقابلة.

1 — ماذا تمثل الوثيقة.

2 — ضع البيانات المرافقة للأرقام

من 1 ← 5 .

3 — بين مكان تواجد :

أ — استطالات العصبونات.

ب — الأجسام الخلوية للعصبونات (مع ذكر أنواع العصبونات).

ج — أنواع المشابك و مكان تواجدها.

التمرين الثاني (06 نقط)

تم قياس كمية الجليكوز الذي تعرض لعملية الهدم (الأكسدة) خلال نشاط رياضي استغرق 240 دقيقة و بوتيرة ثابتة (سباق الماراثون). أخذ كل عداء قبل انطلاق السباق مشروبات تحتوي على 100g من الجليكوز في جرعة واحدة. النتائج يظهرها الجدول المولى و المرفق برسم بياني.


1 — حلل المنحنى و الجدول معا ثم قدّم تفسيرا للظاهرة المطروحة. ماذا تستنتج ؟

2 — هل تستعمل العضوية كل الجليكوز الذي تتحصل عليه من خلال عملية الهضم ؟

3 — اقترح فرضية حول مصير الجليكوز الذي لم يتآكسد خلال النشاط الرياضي.


4 — حدّد مجال استعمال الجليكوز في العضوية.

الجلوكوز المؤكسد	الوقت
0	0
4	20
14	45
18	80
17	110
13,5	150
5	205
3,7	240



الوضعية الإدماجية (٤٨ نقط)

توجه السيد و السيدة «ع» إلى الطبيب الأخصائي لاستشارته، بسبب عدم قدرهما على الإنجاب رغم مرور ٤ سنوات من زواجهما. طلب الطبيب مجموعة من التحاليل و الأشعة أهمها :



- أ — تحاليل دموية للزوجين.
- ب — أشعة لرحم و مبيضي الزوجة و هي أشعة خاصة تتم بحقن مادة متفلورة ابتداء من المهبلي ثم تتبع مسارها إشعاعيا عبر المحاري التناسلية.
- ج — تحليل عينة من نطاف الزوج.
- التحاليل الدموية أعطت نتائج عادلة و طبيعية.
- أشعة الرحم و المبيضين، أعطت النتيجة الموضحة في الوثيقة ١ .
- تحاليل عينات النطاف أعطت النتائج الموضحة في الوثيقة ٢ و ٣ .

النطفة	السائل المنوي
$.75\mu m = 48\%$ طول النطاف : $.18\mu m = 52\%$ إلى $16 = 52\%$	حجم الدفقة : حوالي $5ml$. اللون : أبيض . عدد النطاف : 25 إلى 30 مليون / ml
الوثيقة 3	

باستعمال الوثائق و باستغلال مكتسباتك :

- 1 – أ** – ما هي المعلومات التي تستنتجها من تحليل الوثيقة 1 ؟
- ب –** ما هي المعلومات التي تستنتج من تحليل الوثيقة 3 ؟ هل هي متماشية مع ما توضّحه الوثيقة 2 ؟
- ج –** قدم تفسيراً تحدّد فيه سبب أو أسباب عدم القدرة على الإنجاب عمد السيد و السيدة «ع» .
- 2 –** أنجز رسمياً تخطيطياً وظيفياً توضح من خلاله مسار النطاف من لحظة قذفها في المهبل إلى وصولها مكان الإلقاء و هذا في الحالات الطبيعية.
- 3 –** في حالة هذين الزوجين ما هي الحلول الممكنة التي تقترح عليهما لمعالجة حالة العقم ؟

الحلول

الموضوع التاسع 9

التمرين الأول (06 نقط)

0,5

1 — تمثل الوثيقة مقطعاً عرضياً في النخاع الشوكي.

2 — **البيانات** : 1 — مادة بيضاء، 2 — مادة رمادية، 3 — عقدة شوكية، 4 — جذر ظاهري، 5 — جذر بطني.

1

3 — **أ — مكان تواجد الاستطلالات العصبية** : بحدها في أماكن مختلفة.

0,5

— في المادة البيضاء للنخاع الشوكي.

0,5

— وكذلك في الجذور الظاهرة و الجذور البطنية.

ب — مكان تواجد الأجسام الخلوية للعصيونات :

0,5

— في العقد الشوكية الظاهرة.

0,5

— في المادة الرمادية للنخاع الشوكي.

أنواع العصيونات :

— العصيونات الحسية المتواجدة بالجذر الظاهري و أجسامها الخلوية متواجدة في العقدة الشوكية.

0,5

— العصيونات الحركية المتواجدة بالجذر البطني و أجسامها الخلوية متواجدة في المادة الرمادية و استطالاتها النهائية متصلة بالعضلة.

0,5

— و نجد كذلك في المادة الرمادية عصيونات جامعة بين العصيونات الحسية و العصيونات الحركية.

0,5

أنواع المشابك و مكان تواجدها :

0,5

— مشابك عصبية في المادة الرمادية.

0,5

— مشابك عصبية عضلية في العضلة.

التمرين الثاني (06 نقط)

1 — تحليل المنحنى و الجدول معاً لتقديم تفسير حول الظاهرة المطروحة :

— من 0mn إلى حوالي 80mn زادت كمية الجلوكوز المستهلكة.

— من 80mn إلى حوالي 250mn قلت كمية الجلوكوز المستهلكة.

لكن لا تتوقف .

تفسير الظاهرة :

أ — الإرتفاع التدريجي لاستهلاك الجلوكوز كلما طال النشاط الرياضي .

ب — الانخفاض التدريجي لاستهلاك الجلوكوز بعد تجاوز زمن محدد من بداية النشاط الرياضي .

الاستنتاج : هناك تناوب طردي بين استهلاك الجلوكوز و مدة النشاط الرياضي .

لكن تنخفض تدريجياً كمية الجلوكوز المستهلكة بعد تجاوز 100mn .

2 — استعمال الجلوكوز المتحصل عليه من خلال عملية الهضم : لا تستعمل العضوية كل الجلوكوز المتحصل عليه من خلال عملية الهضم، جزء كبير منه يخزن في الكبد و في العضلات على شكل الجليكوجين.

3 — الفرضية حول مصير الجلوكوز الذي لم يتأكسد خلال النشاط الرياضي : تخزنه العضلات على شكل جليكوجين .

4 — تحديد مجال استعمال الجلوكوز في العضوية : يستعمل الجلوكوز في العضوية أثناء عملية الأكسدة، حيث في وجود ثنائي الأكسجين (O_2) يتأكسد ليحرر طاقة جزء منها يشكل الحرارة الحياتية (37°).

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 — المعلومة المستخلصة من تحليل الوثيقة 1 هي : أن قمع فالوب الأيسر عند هذه المرأة مصاب بانسداد، لهذا لم يمر محلول المفلور، و بالتالي تقل عندها نسبة التخصيب، خاصة إذا حدثت الإباضة من هذه الجهة (المبيض الأيسر).


ب — المعلومات المستنيرة من الوثيقة 2 هي : أن عدد النطاف يقل عن الحالات العادية (من 50 إلى 100 مليون / ml) ، كما أن نسبة كبيرة منها غير عادية فهي قصيرة، و هذا ما تؤكده صورة الوثيقة 2 أين نلاحظ على اليسار نطفة عديمة السوط، يعني غير متحركة.

ج - أسباب عقم هذين الزوجين :

- بالنسبة للمرأة، انسداد إحدى قناتي فالوب يؤدي إلى انخفاض معدل الإخصاب.
- وجود نسبة عالية من نطاف غير متحركة يقلل الإخصاب، لأن عدم قدرتها على الحركة جعلها لا تصل إلى البويضة.

1

2 - المسار :



3 - الحلول الممكنة :

- 1 — إجراء عملية جراحية لمحاولة إزالة الحاجز الموجود في قناة فالوب.
- 2 — إجراء تخصيب اصطناعي و هذا يصب كمية كبيرة من النطاف مباشرة داخل الرحم لتسهيل عملية الصعود لأكبر عدد من النطاف.
- 1 — اللجوء إلى الإلقاء الاصطناعي، خارج الرحم و هذا بإدخال نطفة منتقاة و تكون متحركة ثم لإدخالها مباشرة داخل البويضة، ثم إعادة زرع الجنين داخل الرحم.

النصوص

الموضوع العاشر 10

التمرين الأول (06 نقط)

الجدول التالي يبين نتائج حقن مولد ضد (AG_2) في خنزير هندي 1 و خنزير هندي 2

الأعراض بعد الحقن (2)	الحقن (2)	الحقن (1)	
سعال، إفراز غزير للدموع و مخاط الأنف، صعوبة في التنفس.	مولد ضد $(AG_2), 0,1m\ell$ في الدم	مولد ضد $(AG_2), 0,1m\ell$ في الدم	خنزير هندي (1)
تفاعل جلدي (إحمرار و انتفاخ منطقة الحقن).	مولد ضد $1\%, (AG_2)$ مخفف تحت الجلد	مولد ضد $(AG_2), 0,1m\ell$ في الدم	خنزير هندي (2)

1 — حل هذه الملاحظات المحددة عند الحيوانين.

ب — ما هي الفرضية التي تقتربها لتفسير هذه الملاحظات ؟

2 — نترع قطعة من مساريقا الخنزير 1 ثم نضيف لها قطرة من محلول مولد ضد (AG_2) .

أظهر الفحص الجهرى أن الخلايا mastocyt تفرز في هيولتها حبيبات إفرازية.

— على ماذا تحتوي هذه الحبيبات الإفرازية ؟ هل هذه الملاحظة تدعم فرضيتك المقترحة.

3 — نأخذ مصل الخنزير الهندي 2 بعد 5 أيام من الحقن الثاني و نحقنه في دم خنزير هندي

3 لم يسبق له التعرف على مولد ضد (AG_2) .

بعد 24 ساعة نحقن الخنزير 3 بمولد ضد (AG_2) عن طريق الدّم. يموت الخنزير بعد

20 دقيقة من الحقن الأخير. فسرّ هذه النتائج.

التمرين الثاني (06 نقط)

نقدم لحيوان الجرذ وجبة غذائية تحتوي على عدة جزيئات غذائية و بعد ساعات منأخذ

الوجبة نستخرج محتوى كل عضو من أنبوبه الهضمي و نقوم بالتحاليل.

نتائج التحاليل مدونة في الجدول التالي :

المعي الغليظ	العفج	المعدة	الفم	
0	+	++	+++	البروتينات
0	+++	0	0	الأحماض الأمينية
++	++	++	++	الألياف النباتية

+++ : موجودة بكثرة ، ++ : موجودة بكمية معتبرة ، + : آثار ، 0 : غائب.

من الجدول :

1 — استخرج تطور كل من كميات البروتينات، الأحماض الأمينية و الألياف النباتية منذ دخولها في الفم حتى وصولها إلى المعي الدقيق.

2 — اذكر نوعين من الأنزيمات التي تؤثر في البروتينات ثم حدّد الأعضاء التي تفرز هذه الأنزيمات.

3 — حدّد في جدول نواتج الهضم لكل نوع غذائي و الأنزيم المتدخل في كل مرّة.

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

في مخبر العلوم الطبيعية قسم الأستاذ تلاميذه إلى بجموعتين، ثم بدأ درسه قائلا : «هناك نمطان من الإباضة عند إناث الثديات».

— نمط تلقائي عند الثديات ذات الدورات الجنسية المنتظمة و الدورية.

— نمط تحفيزي يحدث عندما يتصل الذكر و الأنثى جنسيا.

أ — بحري الدراسة الحالية على أرانب بالغة، يتميز مبيض الأرانب بمرحلتين متمايزتين :

— مرحلة A يكون المبيض غنيا بالجزئيات. {
علمًا أن الأرانب تتميز بالإباضة المتعددة دفعات واحدة.

— مرحلة B يكون المبيض غنيا بالأجسام الصفراء. }

يوضع ذكر و أنثى في القفص فيحدث اتصال جنسي، نلاحظ حالة المبيضين :

أ — في العشر ساعات التي تلي الاتصال، يكون المبيضان في حالة مماثلة لـ A.

ب — ابتداء من الساعة العاشرة يبدأ التغيير ليصبح حال المبيضين فيما بعد مشابها لـ B.

ج — إذا لم يحدث أي اتصال جنسي يبقى المبيضان في الحالة A.

— سأل الأستاذ : ما هو العنصر الذي نشّط عملية الإباضة ؟

أجاب أحد التلاميذ : إما سبب كيميائي نظراً للامس النطاف للمحاري التناسلية أو لوجود مادة كيميائية داخل السائل المنوي. تحفز المبيض.

— أجاب الأستاذ : «إن الاتصال الجنسي بين أنثى خصبة و ذكر عقيم أدى إلى الإباضة». اعتماداً على هذه المعلومات و باستغلالك لكتسباتك حدّد : انطلاقاً من معلومات الجزء 1.


I – 1 – ما هو نمط الإباضة عند المرأة ؟

2 – ما هي الفرضية أو الفرضيات الصحيحة من بين اقتراحات التلميذ ؟ عدّل إجابتك.

II – قامت المجموعة الثانية للتلاميذ بأخذ عينات من النطاف في أماكن مختلفة من المحاري التناسلية عند ذكور أرانب بالغة و خصبة يعني (لا تعني عقماً).

— أخذت العينات من الأماكن الموضحة في الوثيقة 1.

— النطاف المستخلصة حقنت لإيناث بالغة و خصبة، نلاحظ الظواهر الناتجة على مستوى المحاري التناسلية الأنثوية بعد وضع النطاف بداخلها. النتائج الحصول عليها مدونة في الوثيقة 2.



		الأشكال الملاحظة
0%	100%	مكانأخذ العينات
الخصية	جسم البربخ	أ - المنطقة القريبة
14%	86%	ب - المنطقة بعيدة
63%	37%	ذيل البربخ
92%	8%	

الوثيقة 2

اعتمادا على الوثائق المقترحة و على معلوماتك :

1 — حدّد ما هي الظاهرة التي حدّت في مستوى المحاري التناسلية الأنثوية في بعض الحالات.

2 — كيف تفسر الاختلاف بين الحالات ؟

3 — انطلاقا من كل الملاحظات حدّد أين تكتسب النطاف قدرها الإخصابية.

الحلول

الموضوع العاشر 10

التمرين الأول (06 نقط)

- 1 – أ –** يتبع من الجدول تماثل خطوات الأعمال التجريبية عند الحيوانين ما عدا اختلاف منطقة الحقن الثنائي بالنسبة للختير 1. محلول مخفف تحت الجلد. 2. محلول مخفف تحت الجلد.
- ب – الفرضية :** الأغراض التي ظهرت أعراض فرط الحساسية الفوري.
- 2 –** الهيستامين مادة مميزة لتفاعلات فرط الحساسية.
- 1 –** هذه الملاحظة تؤكد وجود اضطرابات فرط الحساسية.
- 3 –** مصل الحيوان 2 بعد الحقن الثنائي يصبح يحوي أجساما مضادة نوعية خاصة بـ (AG_2) وهي خاصة بتفاعلات فرط الحساسية، تثبت هذه الأجسام المضادة على خلايا المستوسيت فتحرر هذه الأخيرة مادة ال هيستامين الذي يؤدي إلى ظهور أعراض فرط الحساسية و التي أدت إلى موافقة الخنزير.

التمرين الثاني (06 نقط)

1 – تطور كميات البروتينات، الأحماض الأمينية والألياف في الأنابيب الهضمي :

- كمية البروتينات تتناقص من بداية الأنابيب الهضمي و تقل في المعى الدقيق. 0,5
- تزداد كمية الأحماض الأمينية كلما اقتربت الجزيئات الغذائية من المعى الدقيق. 0,5
- لا تتغير كمية الألياف النباتية بعد عبورها الأنابيب الهضمي. 0,5

2 – تحديد النوعين من الأنزيمات و مقر إفرازها في الأنابيب الهضمي :

- أ – البروتاز : تفرزها الغدد المعدية، ب – البيبيسين : تفرزها الغدة المشكلة.

3 – جدول يظهر نتائج تحول كل الغلوسيدات التي تدخل في تركيب تغذية الإنسان 2,5

الأنزيم المتدخلة	النساء	سكر الشعير	سكر اللبن	سكر الفواكه	سكر القصب
اللعايين	المالتاز	لاكتاز	الفروكتاز	سكاروز	سكاروز
المنتج النهائي	سكر الشعير	سكر الجلوكوز	سكر الجلوكوز	سكر الجلوكوز	سكر الجلوكوز

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

I – 1 – نمط الإباضة عند المرأة : تلقائي لأنها تتميز بدورة جنسية منتظمة.


2 — الفرضية الصحيحة هي : الفرضية الثانية لأن الاتصال الجنسي مع فأر عقيم أحدث إباضة رغم غياب النطاف. إذا يمكن القول بأن تبие المخاطية المهبالية ولد تبيهها عصبيا انتقل إلى المراكز العصبية و كانت الاستجابة على شكل إباضة تنشيطية.

1 — II **1 — الظاهرة التي حدثت على مستوى المخاري التناسلي هي :** الإلقاء.

2 نفس الاختلاف على كون النطاف المأخوذة من الخصية لا تملك القدرة الإخصابية وكلما ابتعدنا عن الخصية اكتسبت النطاف قدرة إخصابية أكثر تصل إلى 92% عند النطاف المأخوذة من ذيل البربخ.

3 نستنتج أن النطفة تتشكل داخل الخصية لكنها لا تكتسب القدرة الإخصابية إلا عند نهاية البربخ يعني عندما تكون قابلة للخروج إلى المخاري التناسلي.

التمرين الأول (06 نقط)



بهدف معرفة تأثير المخدرات في السلوك وحياة الفرد لك الأبحاث التالية :

- نخضع جُرُذاً إلى جرعات متتالية بأحد المنشطات، فنلاحظ عليه نشاطاً حركياً متزايداً وارتفاع في وظيرته القلبية، ضغطه الدموي ودرجة حرارة جسمه.
- عندما يحقن بجرعات قوية، يلاحظ عليه نوبات تشنج.

- وعندما يحقن بجرعات ضعيفة ومتباعدة، بعد بضعة أيام، يلاحظ عليه نفس الأعراض السابقة، ويزداد نشاطه الحركي كما هو موضح في المنحنى المقابل.
- 1** — حلل المنحنى، ماذا تستخلص فيما يخص تأثير المنشطات ؟
 - 2** — هل تعاطيها بكميات قليلة لا يؤثر سلباً في العضوية ؟
 - 3** — استمرار حقن هذا الجُرُذ بجرعات متزايدة أدى إلى موته، اشرح سبب الموت مبرزاً تأثير المنشطان.

التمرين الثاني (06 نقط)

يقضي الكيلوس ساعات عديدة في المعي الدقيق حيث سرعة تنقله في المعي الدقيق لا تتجاوز $.1cm / mn$.

يقوم الجدار الداخلي للأمعاء بامتصاص كل نواتج الهضم ويوافق محتوى المعي الدقيق المتبقى سيره نحو المعي الغليظ بواسطة تقلص عضلاته، يتحول هذا المحتوى من شكل سائل إلى شكل شبه جاف وتصبح سرعة تنقله $5cm / h$.

يقوم المعي الغليظ بعدة وظائف تغير تركيب المواد المتواجدة قبل طرحها إلى الخارج.

- 1** — ما هي طبيعة الجزيئات التي يتم امتصاصها ؟
- 2** — اذكر العناصر التي ترکب محتوى المعي الغليظ.

- ٣** – لماذا نسجل فارقا في سرعة تنقل المحتوى في كلٌ من المعي الدقيق و الغليظ ؟
- ٤** – من خلال مكتسباتك، أذكر أهم وظائف المعي الغليظ .
- ٥** – فسّر سبب تحول ناتج الهضم من شكل سائل إلى شكل جاف.

الوضعية الإدماجية (٠٨ نقط)

في سنة ١٩٨٦ انفجر المفاعل النووي تشنوبيل (Tchernobyl) بأوكرانيا في الاتحاد السوفييتي سابقا.

تحررت من المفاعل النووي مواد مشعة في الجو و نقلتها تيارات هوائية إلى كل بلدان شرق أوروبا و شمالها.



سقطت هذه المواد المشعة على التربة في بلاد السويد، و تم امتصاصها من طرف النباتات الخضراء.

قررت بعد ذلك الحكومة السويدية قتل عدد كبير من حيوان الريناء لأن لحومها أصبحت غير صالحة للاستهلاك.

- ١** – لماذا قررت الحكومة السويدية قتل عدد كبير من حيوان الريناء بعد الحادثة ؟
- ٢** – حدّد الأضرار التي يمكن أن تتخللها المواد المشعة على العضوية.
- ٣** – وضح باستعمال مخطط كيف يمكن أن تنتقل المواد المشعة من المفاعل النووي المتضرر إلى الإنسان.
- ٤** – استخلص العواقب التي يمكن أن تنجو عن استعمال المغذيات في هذه الحالة.

الحلول

الموضوع الحادي عشر 11

التمرين الأول (06 نقط)

1 – تحليل المنحنى : نلاحظ تصاعداً تدريجياً للمنحنى بمرور الزمن، دليل على زيادة في النشاط الحركي نتيجة حقنه المتواصل بالمنشطات التي عملت على ازدياد النشاط العضلي.

1,5

1,25

الاستخلاص : تعمل المنشطات على ازدياد النشاط العضلي الحركي.

2 – لا بالعكس ، نلاحظ أنه حتى عندما حقن الجرذ بجرعات ضعيفة و متباينة ، ظهرت عليه نفس الأعراض التي ظهرت عند حقنه بجرعات قوية أدت في الأخير إلى حدوث تشنج عضلي .

1,25

1

3 – سبب الموت : هو التعب العضلي الناتج عن العمل المكثف لها.

تأثير المنشطات : تحفز المنشطات تحرير وسيط كيمياوي في العضوية يعمل على زيادة نبضات القلب فيزيداد نشاط الجسم بشكل غير عادي ، لهذا الحقن المستمر ينشط العضلات بشكل مطول حتى يصيبها الإرهاق فتوقف عن العمل .

التمرين الثاني (06 نقط)

1 – طبيعة الجزيئات التي يتم امتصاصها : هي عبارة عن جزيئات مبسطة قابلة للأمتصاص تدعى المغذيات .

1

2 – العناصر التي تركب محتوى المعى الغليظ هي : كل العناصر التي كانت تركب الأغذية و التي لم تؤثر فيها أنزيمات العصارة المختلفة مثل الألياف النباتية .

1

3 – يعود الفارق في سرعة تنقل محتوى كل من المعى الدقيق و المعى الغليظ إلى أن : في المعى الغليظ يتم امتصاص الماء و الأملاح المعدنية و الفيتامينات المستخلصة عن نشاط البكتيريا لذا تقل سرعة تنقل محتواه ($5cm/h$) .

1,5

4 – تفسير سبب تحول ناتج الهضم من شكل سائل إلى شكل شبه جاف : يرجع ذلك لامتصاص كل من الدم و البلغم نواتج تحول الجزيئات الغذائية إلى مغذيات (ماء، أملاح معدنية، جلوكوز، أحماض أمينية، الأحماض الدسمة و الحلوين و الفيتامينات) و خاصة الماء

الذي يمتلك بنسنة كبيرة و العناصر غير المهمومة، تصبح شبه جافة و تشكل الفضلات التي تطرح إلى الخارج.

1

5 – أهم وظائف المعي الغليظ هي :

— امتصاص الماء و الأملاح المعدنية.

— إفراز سائل مخاطي يحمي جدرانه.

— هو مقر لنشاط عدد معين من البكتيريا.

1,5

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 – **الغرض من سلسلة التجارب الأولى هو :** معرفة مدة حياة النطاف خارج المجرى التناسلي الذكري.

0,5

2 – **الغرض من سلسلة التجارب الثانية هو :** معرفة مدة حياة البويلات بعد الإباضة أي خروجها من المبيض.

0,5

3 – **تحليل الوثيقة 1 :** — تكون نسبة الخصوبة مرتفعة و ثابتة عندما تخصب اصطناعيا ما بين الساعة 6 و $18h$ ثم تنخفض فجأة لتصبح منعدمة على الساعة 22 .
— حدوث التقارب الجنسي على الساعة 6 و الإباضة حدثت 10 ساعات بعده أي على الساعة $20h$ كانت الخصوبة مرتفعة.

1

— إذا مدة حياة البويلات حوالي 4 ساعات.

— مدة حياة النطاف حوالي 4 ساعات بينما عند الإنسان فهي حوالي من 3 إلى 5 أيام وبعدها تفقد القدرة على الإخصابية.

1

تحليل الوثيقة 2 : حدث التقارب الجنسي على الساعة 6 و 10 ساعات من بعد تحدث الإباضة لهذا ترتفع الخصوبة ابتداء من الساعة $14h$ لليوم الأول، إذا النطاف التي وضعت في اليوم الأول قبل الساعة $14h$ ، فقدت قدرتها الإخصابية.

2

— إذا حياة النطاف بالنسبة للأرانب لا تتعدي 28 ساعة.

4 – الغرض من الاقتران الجنسي مع ذكر عقيم هو : تحفيز المهبل فيرسن برسالة عصبية إلى المراكز العصبية فتكون الاستجابة على شكل أمر بالإباضة، علماً أن الإباضة عند المرأة تكون تلقائية و بشكل دوري.

1

5 – مدة حياة المناسل عند الإنسان هي :

1

– البويلضات من 24 إلى 48 ساعة.

– النطاف من 3 إلى 5 أيام.

التمرين الأول (06 نقط)


تظهر الوثيقة رسمًا تخطيطيًّا لغزو الميكروبات للحواجز الأولية التي تحيط بالعضوية لتحميها من دخول الأجسام الغريبة.

1 — أكتب البيانات المرئية من 1 إلى 8 .

2_أ — ما هي المظاهر الدالة على أن العضوية في حالة استجابة ضد غزو الأجسام الغريبة؟

بـ — اذكر عرضين اثنين من الأعراض الأخرى.

3 — أنجز رسمًا تخطيطيًّا توضح من خلاله دور البلعميات أثناء هذا الغزو.



التمرين الثاني (06 نقط)

1 — حدّد من خلال المحتويات و النسب المبينة على البطاقة المقترحة الحاجيات اليومية الضرورية للكالسيوم.

2 — ما هي السعة بـ (ml) التي يجب استهلاكها يومياً لسد حاجيات الجسم للكالسيوم؟

3 — ما هي كمية الحليب التي يجب استهلاكها لسد حاجياتنا الطاقوية اليومية (للمرأة) ؟
هل هذا ممكن ؟

معدل القيم الغذائية لـ $100m\ell$ من الحليب.

القيمة الطاقوية : $(46kcal)$ $(193kJ)$.

البروتينات : $3,15g$ ، الدسم : $1,55g$.

الكالسيوم : $120g$ (15% من الحاجيات اليومية الضرورية).

كوب من الحليب ($300m\ell$) يغطي 45% من الحاجيات اليومية الضرورية).

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

I — في خلال 6 أشهر تعرض الطفل «سمير. ب» لنوبتي احتباس بولي، لم يستطع خلال كل نوبة طرح البول بسهولة.

II — أثناء النوبة الأولى، طرح سمير و بطريقة تلقائية حصى صغيرا مع البول. كان الحصى يتكون من 90% من مادة هيدروكسى — أدنين.


III — أما النوبة الثانية، استلزمت إجراء عملية جراحية و تخلص الصبي من 26 حصى لها نفس تكوين الحصى الأولى.

بقي سمير في المستشفى لإجراء مجموعة فحوص و تحاليل.

تمثل الوثيقة 1 نتائج بعض هذه التحاليل.

المواد المعايرة	عند سمير	عند شخص آخر
أدنين (مادة آزوتية)	$40mg$ مطروح في البول المفرز طوال 24 ساعة	$1,5mg$ مطروح في البول المفرز خلال 24 ساعة
هيدروكسى — أدنين	كميات كبيرة	غير متواجدة
$A.P.R.T$ نশاط أنزيم معبرة عنه بـ %	$0,008\%$	100%
الوثيقة 1		

في الحالات الطبيعية تُطرح مادة الأدنين في البول أو تفكك أو يعاد استعمالها كما توضحه الوثيقة 2 .



1 — اعتمادا على الوثيقة 2 و 3 و معلوماتك الخاصة :

أ — أنجز الشجرة العائلية لعائلة سمير.

ب — من تحليلك لهذه الشجرة، هل عامل المرض سائد أم متمنح؟

ج — أنجز النمط التکویني لكل فرد.

ملاحظة : إذا كان عامل المرض هو السائد نرمز له بـ ما و السليم بـ م، أما إذا كان عامل المرض متمنح فنرمز له بـ س و العامل السليم بـ سا.

النشاط الأنزيمي لـ APRT	الفرد
50%	الأب
50%	الأم
50%	الجدة (من جهة الأم)
100%	الجدة (من جهة الأم)
100%	الأخ غير الشقيق (مولود من زواج سابق للأم)

الوثيقة 3

— لدراسة أصل المرض، أجريت تحاليل لأفراد عائلة سمير المقربين، مع العلم أنه لا يوجد أي فرد يعاني من هذا المرض، نعایر أساسا نشاط أنزيم $A.P.R.T$ ، النتائج مدونة في الوثيقة 3.

2 — باستعمال هذه المعطيات و معلوماتك المكتسبة، حدّد ما هو مصير الأدينين في جسم سمير مع التعليل.

التمرين الأول (06 نقط)

1 - البيانات : 1 - البشرة. 2 - الأدمة. 3 - بكتيريا. 4 - البلازم. 5 - شوكة.

2 6 - كرية دموية حمراء. 7 - كرية دموية بيضاء. 8 - شعيرة دموية.

2 - أ - المظاهر الدالة على حدوث استجابة :



— تمدد الشعيرات الدموية مع انسال للكريات الدموية البيضاء.

— تجمع الكريات الدموية البيضاء حول الأجسام الغريبة.

— خروج المصل.

ب - احمرار المنطقة وارتفاع درجة الحرارة وظهور آلام بشكل محلّي.

3 - رسم تخطيطي بين مختلف مراحل البلعمة :



التمرين الثاني (٥٦ نقط)

١ - الحاجيات و النسب المئوية الضرورية من الكالسيوم على البطاقة هي :

1

120mg ما تمثل 15% من الحاجيات اليومية الضرورية.

٢ - السعة الإجمالية التي يجب استهلاكها للوصول إلى سد ١٠٠% من الحاجيات للكالسيوم تتمثل فيما يلي :

0,5

$2 \times 300ml = 600ml$ تغطي 90% من هذا الملح المعدي.

— 10% المتبقية نجد قيمتها بـ ml كالتالي :

1

$300ml \rightarrow 45\%$

$x \rightarrow 10\%$

1

$$x = \frac{3000}{45} = 66,66ml$$

٣ - كمية الحليب التي يجب استهلاكها لسد حاجياتنا الطاقوية اليومية عند المراهق : يحتاج

0,5

المراهق يومياً إلى 15048kJ من الطاقة يومياً.

حساب كمية الحليب التي يجب استهلاكها.

0,5

$$15048 \div 193 = 77,96$$

0,5

أي : 77,96 مرات $100ml$


1

غير ممكن استهلاك 7,7 لتر من الحليب خلال 24 ساعة.

الوضعية الإدماجية (٥٨ نقط)

1,5

١ - أ - الشجرة العائلية هي :



ب — عامل المرض متعدد، لأن لا أحد في عائلة سمير مريض، لكنه أصيب بالمرض، يعني أن أبويه منحاه عاملين مرضيين لكنهما متنحيان، مع العلم أن العامل المتنحي لا يظهر إلا في حالة النقاوة.

1

ج — النمط التكويين لكل فرد اعتمادا على معطيات الوثيقة 3 .

0,5

— الأب سليم حامل للمرض يعني ساس.

سا = عامل سائد سليم (غير سليم).

س = عامل متنحي للمرض (مريض).

0,5

— الأم سليمة حاملة للمرض يعني ساس.

0,5

— الجدّة سليمة غير حاملة للمرض ساسا.

0,5

— الجدّ سليم لكنه حامل للمرض ساس.

0,5

— سمير مريض س س.

0,5

— أخي سمير سليم ساسا.

0,5

— زوج الأم الأول ساسا أو ساس.

لو كان زوج الأم مريضاً لكنه حتماً أخوه مريضاً يعني س س.

1

2 — مصير الأدرين في جسم سمير : لا تتحول و يطرح معظمها في البول.

و بما أن أنزيم A.P.R.T تقريباً غير فعال فالأدرين تتحول بفضل أنزيمات أخرى إلى


1

هيدروكس — أدرين التي تتحول إلى حصى تحدث له احتباس البول.

النصوص

الموضوع الثالث عشر 13

التمرين الأول (06 نقط)



تمثل الوثيقة المقابلة عضواً حسياً.

1 – أعط عمواناً مناسباً للوثيقة.

2 – أكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 5.

3 – تبين الأشكال أ ، ب ، ج ، د

أنواع مختلفة من التنبهات، حدّدها.

4 – اربط بين المنبهات المختلفة و المستقبلات الحسية الموافقة لها.

5 – ضع جدولًا توضح فيه العناصر

المتدخلة في حاسة اللمس و دور كل عنصر في هذه الحاسة.

6 – لمسك صفيحة ساخنة أو قدر على النار يدفعك لسحب يدك بسرعة.

حدّد نوع الاستجابة و مثلها بمحاطط مبيناً فيه العناصر المتدخلة.

التمرين الثاني (06 نقط)

ابتداءً من الأسبوع الثامن من الحمل،
يمكنأخذ خلايا جسمية، تزرع في وسط
زرع ملائم ثم ننجز الوثيقة المولالية.
ابتداءً من إحدى الخلايا.

1 – ما اسم هذه الوثيقة؟

2 – كيف نتحصل على الخلايا الجنسية؟

لماذا ننتظر 8 أسابيع؟

3 – ما هو عدد الصبغيات في الوثيقة؟
ذكر أم أنثى؟

4 – هل صاحب الوثيقة عادي؟ إذا كان الجواب «لا»، أين يكمن الخلل؟

الوضعية الإدماجية (٤٨ نقط)

عبد القادر و زهرة زوجان من الجزائر كانوا يقطنان بلاد الصين، مرت عدة سنوات بعد زواجهما و لم ينجبا أطفالاً، رغم متابعة علاج طبي طويلاً. فقدا الأمل و عندما قررا العودة إلى الجزائر تبنيا بنتا صينية في الثالثة من عمرها في صحة جيدة لكن بعدما قضت أسابيع في الجزائر أصبحت تعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي (انتفاخات في البطن، إسهال و تشنجات باطنية . . .) أجرى الطبيب فحوصا عديدة دون أن يجد سبباً لهذه الإضطرابات و ظن أن النظام الغذائي للبنت هو مصدر كل الإزعاجات، و اقترح تنحية عنصر مغذ من النظام الغذائي في كل مرة للوصول إلى معرفة هذا المشكل و بصفة دقيقة.

الوثيقة ١ : يستهلك الرضيع كميات كبيرة من الحليب، لكن أحسن حليب يقدم له هو حليب الأم و لا يمكن أن نتوصل إلى تركيبه الكامل بالطريقة الاصطناعية.

عند استهلاك الحليب يركب الأنبوب الهضمي عند الرضيع أنزيم اللاكتاز (*Lactase*) الضروري لضم سكر اللبن، لاكتوز (*Lactose*) الموجود في الحليب لكن هذه الأنزيم يزول تركيبها كلما قللنا من استهلاكه و $\frac{2}{3}$ من سكان العالم ليس لهم هذا الأنزيم.

الوثيقة ٢ : تركيب الحليب لمختلف الثديات و علاقتها بسرعة نمو صغارها.

محتويات الحليب g / l			عدد الأيام يتضاعف فيها وزن الرضيع	
اللاكتوز	البروتينات	الدهن		
70	9	38	180	المرأة
48	34	37	47	البقرة
41	29	45	19	الماعز

الوثيقة ٣ : مشتقات الحليب و كمية اللاكتوز فيها.

الحليب	الياغورت	الكريمة المتجمدة	الجبن	الكريمة	الزبدة	الأغذية
250ml	125ml	125ml	28ml	15ml	5ml	المقادير
14g - 9	6g	5g	0,6g - 4	0,6g	0,05g	كمية اللاكتوز

باستعمال الوثائق المرفقة و باستغلال مكتسباتك.

١ - أ / ضع مقارنة بين تركيب الحليب الطازج و مختلف مشتقاته.

ب - بين موقع تحول محتويات الحليب في الأنوب المضمي و نوافتها.

ج - لماذا تنخفض نسبة اللاكتوز في مشتقات الحليب ؟

٢ - ما هو سبب الاضطرابات التي تعاني منها الطفلة الصينية ؟

٣ - هل هذه الاضطرابات خاصة بالبنين فقط أو واردة عند بعض شعوب العالم ؟

الحلول

الموضوع الثالث عشر 13

التمرين الأول (06 نقط)

0,25

1 — العنوان : مقطع على مستوى الجلد.

2 — البيانات :

1 — نهايات عصبية حرة.

2 — جسيمات حساسة للضغط الضعيف ← جسيم لسي غولجي.

3 — جسيمات حساسة للضغط القوي ← جسيم لسي باسيني.

4 — جسيمات حساسة للحرارة المرتفعة ← جسيم لسي رافيني.

1,25

5 — جسيمات حساسة للحرارة المنخفضة ← جسيم لسي دوكروسي.

3 — أنواع المنهات :

أ — الحرارة المنخفضة.

ب — الحرارة المرتفعة.

1

د — الضغط الضعيف.

ج — الضغط القوي.

4 — الرابط بين (2) و (3): أ ← 5 / ب ← 4 / ج ← 3 / د ← 2 .


1,5

الجدول :

دور كل عنصر	العنصر المتدخل في الإحساس باللمس
تتولد على مستواها الرسالة العصبية الحسية	النهايات العصبية الجلدية
نقل الرسالة العصبية الحسية	ألياف عصبية — عصب حسي
استقبال الرسالة العصبية الحسية و تحويلها إلى إحساس باللمس	قشرة المخ — سطح اللمس

6 — نوع الاستجابة : لا إرادية (فطرية، تلقائية). 0,25

المخطط : 1,25



التمرين الثاني (06 نقط)

0,5

1 — اسم الوثيقة : الطابع النووي.

2 — تتحصل على الخلايا الجنسية انطلاقاً من السائل الأمينيوسي الذي يطرح فيه الجنين فضلاته و خلايا جلدته التي تتجدد.

1

— ننتظر 8 أسابيع حيث يكون الجنين قد تشكل تقريرياً بشكل تام و يحتوي على كل أعضائه.

1

0,5

1

3 — عدد الصبغيات هو : 47 .

جنس الشخص : ذكر لوجود X و Y .

4 — صاحب الوثيقة شخص غير عادي، لأن الشخص العادي يحتوي على 46 صبغياً و صاحب الوثيقة له 47 صبغياً.

1

1

الخلل يكمن في : الزوج 18 الذي يحتوي على 3 صبغيات عوض 2 .

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 — مقارنة بين الحليب الطازج و مختلف مشتقاته تتمثل فيما يلي : يحتوي الحليب الطازج على كمية معتبرة من سكر اللاكتوز على عكس مشتقاته، التي تتعرض إلى تحولات تجعلها تفتقر لهذا الغلو سيد البسيط.

1,5

ب — موقع تحول محتويات الحليب في الأنوب الهضمي تكون على مستوى المعدة و العفج، لأن على مستوى هذه الأعضاء تحول البروتينات و تنتج أنزيم اللاكتاز.

1

ج - تنخفض نسبة اللاكتوز في مشتقات الحليب لأن غالبية المشتقات تتعرض لعملية التخمر

حتى يتحول إلى متوج قابل للاستهلاك و تستعمل الخمائر المجهريّة جزءاً كبيراً من هذا السكر، لإنتاج الطاقة حتى تتكاثر و تقوم بنشاطها المختلفة.

2 - سبب اضطرابات التي عانت منها الطفلة الصغيرة هي : أن الأنبوب الهضمي للبنت

أصبح غير قادر على تركيب أنزيم هاضمة لحليب اللاكتوز، و هذا ما يسبب ظهور اضطرابات عديدة منها، انتفاخات في البطن، الإسهال و التشنجات الباطنية.

3 - هذه اضطرابات ليست خاصة بالبنت فقط بل يوجد عبر العالم 2/3 من الأشخاص

يعانون من عدم تركيب من طرف أنبوبيهم الهضمي أنزيم اللاكتاز تساعدهم على هضم الحليب .

التمرين الأول (06 نقط)

لدينا زمرة دموية مجهولة، عند إجراء الكشف عليها نتوقع أن ينتهي صاحب هذه الزمرة إلى أحد الاحتمالات الثمانية التالية المبينة في الوثيقة. مع العلم أن إشارة \oplus تشير إلى حدوث تراص و إشارة \ominus تشير إلى عدم التراص.

<i>Anti A</i>	<i>Anti B</i>	<i>Anti AB</i>	<i>Anti Rh</i>	الرّصاصات الإحتمالات
\oplus	\ominus	\oplus	\ominus	الخامس الزمرة ()
\oplus	\oplus	\oplus	\ominus	السادس الزمرة ()
\ominus	\oplus	\oplus	\oplus	السابع الزمرة ()
\ominus	\ominus	\ominus	\ominus	الثامن الزمرة ()

<i>Anti A</i>	<i>Anti B</i>	<i>Anti AB</i>	<i>Anti Rh</i>	الرّصاصات الإحتمالات
\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	الأول الزمرة ()
\oplus	\ominus	\oplus	\oplus	الثاني الزمرة ()
\ominus	\ominus	\ominus	\oplus	الثالث الزمرة ()
\ominus	\oplus	\oplus	\ominus	الرابع الزمرة ()


1 — ماذا تمثل الرّصاصات (*Anti*) ؟

2 — ماذا يقصد بالتراص \oplus ؟ وضح ذلك برسم تخطيطي.

3 — استنتج احتمالات الزمر الدموية (في جدول).

التمرين الثاني (06 نقط)

الفنيل سيتونوريا *Phenyl cetonurie* مرض وراثي يتمثل في أعراض ذهنية و عقلية عند الطفل غير المعالج. هذا المرض مرتبط بعدم قدرة الجسم المصاب على استعمال حمض أميني موجود في الأغذية هو فنيل ألانين يتراكם هذا الحمض الأميني في الدم و يتحول إلى مادة سامة تخرّب الخلايا العصبية، تقوم بالبحث عن العاهة مباشرة بفضل اختبار غوتري *Guthrie* و هذا بفضلأخذ قطرة دم من عقب رجل المولود. كل فرد يحمل عامل المرض لا يكون حتماً مريضاً. يحمل عامل المرض من طرف الزوج رقم 12 للصبغيات.



1 — هل الصفة الممرضة سائدة أم متمنية ؟

2 — رزوجان حاملان للمرض :

أ — ما هي احتمالات ولادة طفل مريض عندهما ؟

ب — ما هي احتمالات ولادة طفل حامل للمرض ؟

علل باستعمال جدول التصالب الذي يمثل الأعراض و بالضبط زوج الصبغى رقم 12 .
إذا كانت الصفة الممرضة سائدة نرمز لها بـ ما و إذا كانت الصفة العاديه نرمز لها بـ عا.

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

في نهاية القرن التاسع عشر، لاحظ طبيب هولندي أعراضًا مماثلة عند مجموعة من الدجاج و مساجين مصابين بداء البري بري (*Béri – béri*) في سجن بجاوا (أندونيسيا).

كان هذا المرض شائعاً في آسيا و تظهر أعراضه في اضطرابات عصبية ينجر عنها شلل الأطراف السفلية، كما لاحظ أن تغذية كل من المساجين و الدجاج تتركب أساساً من أرز مقشور (دون قشرة) و افترض أن هذه التغذية هي السبب الرئيسي في ظهور هذا المرض الذي يسبب خلل في نقل الرسائل العصبية كما يؤثر على نشاط القلب و استعمال الغلوسيدات.

للحتحقق من ملاحظاته قام بتقسيم الدواجن المريضة إلى مجموعتين و أعطى لكل مجموعة تغذية معينة.

- 1 — المجموعة الأولى : قدم لها تغذية أساسها أرز كامل الذي يحتوي على فيتامين (B_1) (بالقصور) و لاحظ بعد مرور أيام اختفاء الأضطرابات العصبية التي كانت تظهر عليهم.
- 2 — المجموعة الثانية : قدم لها تغذية ترتكب من أرز بدون قشور و لاحظ بقاء الأضطرابات العصبية على الدجاج.
- أعراض هذا المرض على الإنسان الوثيقة 1 .
- أرز مقشور الوثيقة 2 .



الوثيقة 2



الوثيقة 1

باستعمال الوثائق المرفقة و باستغلال مكتسباتك.

- 1 — أ / حدّد الخطوات التجريبية التي انتهجهها الطبيب ليتأكد من أسباب مرض البري بري.
- ب — اقترح فرضية للتعرف على أسباب المرض.
- ج — ما هي النتائج التي توصل إليها الطبيب ؟
- د — عرّف طبيعة المادة التي تحتوي عليها قشور الأرز و دورها في العضوية.
- 2 — اشرح في فقرة لا تتجاوز 05 أسطر، علاقة المادة الطبيعية الموجودة في قشور الأرز التي تعرفت عليها و النشاط العصبي.
- 3 — اقترح بعض السلوكات الغذائية التي يجب اتباعها للوصول إلى توازن غذائي.

الحلول

الموضوع الرابع عشر 14

التمرين الأول (06 نقط)

1

— تمثل الرّاّصات الأجسام المضادة.


— يقصد بالتراس \oplus ارتباط الأجسام المضادة النوعية بالمحددات الخاصة بها و التي تدعى

كذلك بمولادات الضد، و المتواجدة على أغشية الكريات الدموية الحمراء و يؤدي هذا

0,5 + 0,5

الارتباط إلى انحلال الكريات الدموية الحمراء (الدم).

1



1

0,5 + 0,5

+

— احتمالات الزمر الدموية : 1

الاحتمالات	1	AB ⁺	A ⁺	2	3	O ⁺	4	5	6	7	8
الزمر الدموية											

التمرين الثاني (06 نقط)

1

— الصفة متنحية لأن الشخص يمكن أن يحمل المرض دون الإصابة به.

1

— الصفة السائدة : ع و المرضية متنحية : ع .

٤ × ١	$\frac{1}{4}$ سليم	ع ع ع ع	أعراس ♀
	$\frac{2}{4}$ سليم و حامل للمرض	ع ع ع ع	أعراس ♂
	$\frac{1}{4}$ مريض	ع ع ع ع	

أ — احتمالات ولادة طفل سليم و حامل للمرض : $\frac{2}{4}$

ب — احتمالات ولادة طفل مريض : $\frac{1}{4}$

الوضعية الإدماجية (٠٨ نقط)

١ — أ — تحديد الخطوات التجريبية التي انتهجها الطبيب للتأكد من أسباب مرض البري

برى تتمثل فيما يلي : — المجموعة الأولى قدم لها أرز كامل بالقشور.

— المجموعة الثانية قدم لها أرز بدون قشور.

ب — بما يحتوي أحد الأرز (المقشور أو بالقشور) على مادة لها علاقة بظهور هذا المرض المميت.

ج — النتائج التي توصل إليها الطبيب هي : أن المجموعة التي قدم لها الأرز بالقشور اختلفت

عنها الإضطرابات العصبية بعد مرور بضعة أيام.

د — طبيعة المادة الموجودة في قشور الأرز و بعد تحاليل عديدة تبين أن : قشور الأرز

تحتوي على فيتامين من نوع (B_1) ضرورية لتنقل السيالات العصبية على مستوى

الأعصاب، تؤمن نشاط القلب، و لها دور في استعمال الغلوسيدات.

٢ — شرح علاقة هذه الفيتامين و النشاط العصبي : نقص الفيتامين (B_1) يؤدي إلى

ضعف العضوية و نقص في الوزن. الأعراض الأولية تتمثل في اضطرابات في النوم، عدم

التنسيق في الأفعال الإرادية بسبب إصابة الجهاز العصبي. كما يؤدي إلى ظهور شلل بصري ثم الغيبوبة فيتوقف تنقل السialات العصبية، الذي يختلف شلا جزئيا ثم كليا فالموت.

2 مواد دهنية مختلفة من الأحسن أن تكون من أصل نباتي.

3 – السلوكيات الغذائية التي يجب اتباعها للوصول إلى توازن غذائي هي :


– تنوع مصدر الأغذية باحترام القاعدة 4 ، 2 ، 1 .

أربعة أغذية غلوسيدية مختلفة كالنشويات : سكاكر بطيئة و غلوسيدات سريعة الاستعمال :

2 سكريات بسيطة، بروتينات متنوعة حيوانية (لحم، دجاج، سمك، بيض، ...).

التمرين الأول (06 نقط)

الكساح مرض يمس الهيكل العظمي و ناتج في أغلب الأحيان عن فقر في فيتامين D . في بعض الأحيان يكون العلاج بفيتامين D غير فعال، هذا النوع من الكساح يسمى بالكساح المقاوم للفيتامين، أحد أنواعه وراثي، تمثل الوثيقة الموالية شجرتين عائليتين للعائلة A و العائلة B .



من تحليلك لهذه الوثائق :

- 1 — هل الصفة الممرضة سائدة أم متمنية ؟ لماذا ؟
- 2 — هل الصفة مرتبطة بالجنس أم لا ؟ لماذا ؟
- 3 — اكتب الأنماط التكوينية المحتملة للعائلة B .
- 4 — رجل و امرأة مصابان، لكن والد المرأة سليم، ما هي الاحتمالات لهذا الزوج لينجب أطفالا مصابين ؟

التمرين الثاني (06 نقط)

بهدف معرفة المسار و الاتجاه الذي تسلكه الرسالة العصبية في منعكس، لك الوثيقة (1) التي تمثل مقطعا عرضيا بالنحاج الشوكي :

- 1 — ضع البيانات المرقمة

من : 1 ← 7 .

- 2 — عندما تنبه، بواسطة تيار

كهربائي، الجذر الظاهري في نقطة A ، نسجل استجابة في نقطة B . و عندما نبه في B لا نسجل استجابة في A ،
كيف تفسر ذلك؟ ماذا تستنتج؟

3 — أعد الرسم و بين عليه مسار الرسالة العصبية موضحا دور كل من 7 و 4 .

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

تستعمل خلايا الأعضاء نواتج الهضم لسد حاجياتها من الطاقة و القيام بنشاطاتها المتعددة.
تستعمل الغلوسيدات و الدسم في إنتاج هذه الطاقة و البروتينات في بناء و ترميم العضوية.
الوثائق التالية تبين بعض مجالات استعمال هذه المواد.

الوثيقة 2: تركيب الدم الداخل للمعثكلة

- 1- بروتينات. 2- ماء. 3- عناصر ذاتية.


الوثيقة 3 : الأنزيمات المعكولة

- 1- الأميلاز. 2- التريبيبيسين. 3- الملتاز. 4- سكاراز. 5- الليباز.

الوثيقة 1 : دور المعكولة في الجسم

الدم الداخل إلى المعكولة

- بروتينات ، ماء ، عناصر ذاتية .



الوثيقة 4 : تركيب الدم الخارج من المعكولة

- 1- بروتينات . 2- ماء . 3- عناصر ذاتية . 4- الأنسولين .

الدم الخارج من المعكولة

- بروتينات ، ماء ، عناصر ذاتية ، الأنسولين .

من خلال ما تعلمت و ما اكتسبت.

1 — أ / حدد كل التحولات التي تطرأ على كل من الغلوسيدات، الدسم و البروتينات.

ب — ما هي الشروط الضرورية لحدوث هذه التحولات؟

ج — عرف الظاهرة التي تسمح بمرور نواتج الهضم من المعي الدقيق نحو الدم.

د — فيم تستعمل نواتج الهضم بعد نقلها عن الطريق الدموي؟

2 — كيف يتمكن الكبد أن يحافظ على نسبة الجليكوز في الدم؟

3 — حدّد من خلال الوثائق دور المعثكلة في الجسم.

4 — اقترح فرضية حول مصدر المواد العضوية التي تدخل في تركيب الأنزيمات و الأنسولين . (*Insuline*)

5 — اكتب في فقرة لا تتجاوز 05 أسطر مجالات أخرى لاستعمال هذه المواد العضوية من طرف الجسم.

الحلول

الموضوع الخامس عشر 15

التمرين الأول (06 نقط)

1 — المرض يظهر عند كل الأجيال، حتى عندما يكون الآبوبين السليمين ظاهرياً، إذا صفة المرض صفة سائدة.

0,5

2 — المرض يظهر عند الذكور و الإناث إذا هو غير مرتبط بالجنس.

0,5 + 0,5

3 — الأنماط التكoinية المحتملة للعائلة (B) :

المريض : نرمز له بـ «ما» و السليم نرمز له بـ «م». .

إذا $12 = \text{مام.} / 13 = \text{م.م.} / 14 = \text{مام.} / 15 = \text{م.م.} / 17 = \text{م.م.}$

2

$16 = \text{مام.} / 19 \text{ و } 18 = \text{مام.} / 20 = \text{م.م.}$

4 — المرأة مصابة نمطها مام.

2,5

b — إذا كان الرجل ماما و المرأة مام.

احتمال ولادة طفل مريض $\frac{3}{4}$.

ما	ما	
ماما	ماما	ما
مام	مام	م

م	ما	
ماما	ماما	ما
مام	مام	م

التمرين الثاني (06 نقط)

1 — **البيانات** : 1 — المادة البيضاء. 2 — المادة الرمادية. 3 — قناة السيساء. 4 — الجذر

البطني. 5 — العصب الشوكي. 6 — عقدة شوكية. 7 — جذر ظهري.

1,75

2 - تفسير النتائج : التنبية في A ، تسجيل استجابة في B أي الجذر البطني، رغم أن التنبية تم في الجذر الظاهري دليل على انتشار الرسالة العصبية من الجذر الظاهري إلى الجذر البطني.

0,75

— التنبية في B ، عدم تسجيل استجابة في A أي الجذر الظاهري عند إحداث تنبية في الجذر البطني دليل على أن الرسالة العصبية لم تمر في الاتجاه المعاكس أي من الجذر البطني إلى الجذر الظاهري.


0,75

الاستنتاج : تسرى الرسالة العصبية في اتجاه واحد من الجذر الظاهري إلى الجذر البطني.

1

3 — مسار الرسالة العصبية :

1,75



تسري الرسالة العصبية في اتجاه واحد من الجذر الظاهري إلى الجذر البطني.

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 — التحولات التي تطرأ على كل من الغلوسيدات، الدسم و البروتينات هي :

0,75

— الغلوسيدات تحول كلها إلى جليكوز.

— الدسم تحول إلى أحماض دسمة و حلوين.

— البروتينات تحول إلى أحماض أمينية.

ب — الشروط الضرورية لحدوث هذه التحولات هي :

— الحرارة (37°).

— أنزيمات مختلفة.

0,75

— درجة حرارة مناسبة لكل من الأنزيمات.

ج – الظاهرة التي تسمح بمرور نواتج الهضم من المعي الدقيق نحو الدم هي :

1

عملية الامتصاص.

د – تستعمل نواتج الهضم بعد نقلها عن الطريق الدموي في نشاطات مختلفة للخلايا (بناء، انتاج الطاقة و تركيب جزيئات جديدة ...).

1

و يخزن الفائض منها حتى يستعمل عند الحاجة.

2 – يمكن للكبد أن يحافظ على نسبة الجلوكوز في الدم باستعمال مادة بروتينية أخرى ترکبها المعكولة تدعى الأنسولين (*Insuline*) يحافظ على ثبات نسبة السكر في الدم.

3 – دور المعكولة في الجسم متعدد هو :

– تركب المعكولة أنزيمات تفرزها في الأنوب الهضمي.

1

– تركب المعكولة أيضاً مادة الأنسولين تفرزها في الدم لتنقل إلى الكبد.

4 – الفرضية حول مصدر المواد العضوية التي تدخل في تركيب الأنزيمات والأنسولين هي : ربما تستعمل العضوية نواتج الهضم مثل الأحماض الأمينية لتركيب هذه المواد.

1

5 – مجالات استعمال المواد العضوية عديدة :

تستعمل العضوية نواتج الهضم المتمثلة في الأحماض الأمينية في تركيب مواد عديدة داخل العضوية : تركيب خلايا جديدة، صنع خضاب الدم ليستعمل في عملية التنفس، تركيب مواد الليف التي يساعد على تثثر الدم.

2

التمرين الأول (06 نقط)

ثلاثة نساء تبدأ دورهن الشهري في يوم واحد.

— السيدة «س» دورها تدوم 28 يوما.

— السيدة «ع» دورها تدوم 26 يوما.

— السيدة «ص» دورها تدوم 32 يوما.

1 — أرسم مخطط الدورة الجنسية لكل واحدة منهن (على شكل دائرة) محددا عليها المرحلة الجريبية و الصفارية و مرحلة الإباضة.

2 — ما هي الفترة المخصصة لكل امرأة؟ علل إجابتك.

التمرين الثاني (06 نقط)

العضوية معرضة للإصابة بمولادات

ضد مختلفة و التي تولد استجابة

مناعية، هذه الاستجابة تتدخل

فيها أنواع من الخلايا، التجارب

المماثلة في الوثيقة 1 تبين دور و

تعاون بعض الخلايا في الاستجابة

المناعية.

نحضر خلايا طحال (عضو مناعي)

ل فأر عادي بوجود المصل، بعض


الخلايا تلتتصق في قاع العلبة

(الخلية الملتصقة A) أغلبها خلايا

ملتهمة «بالعات» الخلايا الأخرى

تبقي حرة (خلايا عالقة NA)

أغلبها خلايا لمفاوية.



يوضع النوعان من الخلايا في وسط زرع مع بعضها أو منفصلة (كما هو موضح في المخطط) و بوجود كريات دموية حمراء لخروف . *GRM*

نتائج تطور التخريب في مختلف أوساط الزرع ممثلة في *A* ، *B* ، *C* و *D* .
+++ ← تخريب.
0 ← عدم تخريب.

السؤال : ازطلاقاً من تحليلك لنتائج التجربة المدروسة و معلوماتك الخاصة بين أن الاستجابة المناعية الخلطية تتطلب تعاوناً وظيفياً بين الخلايا.

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

تشكل داخل الحويصلة الصفراوية حصيات بما يعرف بالتهاب الحويصلة، هذا المرض سببه تشكيل حصى أو حصيات مشابهة للحجارة شكلها دائري يدخل في تركيبها أملاح الكولسترول.

تستقبل الحويصلة الصفراوية السائل الصفراوي الذي يفرزه الكبد، تقوم بتخزينه و طرحه دفعه واحدة في العفج بعد أخذ وجبة غذائية. يمزج السائل الصفراوي مع الأغذية و يحول المواد الدسمة إلى مستحلب يسهل هضمها.

يجرى استئصال الحويصلة الملتهبة بسبب وجود عدد كبير من الحصيات التي تخلف احتباساً في فرز السائل الصفراوي. و من الضروري للمرضى اتباع نظام غذائي فقير من المواد الدسمة مباشرةً بعد العملية الجراحية، حيث يقوم الجسم بعدها بتحويل قناة كوليودوك إلى شبه حويصل صفراوي.



الوثيقة 2 : الحصيات المتشكلة داخل الحويصلة الصفراوية




الوثيقة 1 : الحويصلة الصفراوية قبل استئصالها

من خلال الوثائق و ما تعلمت و مكتسباتك.


- 1** – عرف فيما يؤثر غياب السائل الصفراوي في عملية الهضم.
- 2** – اشرح لماذا ينصح المرضى بعدم تناول الأغذية الغنية بالمواد الدسمة.
- 3** – وضح في بضعة أسطر كيف يحدث هضم المواد الدسمة على مستوى العفج.
- 4** – اذكر الغدة الملتحقة التي تفرز الأنزيم الذي يقوم بتحويل الدسم. اذكر اسم هذا الأنزيم.
- 5** – استخلص نواتج تحول المواد الدسمة.
- 6** – أثناء العملية الجراحية استعمل الجراح أدوات غير معقمة كما يجب.
 - أ** – اذكر عواقب الخطأ الذي ارتكبه السلك شبه الطyi.
 - ب** – حدّد طبيعة الاستجابة المناعية.
 - ج** – بين العناصر المتدخلة في هذا النوع من الاستجابة المناعية.
 - د** – هل يمكن للعضوية القضاء على الإنتران الجرثومي عندما تلتهب العقد اللمفاوية ؟
 - هـ** – اذكر الإجراءات التي يتخذها السلك الطyi عند فشل الاستجابة المناعية في هذه الحالة.

التمرين الأول (06 نقط)


1 – المخطط :



2,25



إباضة



إباضة

2 – الفترة المخصبة تحدد كما يلي :

0,75

حياة النطفة من 2 إلى 5 أيام داخل المجرى التناسلي الأنثوية.

0,75

حياة البوسطة من 1 إلى يومين.

– عند السيدة «س» تمتد فترة الإخصاب من اليوم 10 إلى اليوم 16 من الدورة.

– عند السيدة «ع» تمتد فترة الإخصاب من اليوم 8 إلى اليوم 14 من الدورة.

– عند السيدة «ص» تمتد فترة الإخصاب من اليوم 14 إلى اليوم 20 من الدورة.

التمرين الثاني (06 نقط)

تحليل النتائج :

في A : وجود اللمفاوية لوحدها دون وجود بالعات معها في المصل لم تستطع تخريب GRM و ذلك لعدم إنتاجها لأجسام مضادة لغياب البالعات التي لها القدرة على التعرف على مولد الضد GRM .

1,5

في C : لم تستطع البالعات لوحدها تخريب GRM و ذلك لعدم وجود اللمفاويات المنتجة للأجسام المضادة.

1

في B : في وجود الخلايا المتهمة «البالعات» و اللمفاويات، نلاحظ تخريباً كبيراً في الخلايا GRM (+++) و ذلك يعود لتعاون النوعين من الخلايا في التعرف على مولد الضد ثم إفراز أجسام مضادة ضده، تخربه.

1

في D : في وجود البالعات و الخلايا اللمفاوية للطحال نلاحظ تخريباً كبيراً لخلايا GRM دليل آخر على تعاون النوعين من الخلايا في القضاء على مولد الضد GRM . و منه نتوصل إلى أن نتائج الأجسام المضادة للقضاء على مولد الضد تتطلب تعاوناً مع البالعات التي لها القدرة في التعرف على مولد الضد ثم عرضه على الخلايا المتخصصة «البالعات» التي تعمل على القضاء على مولد الضد في هذه الخلايا، الخلايا اللمفاوية هي البائية (LB) المفرزة للأجسام المضادة.

1,5

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 — التعريف فيما يؤثر غياب السائل الصفراوي في عملية الهضم : في غياب السائل الصفراوي لا يمكن أن تترجّل المواد الدسمة مع الماء و لا يمكن أن تتحول إلى جزيئات صغيرة لتتمكن إنزيم الدهون على تحويلها إلى أحماض دسمة.

1

2 — ينصح المرضى على عدم تناول أغذية غنية بالمواد الدسمة بعد عملية استئصال الحويصلة الصفراوية لأن الكبد لا يحتوي على كيس آخر لتخزين السائل و طرحه خلال الوجبة الغذائية.

1

3 – كيفية حدوث عملية هضم المواد الدسمة على مستوى العفج : تمرج الدهون مع السائل الصفراوي و تحول إلى قطرات زيتية صغيرة ثم تتعرض للأنزيم التي تجزئها إلى مواد أقل تعقيدا.

1,5

4 – اسم الغدة الملتحقة : الغدة الملتحقة التي تفرز الأنزيم التي تقوم بتحويل الدهنيات هي المتشكلة.

0,5

0,5

اسم الأنزيم : الليباز .

5 – استخلاص نواتج الهضم : نواتج الهضم هي الأحماض الدسمة و الحلويين.

1

6 – أ – عواقب الخطأ الذي ارتكبه السلك شبه الطبي هو : ظهور إنتان جرثومي عند

0,5

المريض بعد العملية.

0,5

ب – طبيعة الاستجابة المناعية في هذه الحالة هي : لا نوعية.

ج – العناصر المتدخلة في هذا النوع من الاستجابة المناعية هي :

0,5

كريات الدم البيضاء .

د – لا يمكن للعضوية القضاء على الإنتان الجرثومي عندما تلتهب العقد اللمفاوية، إلا بعد

0,5

مرور عدة أيام حتى تتدخل المناعة الطبيعية.

هـ – الإجراءات التي يتخذها السلك الطبي عند فشل الاستجابة المناعية هي : استعمال

مضادات حيوية (Antibiotiques) المناسبة لهذه الحالة.

0,5

مساعدة العضوية على تهيئة استجابة مناعية خاصة و هذا بعد مرور عدة أيام.

التمرين الأول (06 نقط)

تزوج رجل ببني العينين من امرأة زرقاء العينين فكان نسلهما متكونا من 3 أطفال كلهم ذواوا عيون بنية.


- أحد الأبناء تزوج من امرأة زرقاء العينين فأنجبا طفلة عيناها زرقاوان و إبنا عيناها بنيتان.
- الإبن الثاني تزوج من امرأة بنية العينين فأنجبا ولدين أحدهما ببني العينين و الثاني عيناها زرقاوان.

1 — ما هي الصفة السائدة و الصفة المتنحية ؟ لماذا ؟

2 — ارسم الشجرة العائلية الخاصة بلون العيون لهذه العائلة محددا الأنماط التكورية لكل فرد.

التمرين الثاني (06 نقط)

إليك الرسم التخطيطي التالي :



1 — حدّد نسبة السكر في الدم قبل و بعد عملية الإمتصاص.

2 — ما هو مصدر الجليكوز في الدم ؟


3 — حدّد العضو الذي يعمل على ثبات نسبة السكر في الدم.

4 — اقترح فرضية حول زيادة نسبة الجليكوز في الدم و ما هي العواقب التي تخلفها ؟

الوضعية الإدماجية (٤٨ نقط)

يحضر اللقاح $D T . C . P$ انطلاقا من :

- توكسينات الدفتيريا *Diphtheria toxin* و الكزار *Tetanus toxin* المنقهة (النقية) و المحلول إلى أناتوكسين (توكسينات محددة المفعول).
 - من لقاح الشلل (*Polio myelitis*) المشكّل انطلاقا من مزارع خلوية مخموجة بالفيروسات المحددة المفعول.
 - بكتيريا السعال الديكي المقتولة *Bacterie de la coqueluche*.
- يحتوي اللقاح على ثلات حقن تعطى واحدة كل أسبوع على الأقل، مع إعادة الحقن بعد سنة واحدة وإعادة إضافية خمس سنوات فيما بعد.
- ثم قياس كمية الأجسام المضادة النوعية عند فرد و النتائج دونت في الوثيقة.



باستغلالك للوثائق و معلوماتك :

- ١** — ما هي مكونات اللقاح؟ و ما هي التغيرات التي أجريت على كل مركب؟ و لماذا تجرى هذه التغيرات؟
- ٢** — قارن تطور كمية الأجسام المضادة بعد كل حقنة.

3 – من المتسبب في تشكل الأجسام المضادة؟

4 – صفات مبدأ اللقاح، هل هو طريقة وقائية أم علاجية؟

5 – ما هي أهمية الإعادات؟

الحلول

الموضوع السابع عشر 17

التمرين الأول (06 نقط)

0,25


0,25

1

السبب : ظهرت في الجيل الثاني رغم أن الأم تحمل صفة اللون الأزرق، هذا يعني أن صفة اللون البني قهرت صفة اللون الأزرق .

2 — الشجرة العائلية :

2



— الأنماط التكينية : بني = با

— الصفة المتنحية : زرقاء = ب

1 با با — 2 ب ب — 3 ب ب — 4 ، 5 و 6 با ب — 7 با ب — 8 ب ب
— 9 با ب — 10 با با او با ب — 11 ب ب .

التمرين الثاني (06 نقط)

0,5

0,5

1 — نسبة السكر (الجليكوز) في الدم قبل و بعد عملية الامتصاص هي :

قبل الوجبة : $0,8g/l - 1g/l$

بعد الوجبة : $1,5g/l - 1,8g/l$

1

3 – ينقل الجلوكوز بواسطة الدم نحو الكبد بواسطة الوريد البابي و يقوم الكبد بتخزين الفائض من الجلوكوز على شكل جلوكوجين و يقوم هذا العضو على ثبات نسبة السكر في الدم $1g/l$ 2,5

4 – اقتراح فرضية حول زيادة نسبة الجلوكوز في الدم و العواقب التي تخلفها هذه **الظاهرة** : ربما زيادة نسبة السكر في الدم قبل و بعد وجبة غذائية يرجع الخلل حيث لا يتمكن الكبد من تخزينه و تزداد نسبته في الدم مما يؤدي إلى ظهور داء السكري عند الإنسان.

1,5

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 – **مكونات اللقاح** : يحتوي اللقاح $DT.C.P$ على مزيج من :

- توكتسينات الدفتيريا و الكزانز المحولة إلى أناتوكسين.
- خلايا مخموجة بفيروس (*Polio myélite*) المعدل.
- بكتيريا السعال الديكي المقتولة.

1

التغيرات التي أجريت على كل مركب :

- عولجت توكتسينات الدفتيريا و الكزانز بالفورمول و الحرارة حتى فقدت مفعولها السام.
- قتل فيروس و بكتيريا (*Polio myélite*) ، و السعال الديكي.

0,5

2 – مقارنة تطور الأجسام المضادة بعد كل حقنة :

عند الحقن الأول، كمية الأجسام المضادة المتشكلة تكون ضئيلة مقارنة بالكمية المتشكلة أثناء الحقن الثاني أين كانت الكمية كبيرة جدا تتجاوز 100 1.

إضافة إلى ذلك فإن تشكل الأجسام المضادة عند الحقن الأول يبدأ بعد مدة زمنية طويلة و هو الزمن اللازم للتعرف على مولد الضد و بداية تشكيل الأجسام المضادة الخاصة به.

1,25

— أما عند الحقن الثاني فتشكل الأجسام المضادة يكون مباشرة بعد الحقن لتدخل الخلايا المناعية *LB* ذات الذاكرة التي تعرف بسرعة على مولد الضد فتشكل بسرعة الأجسام المضادة الخاصة به .

3 — المسبب في تشكيل الأجسام المضادة هو : الأناتوكسين التكززي الذي يعتبر جسما غريبا أي مولد الضّد.

4 — مبدأ اللقاح : حقن مولدات الضد فقدت مفعولها السام المميت في العضوية حتى تتعرف عليه فتشكل أجساما مضادة خاصة به و بالتالي تعطي وقاية للعضوية.

— الطريقة هي طريقة وقاية.

5 — أهمية الإعادات : تذكر الخلايا المناعية المتخصصة بنية مولد الضد، حتى تحفظ به في ذاكرتها و عند ملامسته تكون الاستجابة سريعة.

و ذلك يعود لكون الخلايا ذات الذاكرة لها قدرة على الاحتفاظ لمدة زمنية ثم تفقدتها، لهذا وجوب إعادة اللقاح.

1

التمرين الأول (06 نقط)

تحوّل كل البروتينات أثناء عملية الهضم إلى أمراض أمينية.

1 — اذكر أربع مواد كيميائية ترکبها العضوية باستعمال البروتينات.


2 — ما هي مجالات استعمالها ؟

3 — المخطط المقابل يمثل

مجموعتين من الأمراض

الأمينية، تشكل كل

مجموعة بروتين معين.



أ — هل هذه البروتينات متماثلة ؟

ب — اشرح لماذا البروتين (أ) يختلف عن (ب).

التمرين الثاني (06 نقط)

1 — عرف الصفة الوراثية، و اعط أمثلة.

2 — أنجز رسمًا تخطيطياً لزوج صبغي و مثل عليه صفة وراثية.

ماذا يحمل كل صبغي من هذه الصفة ؟

3 — إقرأ النص الموالي بتأنٍ :

«يتميز رضا بأذنين صغيرتين، عيناه عسليتان، عند عودته من العطلة الصيفية كانت بشرته داكنة اللون، منذ أن أصبح يمارس الرياضة بانتظام نمت جملته العضلية بشكل ملحوظ، لكنه يقي ذو قامة متوسطة، رضا شعره أشقر و طويل».

— حدّد الصفات التي تحملها و تلك التي نتجت من جراء الوسط الذي نعيش فيه و صنف النوعين في جدول.

الوضعية الإدماجية (٤٨ نقط)

عوجلت فتران بأشعة سينية (X Rayon). نتج عن هذه العملية تفكيك لنقي العظام، و الخلايا اللمفاوية، وزعت هذه الفتران على ثلاث مجموعات (١; ٢; ٣) نزعت الخلايا اللمفاوية للمجموعتين (٢; ٣) قبل تعریضها للأشعة السينية ثم أعيد حقنها بعد معالجتها بالأشعة.

هناك مجموعة رابعة (٤) لم تعالج بالأشعة، تمثل المجموعة الشاهدة. ثم تم حقن هذه الفتران ببكتيريا، و الجدول التالي يبين في كل مجموعة ما إذا تم إنتاج للأجسام المضادة بضعة أيام بعد الحقن.

ملاحظة : نذكر أن هناك نوعين من الخلايا اللمفاوية البائية (LB) و التائية (LT)

رقم المجموعة	المعالجة بالأشعة (RX)	حقن ببكتيريا	النتائج (بعد بضعة أيام)
1	الأشعة (RX)		عدم إنتاج أجسام مضادة
2	الأشعة (RX) تم حقن الخلايا اللمفاوية (B) و (T)		إنتاج أجسام مضادة
3	الأشعة (RX) تم حقن الخلايا اللمفاوية (B)		عدم إنتاج أجسام مضادة
4	لم تجرى أية عملية		إنتاج أجسام مضادة

bastugallak للوثائق و معلوماتك :

- 1 – قارن بين المجموعتين (١) و (٤)، ما هو تأثير الأشعة (X) ؟
- 2 – قارن بين المجموعتين (٢) و (٣) و اقترح فرضية حول مصدر الأجسام المضادة.
- 3 – انطلاقاً من معلوماتك، اشرح كيف يتم إنتاج الأجسام المضادة.

الحلول

الموضوع الثامن عشر 18

التمرين الأول (06 نقط)

1 – المواد الكيميائية الأربع التي تركبها العضوية باستعمال البروتينات هي :

0,5

0,5

0,5

0,5

أ – الهيموغلوبين (خضاب الدم).

ب – الأنزيمات (عصارات).

ج – مولد الليفين (تخثر الدم).

د – الأكتين (مركباً أساسياً في خلايا العضلات).

2 – مجالات استعمال المواد الكيميائية هي :

0,5

0,5

0,5

0,5

أ – تساعد الهيموغلوبين كريات الدم الحمراء على نقل الغازات.

ب – تستعمل الأنزيمات في تحليل الجزيئات الغذائية المعقدة.

ج – يستعمل مولد الليفين في تخثر الدم عند حدوث نزيف دموي.

د – تدخل الأكتين في تركيب الخلايا العضلية و تساعدها على التقلص (الحركة).

3 – الجموعتان من الأحماض الأمينية :

1

أ – ليست متماثلة.

ب – يختلف البروتين (أ) على البروتين (ب) في تركيب الأحماض الأمينية، إذا تغير مكان

1

تواجه حمض أميني ما يتشكل بروتين مخالف للآخر.

التمرين الثاني (06 نقط)

1 – الصفة الوراثية هي : خاصية أو ميزة تميز الأفراد أو النوع الواحد و تكون متناقلة عبر

الأجيال كلون الشعر، طول القامة، لون العينين و حتى الداخلة منها كموقع القلب، توزع

الأعضاء عند النوع الواحد، فالبشر كلهم يملكون يدين، رجلين، قلبا واحدا، عينين... 1


2 – رسم خططي لزوج صبغي :

عامل وراثي —

يحمل كل صبغي عامل وراثي واحد للصفة، يعني الصفة ممثلة بعاملين وراثيين متوضعين في نفس المكان من الصبغي.

1,5

3,5



3 — الجدول :

الصفة الناتجة عن تأثير الوسط	الصفة الوراثية
بشرة داكنة	أذنان صغيرتان
الجملة العضلية النامية	عينان عسليتان
شعر طويل	قامة متوسطة شعر أشقر

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 — مقارنة بين الجموعتين (1) و (4) :

— تعتبر المجموعة (4) مجموعة شاهدة تم لديها إنتاج الأجسام المضادة بشكل طبيعي.
 — أما المجموعة (1) التي عرضت للأشعة (RX) ، لم يتم فيها إنتاج للأجسام المضادة لأن الأشعة (RX) فككت الخلايا المفاوية و نقي العظام و هو العضو الذي يتم على مستوى تشكل الخلايا المفاوية بأنواعها و من ضمنها الخلايا المسئولة عن إنتاج الأجسام المضادة بالبكتيريا المحقونة.

1,5

— **تأثير أشعة (RX) :** تحطم نقي العظام و الخلايا المفاوية المسئولة عن الدفاع عن العضوية و بالتالي تفقد العضوية قدرتها على الدفاع.

1

2 — مقارنة بين الجموعتين (2) و (3) : عرضت الجموعتين للأشعة (RX) التي تسببت في تحطيم نقي العظام، لكن هاتين الجموعتين نزعتا منها الخلايا المفاوية قبل تعريضهما للأشعة ثم أعيد حقنها بعد المعالجة (RX) .

2

فرضية حول مصدر الأجسام المضادة : مصدر الأجسام المضادة هي الخلايا المفاوية البائية (LB) ، التي تنشأ على مستوى نقي العظام، بالتعاون مع (LT) .

1

3 – شرح كيفية تشكل الأجسام المضادة : عند حقن البكتيريا، تعرفت العضوية على غرائبها فاعتبرتها مولد ضد و لهذا **تدخلت الخلايا المفاوية البابية (LB)** على مستوى نقي العظام، فتعرفت على غرابة مولد الضد ثم تحولت إلى خلايا بلازمة منتجة للأجسام المضادة، فتشكلت الأجسام المضادة النوعية الخاصة بالبكتيريا.

2

المجموعة 2 : تم حقن (LB) و (LT) . نتج عن هذا الحقن إنتاج للأجسام المضادة.
المجموعة 3 : حقن (LB) فقط. لم يتم إنتاج للأجسام المضادة لعدم توفر الخلايا المفاوية (LT) .

التمرين الأول (06 نقط)

تمثل الوثائق التالية هضم المواد الدسمة خلال تحولها في الأنوب الهضمي بعد تعرضها إلى نوعان من التفاعلات.

التفاعل الأول يتمثل في تعرُّض المواد الدسمة للسائل الصفراوي و الثاني للعصارة المعثكلية.

- 1** — رتب الوثائق حسب مراحل تحول المواد الدسمة.
- 2** — ما هو تأثير السائل الصفراوي على الدسم؟ حدّد العضو الذي يتم فيه هذا التأثير.
- 3** — اشرح لماذا يجب أن تؤثر السائل الصفراوي على الدسم قبل تعرُّضه إلى أنزيم خاص به . عرف هذه الأنزيم و العضو الذي يفرزها.

التمرين الثاني (06 نقط)


يتناول شخص وجبة غذائية مركبة من السبانخ، تقضي الأغذية 12 ساعة في الأنوب الهضمي، و تعرُّض إلى عدة تحولات ميكانيكية تأخذ العضوية ما تحتاج من المغذيات و تطرح الباقي على شكل فضلات.

- 1** — ما هي العناصر الغذائية الأساسية التي تحتوي عليها البيانخ ؟
- 2** — ضع في جدول العناصر التي تتعرُّض لعملية الهضم و التي لا يطرأ عليها أي تغيير.
- 3** — فيما تستعمل هذه المغذيات ؟
- 4** — ما هي العناصر السائدة في تركيب السبانخ ؟
- 5** — هل تتعرُّض هذه العناصر إلى تحول كيميائي في الأنوب الهضمي ؟ اشرح لماذا .
- 6** — فيما تساعد هذه العناصر في عملية الهضم ؟

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

أصيَّبَ الطفَلُ عادِلٌ، وَ هُوَ يَلْعَبُ بِأَدَوَاتٍ تَصْلِحُ قَدِيمَةً. لِجَأَ وَلَدًا عادِلَ بِطَفْلِهِمَا إِلَى قَاعَةِ الإِسْعَافَاتِ بِالْمُسْتَشْفَى، هُنَاكَ قَامَ الْمُرْضِنَ بِتَنْظِيفِ الْجَرْحِ الْمُمْثَلِ بِالْوَثِيقَةِ 1، تَطَلُّبُ الْأَمْرِ إِجْرَاءَ غَرْزَتَيْنِ بِسَبَبِ عَقْمِ الْجَرْحِ كَمَا طَلَبَ الطَّبِيبُ حَقْنَهِ بِالْمَصْلِ الْمُضَادِ لِلْكَزَازِ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ

أن الطفل لم يتلق حقن إعادة اللقاحات، بهدف معرفة مدى تأثير عصيات الكزار في العضوية، لك التجارب التي أجريت على حيوانات، و المتمثلة بالوثيقة 2.



التجربة 3	التجربة 2	التجربة 1
حقن فأر (C) بأناتوكسين الكزار	حقن فأر (B) بأناتوكسين الكزار	حيوان (A) غير محصن
حقن الفأر (C) بـ توكتسين الكزار بعد 15 يوما	حقن الفأر (B) في نفس اليوم بـ توكتسين الكزار	حقن الفأر (A) بـ توكتسين الكزار
بقاء الفأر (C) حي	موت الفأر (B)	موت الفأر (A)

الوثيقة 2

bastuglalk للوثائق و معلوماتك :

- 1** – ماذا تمثل الوثيقة 1؟ صف أهم الأحداث المبينة فيها.
- 2** – ما هي التعقييدات التي تخوف منها الطبيب؟
- 3** – حلل تجربة الوثيقة 2 و ماذا تستنتج من كل التجارب؟
- 4** – باستعمال معلوماتك حول الاستجابة المناعية، ارشح طريقة تأثير المصل.
- 5** – هل مفعول المصل دائم؟ عمل إجابتكم.
- 6** – مثل برسم تخطيطي مراحل الاستجابة المناعية المدروسة محدداً نوعها.

الحلول

الموضوع التاسع عشر 19

التمرين الأول (06 نقط)

- 1,5 — ١ — ترتيب الوثائق : 3 / 1 / 2 .
- 2 — ٢ — يقوم السائل باستحلاب الدسم و تتم هذه العملية على مستوى العفج.
- 3 — ٣ — بعد عملية استحلاب الدسم يصبح على شكل قطرات دهنية صغيرة جداً يستطيع أنزيم خاص به أن يفككه إلى حمض دسمى و جليسيرول.
- 2,5 — الأنزيم هي أنزيم اللياز و العضو الذي يفرزها هي المنشكةلة.

التمرين الثاني (06 نقط)

- 1 — ١ — العناصر الأساسية التي يحتوي عليها السبانخ في 100g هي :
- 0,5 — الغلوسيدات 0,8g ، البروتينات 2,79g ، و الدسم 0,4g .
- 0,5 — الفيتامينات E,C,A أملاح اليود و الكالسيوم و غني بالألياف النباتية 4,6g .
- 2 — ٢ — الجدول التالي يظهر الجزيئات الغذائية التي طرأ عليها تحول و التي تبقى محافظة على تركيبها .

الأغذية التي لا يطرأ عليها أي تحول	الأغذية التي يطرأ عليها تحول
— الفيتامينات : E,C,A .	— الغلوسيدات .
— الأملاح المعدنية .	— البروتينات .
— الألياف النباتية .	— الدسم .

- 3 — ٣ — مجالات استعمال هذه المغذيات تمثل في بناء العضوية، الفيتامينات و الأملاح المعدنية أغذية وظيفية أما الألياف النباتية تسهل نقل الأغذية في الأنابيب الهضمي : أغذية الحشو.
- 2,5 — ٤ — تتركب السبانخ أساساً من الألياف النباتية .
- 1 — ٥ — لا تتعرض الألياف النباتية لعملية الهضم لأنها غلوسيدات جد معقدة و لا توجد أنزيم يفرزها الأنابيب الهضمي قادر على تفكيكها .

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

0,5

1 — قشر الوثيقة (1) : بعض أعراض الاستجابة الالتهابية إثر الإصابة.

وصف المراحل المبينة في الوثيقة :

0,25

0,25

0,25

— اتساع الشعيرات الدموية و انسلاط الكريات الدموية البيضاء.

— تجمع البالعات (الكريات الدموية البيضاء) حول الأجسام الغريبة.

0,5

2 — تخوف الطبيب من إصابة الطفل بالكزاز.

3 — تحليل التجارب :

التجربة 1 : حقن فأر غير محسن بتوكسين الكزاز تؤدي إلى موت الفأر دليل على أن توكسين الكزاز سام و ميت.

0,5

التجربة 2 : حقن الفأر (B) بأناتووكسين الكزاز و حقنه في نفس اليوم بتوكسين الكزاز أدى إلى موته دليل على أن الأناتووكسين لم تحصنه بعد.

0,5

التجربة 3 : حقن الفأر (C) بتوكسين الكزاز 15 يوماً بعد حقنه بأناتووكسين الكزاز، يبقى حيا دليلاً على أن الأناتووكسين أعطته حصانة ضد توكسين الكزاز.

0,75

الاستنتاجات :

— توكسين الكزاز، توكسين ميت يمكن أن تحصن العضوية ضده بحقنها بأناتووكسين الكزاز «و هو توكسين فقد مفعوله السام».

0,75

4 — طريقة تأثير المصل :

يحتوي المصل المضاد للكزاز على أجسام مضادة ضد الكزاز و عند حقنها ترتبط هذه


الأجسام المضادة بمولد الضد «التوكسين التكززي» و التحديد من مفعوله السام الميت.

1

5 — مفعول المصل المضاد للكزاز مؤقت لأن الحصانة ضد الكزاز تتوقف ب مجرد زوال الأجسام المضادة المحقونة .

1


6 — المخطط :



الموضوع العشرون 20

النصوص

التمرين الأول (06 نقط)



أنجزت الوثيقة الموالية ابتداء من خلية لحيوان بري هو الفهد.

— 1 — أكتب الصيغة الصبغية لهذه الخلية.

— 2 — هل الخلية جنسية أو جسمية؟ لماذا؟

— 3 — هل الكائن ذكر أم أنثى؟ لماذا؟

— 4 — على أي أساس رتبت الصبغيات؟

— 5 — أنجز رسمًا تخطيطيا لأحد الصبغيات كما يظهر في هذه الوثيقة مع وضع البيانات الملائمة.

التمرين الثاني (06 نقط)

محمد، علي، هشام، و سهام أطفال في السن الرابعة عشر (14) ، يزن كل واحد على الترتيب 48kg ، 53kg ، 60kg ، 70kg .

— 1 — احسب مؤشر البدانة عند كل طفل.

— 2 — حدّد الأطفال الذين يسجلون عندهم مؤشر البدانة المرتفع.

— 3 — اشرح في بضعة أسطر أسباب ظهور البدانة عندهم.

— 4 — ما هي الأمراض التي يمكن أن يتعرضوا لها عندما يبلغون سن الرشد.

— 5 — ما هي النصائح التي يمكن تقديمها للأطفال لتجنب البدانة؟ علماً أنه حسب المنظمة الدولية للصحة تم إحصاء 1,6 مليار من الأطفال يعانون من السمنة.

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

وصل إلى قاعة الاستعجالات بإحدى المستشفيات رجلان، حدث شجار بينهما بواسطة وسائل حديدية قديمة. أحد الرجلين كان يعاني من جروح عميقه، أما الثاني فكان فقدا لقدرة تحريك رجله اليمنى نتيجة لسقوطه عنيف، إضافة إلى جروح عميقه بجلده.

أمر الطبيب حقن المصابين فورا بمصل يحتوي على أجسام مضادة للتوكسين المركبة. ثم تم وضعه تحت المراقبة، تم خلالها قياس كمية الأجسام المضادة للتوكسين بالبلازما. و النتائج مدونة في الوثيقة (1).

التعليمات :

باستعمال الوثيقة المرفقة و باستغلال مكتسباتك

1 - أ - هل المصابان محصنان ؟ علل.

ب - هل تم تلقيحهما من قبل باللقاء المضاد للكزاز ؟ علل.

مع العلم أنه حتى يكون الفرد محصن ضد الكزاز يجب أن تكون بدمه كمية لا تقل عن 0,05 وحدة من الأجسام المضادة للتوكسين لكل $1mL$ من المصل.

2 - أ - ارسم منحني يبين تطور كمية الأجسام المضادة للكزاز بدلالة الزمن (زمن الحقن).


ب - كيف تفسر اختفاء الأجسام المضادة ؟

ج - هل هذان الشخصان تم تخصيصهما بشكل دائم ؟ ماذا يجب فعله حتى يتم ذلك ؟

3 - اشرح لماذا نجد أن بعض الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 40 سنة هم الذين يصابون بالكزاز ؟

4 - مراقبة الرجل الثاني بينت بعد ذلك أنه أصيب بالشلل برجله اليمنى، مع العلم أنه لم يفقد الإحساس بالألم.

بين بواسطة مخطط العناصر المتدخلة في القوس الانعكاسي مبرزا مكان الإصابة.



الوثيقة 1

الحلول

الموضوع العشرون 20

التمرين الأول (06 نقط)

1

1 – الصيغة الصبغية هي : $YX + 36$

2 – الخلية جسمية و ليست جنسية؛ لأن عدد الصبغيات زوجي و في الخلية الجنسية نجد صبغي واحد من كل زوج.

1,5

1

3 – الكائن ذكر لوجود الصبغي Y .

1

4 – رتبت الصبغيات على أساس تشابه في : الحجم، موقع الجزء المركزي.

1,5

5 – إنجاز الرسم :



التمرين الثاني (06 نقط)

1 – حساب البدانة عند كل طفل نستعمل القاعدة التالية :

$$\text{م.ك.ج} = \frac{\text{الوزن (kg)}}{\text{الطول}^2 (m)}$$

2

محمد : 18,75 ، علي : 20,70 ، هشام : 23,44 ، سهام : 27,34 .

0,5

2 – إذا كان هذا المؤشر أكبر من 27 يتم ظهور البدانة.

بعد حساب مؤشر البدانة يتضح أن سهام هي الوحيدة التي يسجل عندها مؤشر البدانة مرتفعا : 27,34 .

0,5

3 – أسباب ظهور البدانة عند الأطفال عديدة و أهمها هي : قلة النشاط الرياضي، تغذية غير متوازنة، تناول تغذية جد غنية (كثيرة الدهون و السكريات).

1,5

4 – الأمراض التي يمكن أن يتعرض إليها الأطفال هي : الإصابة بالضغط الشرياني – انسداد الأوعية الدموية – داء السكري.

0,75

5 – النصائح التي يمكن تقديمها لتجنب البدانة هي :

0,25

– عدم الأكل خارج الأوقات المحدد.

0,25

– تجنب الأغذية الغنية بالدهون و السكريات.

0,25

– ممارسة نشاط رياضي .

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 – أ – لا ، المصابان غير محسنين لأن كمية الأجسام المضادة بمصلهم تقدر بـ 0,04

0,5

وحدة/ملل و الكمية اللازمة هي 0,05 وحدة/ملل.

ب – نعم تم تلقيحهما من قبل لتوارد كمية من الأجسام المضادة الخاصة بالكزاز.


0,5

1

2 – أ – رسم المنحنى :

كمية الأجسام المضادة

(الوحدة/ملل)



ب – تفسير اختفاء الأجسام المضادة : كمية الأجسام المضادة المحقونة تكون محدّدة، لهذا

عندما ترتبط بمولادات الضد الكزازي، يتناقص عددها حتى تخفي تدريجياً بعد أداء دورها.

ج – لا، لم يتم تحصينها بشكل دائم لزوال الحصانة بزوال الأجسام المضادة، إذا فالحصانة

0,75

بالمصل المضاد هي حصانة مؤقتة و ليست دائمة.

0,5


ما يجب فعله هو حقنها بالللاج المضاد للكزاز ذي المفعول الدائم و البطيء.

3 : تعود إصابة هؤلاء الأفراد لعدم حرصهم على إعادة اللقاحات بعد المدة المقررة (و هي 10 سنوات).

0,75

2

4 – القوس الانعكاسي و العناصر المتدخلة :




سبب الشلل (أي عدم قدرة العضلة على التقلص) يعود لقطع تم على مستوى الليف العصبي الحركي المتواجد بالجدار البطني.

1

التمرين الأول (06 نقط)

نحر العضلة الساقية لضد الفرع و نتركها متصلة بالعصب الوركي ثم نقوم بالتجارب التالية :



1 — نبه في *A* ، تتحرك إبرة الغلفانومتر و تقلص العضلة.
اشرح ذلك.

2 — أ — حقن مادة الكورار
(مادة نباتية سامة تسبب الشلل)
في العصب ثم نبه في *A* ،
تحريك إبرة الغلفانومتر و تقلص العضلة.

ب — نضيف الكورار في *B* و نبه العضلة في *A* ، تتحرك إبرة الغلفانومتر ، لكن العضلة لا تقلص.

ج — نضيف الكورار في *B* و نبه العضلة مباشرة في *C* ، فتقلص العضلة.
حلل نتائج التجربة (أ) و (ب) و (ج) و حدّد مكان تأثير الكورار مع التعليل.

3 — اذكر باختصار آلية تأثير الكورار.

التمرين الثاني (06 نقط)


تستعمل الخلايا المغذيات التي تنقل من طرف الدم و البلغم بعد نهاية عملية الهضم. تترسخ هذه المغذيات من الشعيرات الدموية لتدخل في تركيب السائل البيني الذي يوصلها بجانب الجدار للخلايا.

1 — استشف الرسم المقابل ثم ضع العبارات الموالية في مكانها المناسب.
الطاقة، هدم المغذيات، غاز الأكسجين، الحرارة، فضلات، جزيئات جديدة، CO_2 ، استعمال المغذيات.

2 — حدّد مجالات استعمال المغذيات على مستوى الخلية.


3 — اعط تعريفا صحيحا للتنفس على مستوى الخلية.

4 — اكتب فقرة موجزة لا تتجاوز 4 أسطر حول استعمال المغذيات من طرف كل أعضاء العضوية.



الوضعية الإدماجية (08 نقط)

I — يعاني بعض أفراد عائلة «ص» من مرض *Lesch – Nyhan* و هو شكل من أشكال الشلل لكنه نادر، يؤدي إلى الموت قبل بلوغ سن البلوغ، تتميز هذه العاهة بعارض آخر وهو ارتفاع إفراز حمض البول. تمثل الوثيقة الشجرة العائلية الخاصة بهذا المرض في عائلة «ص».



II — إن ارتفاع نسبة الحمض البولي ناتج عن ارتفاع مادة اسمها

هيوكستين *Hypoxanthine* وهي ناجمة عن تحلل بعض المواد الأزوتية تدخل في تركيب الصبغيات. هذه المادة تحول إلى حمض البول ثم يعاد استعمالها من طرف الخلية تحت تأثير إنزيم *HGPRT*. عند الأشخاص المصابين هناك قصور في أنزيم *HGPRT*.

— المرأة رقم 21 تنتظر مولودا ثالثا، نأخذ كمية من سائلها الأمنيوسي و نحقن الخلايا الموجودة فيه بإضافة مادة *Hypoxanthine* متفلورة.

الملاحظة : نلاحظ أن التفلور بقي داخل الهيولى ولم يدخل إلى النواة.

1 — اعتمادا على هذه الوثيقة و باستغلال مكتسباتك

أ — هل العامل المرض سائد أم متعدد؟ علل.

ب — هل العامل محمول من طرف صبغي جنسي أو صبغي جسمي؟ علل.

ج — كيف تفسر أن أحد التوأمين مريض والآخر سليم؟

2 — انطلاقا من معطيات الجزء II؟

أ — لماذا قمنا بهذا التحليل؟

ب — ما هو جنس المولود؟ كيف توصلنا إلى ذلك؟

التمرين الأول (06 نقط)

0,5

1 — تحرك إبرة الغلفانومتر دليل على مرور التنبية على طول العصب.

0,5

— تقلص العضلة دليل على وصول التنبية إليها فقامت بتنفيذ الاستجابة.

2 — تحليل التجارب :

A — استجابة العصب و العضلة للتنبية دليل على مرور هذا الأخير من العصب، الذي لم يتأثر

0,5

B — تحرك إبرة الغلفانومتر دليل على مرور التنبية على طول العصب.

لكن عدم تقلص العضلة دليل على أن التنبية لم يصلها نتيجة حقنها بالكورار في المنطقة *B*,

0,5

منطقة اتصال العصب بالعضلة .

ج — تقلص العضلة عند تنبئها مباشرة بعد حقن الكورار في المنطقة *B* دليل على عدم

0,5

تأثيره في العضلة التي استجابت للتنبية.

مكان تأثير الكورار : يؤثر الكورار في منطقة اتصال العصب بالعضلة أي على مستوى

1 «المشبك» و الدليل على ذلك عدم تأثيره في العصب و العضلة عند حقنه مباشرة فيهما.

3 — آلية تأثير الكورار : يؤثر الكورار في الخلايا العصبية على مستوى المشابك و هي

مناطق تماس الخلايا العصبية بالخلايا العضلية، يعرقل (ينع) وصول التنبية «السائلة العصبية»


2

إلى العضلة التي لا تستطيع الاستجابة بالتقلص.

التمرين الثاني (06 نقط)

2

1 — الرسم : إعادة الرسم مع كتابة البيانات .



2 – تحديد مجالات استعمال المغذيات على مستوى الخلية هي :

- أ –** إنتاج الطاقة لاستخراج الحرارة و المحافظة على ثباتها في الجسم (37°). 0,5
- ب –** تزويد الخلية بالطاقة حتى تقوم بنشاطاتها المختلفة. 0,5
- ج –** تركيب جزيئات جديدة. 0,5

3 – التعريف الصحيح للتنفس على مستوى الخلية هو : أكسدة المغذيات و خاصة

الغلوسيدات على مستوى الخلايا في وجود غاز ثانوي الأكسجين (O_2). 1

4 – استعمال المغذيات من طرف كل أعضاء الجسم تتلخص فيما يلي : يزود الدم كل أعضاء الجسم بالمغذيات و غاز الأكسجين، حيث تستقبل العضلات الجليكوز لاستعماله في إنتاج الطاقة و منه الحفاظ على درجة حرارة الجسم، و تستعمل الغدد الملحقة مثل المعدة، الأحماض الأمينية لتركيب الأنزيمات الماضمة، كما تستعمل خلايا نقي أحمر للعظام، الأحماض الأمينية لتركيب خضب الدم الضروري في عملية التنفس. 1,5

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 – العامل الممرض : متاح لأن الأبوين 1 و 2 سالمان لكنهما أنجبا 7 ذكور مرضى، يعني أنهما حاملان للمرض. 1

السبب : العامل المتنحي لا يظهر إلا إذا كان مثلاً مرتين (محمول على صبغيين متماشين).

ب - العامل المرض : محمول من طرف صبغي جنسي وهو X ، عند الذكور يظهر المرض لأن X ممثل مرة واحدة ولا يوجد X آخر لکبحه.

ج - التفسير : أحد التوأمين سليم بينما الآخر مريض لأنهما توأمان غير حقيقين، ينحدر كل واحد من بوبيضة و نطفة متحدة و مختلفة عن بوبيضة و نطفة الآخر.

إذا المرض نتج عن بوبيضة تحمل عامل المرض، أما السليم فنتج عن بوبيضة لا تحمل عامل المرض.

قمنا بهذا التحليل لمعرفة :

— جنس الجنين.

— وهل هو مصاب أم لا.

ج - جنس المولود : ذكر.

السبب : عن هذه العائلة، الذكور فقط هم المصابون، ففي هذه الحالياً لاحظنا أن مادة *Hypoxanthine* لم تدخل النواة يعني لا تستعمل فهي تبقى في الهيولى حيث تتحول إلى حمض البول فالجنسين إذا مريض. و لالذكور فقط هم الذين يصابون بالمرض.

التمرين الأول (06 نقط)

بعض الفئران غير العادبة، تولد من دون تيموس، غياب التيموس يرافق بغياب الشعر. هذا ما يميز هذه الحيوانات التي سميت بالفئران العارية.

1 – كيف يؤثر غياب التيموس في الاستجابة المناعية ؟

2 – بحري لهذه الفئران زرعاً لجلد من جرذان مهقاء (Albinos).


ماذا نسمي هذا النوع من الطعم ؟ و كيف يتتطور عند هذه الفئران ؟

3 – ماذا يمكننا أن نفعل في ظروف تجريبية، لمنع الموت المبكر لهذه الفئران في محیط عادي ؟

التمرين الثاني (06 نقط)

الوثيقة التالية تمثل منطقتين لسحابة دموية تحت الجهر الضوئي.

الأرقام 1 و 2 تشير إلى نوعان من خلايا تتدخل في استجابة مناعية.



1 – سمي كل من الخلية 1 و 2 .

2 – حدّد مكان تشكل الخلية 1 و ما هي التغيرات التي تطرأ عليها.

3 – اشرح كيف تتمكن هذه الخلايا من القضاء على العنصر الغريب عن العضوية.


الوضعية الإدماجية (08 نقط)

تعاني عائلة عبد الرحمن من مرض وراثي نادر و هو عدم تحمل الفركتوز؛ إذ يعاني بعض أفرادها من الغثيان و النقيء بمجرد تناولهم لأغذية تحتوي على الفركتوز.

عند معايرة مكونات البول، نجد أن الفركتوز موجود في بولهم و هذا أمر غير طبيعي.

يقول الأطباء إن المرض ناتج عن قصور أنزيمي.

تمثل الوثيقة الشجرة العائلية للعائلة المدروسة.



باستعمال الوثيقة و بالاعتماد على معلوماتك الخاصة :

1 — ما هي الأغذية التي يجب أن يتفاداها أفراد العائلة المصابون ؟

2 — أ — هل الصفة المدروسة سائدة أم متمنية ؟ علل.

ب — اشرح كيف تنتقل الصفة عبر الأجيال.

ج — حدّد الأنماط التكوينية للأفراد التالية :

. 5 II و 2 II .

. 4 III و 8 III و 9 III .

. 1 IV و 2 IV و 1 V .

د — هل الصفة مرتبطة بالجنس ؟

3 — ما هي الإجراءات الوقائية التي يجب أن يتخذها الأفراد المصابون لتفادي كل الأعراض المرضية ؟

الموضوع الثاني والعشرون 22

الخلول

التمرين الأول (06 نقط)

1 – تأثير التيموس في الاستجابة المناعية : غياب التيموس يمنع نضج الخلايا اللمفاوية (T) ، و بالتالي لا تتم الاستجابة المناعية النوعية الخلوية التي تتدخل فيها المفاويات التائية (T) .

1

0,5

0,5

2 – الجرذ و الفار نوعان مختلفان.

يدعى هذا الطعم : الطعم المخالف.

– في الحالة العادبة الطبيعية (أي في حالة تواجد الغدة التيموسية سليمة) يرفض هذا الطعم حيث يتم تحليل خلاياه من طرف الخلايا اللمفاوية التائية (T) المتخصصة.

1

– أما عند الفئران العارية، التي لا تمتلك غدة تيموسية، يقبل الطعم و هذا لعدم التعرف عليه كجسم غريب.

1

3 – لمنع الموت المبكر لهذه الفئران : نحقنها بخلايا لمفاوية تائية (T) باستمرار أو نزرع لها غدة تيموسية.

1

0,5

0,5

– الأولى تعطيها حصانة مؤقتة.

– أما الثانية تعطيها حصانة دائمة.

التمرين الثاني (06 نقط)

1 – الخلية 1 هي خلية لمفاوية.
ال الخلية 2 هي خلية بيضاء متعددة الأنوية.

1

1

2 – تتشكل الخلية 1 على مستوى نقي العظام (Bone) ينقلها الدم من العظام نحو العقد اللمفاوية و تتحصص فيها حتى تتدرب على ما هو ذات و لا ذات.

1,5

3 – الخلية 1 لها القدرة على القضاء على الجسم الغريب باستعمال أجسام مضادة على حافة غشائتها الهيولية.

1,5

1

ال الخلية 2 تحول إلى بالعات تقوم ببلعمة الأجسام الغريبة.

الوضعية الإدماجية (٤٨ نقط)

١ — يجب على أفراد هذه العائلة المصاين تفادي كل أغذية تحتوي على فركتوز.
0,5
مثلاً : العسل — الفواكه — الجزر .
0,5

٢ — **الصفة المدرستة** : متنحية لأنها تظهر أحياناً في الأبناء بينما يكون الأبوان سليمين
1 مثلما هو الحال بالنسبة للزوج III مع 3 III مع 4 IV اللذان أنجبا 4 و 8 مريضين.

بـ — تنتقل الصفة عبر الأجيال كما يلي :

0,25
— الصفة السائدة (سليم) سا .
0,25
— الصفة المتنحية (مصاب) س .

— بالنسبة لـ I₁ و I₂ هما سليمان ظاهرياً لكن يحملان عامل المرض (س) على أحد الصبغيين .
0,5

إذاً منح الأب عامل المرض (س) والأم عامل المرض س يولد الابن (س س) مريضاً
أمّا إذا منح أحد الأبوين العامل سا (سليم) والآخر عامل المرض (س) فسيولد الابن سليماً
لكن يحمل عامل المرض (ساس) .
0,5

— أمّا إذا منح كلاً الأبوين عامل سا (سليم) فسيولد الابن سليماً لا يحمل عامل المرض .
0,5

جـ — الأنماط التكوية : الأبوان : ساس (الأم) + الأب (ساس) .

0,25
II₂ : ساس لأن أحد نسلها كان مريضاً .

0,25
II₅ : ساس لأن ابنته 8 مريضة .

0,25
IV₂ و IV₄ و IV₈ مصابون .
0,25

0,25
III₈ : س س مصاب .

0,25
III₉ : ساس لأن كل أطفالها سالمون رغم إصابة زوجها .
0,5
IV₁ : ساساً أو ساس .


0,25
IV₂ : س س .

0,5
V₁ : ساساً أو ساس .

- 0,5 د — الصفة غير مرتبطة بالجنس لأنها تصيب الذكور والإناث.
- 0,5 3 — الإجراءات : تفادي الأغذية الممرضة بل تفادي الزواج بين الأقارب.

التمرين الأول (06 نقط)

لاحظ العالم باستور خلال الأبحاث التي كان يقوم بها، أن حقن دجاج في مزرعة قديمة



بعضيات الكولييرا لم يقتل الدجاج، مع العلم أن في مزرعة حديثة تسبب في موت الدجاج، و بهذا فالمزرعة القديمة أعطت نتائج جديدة غير متوقعة. و انطلاقا منها تبني باستر مبدأ اللقاحات، و لك التجارب المبينة في الوثيقة.

1 – كيف تفسر موت دجاج المجموعة A ، و كيف تفسر عدم موت دجاج المجموعة B

بعد حقنه في المرة الثانية بعضيات الكولييرا المؤخوذة من المزرعة الحديثة ؟

2 – ما هي النتيجة التي كان يتوقعها باستر عن حقن دجاج المجموعة B في المزرعة القديمة؟

3 – ماذا حدث لبعضيات الكولييرا في المزرعة القديمة ؟

4 – اشرح سبب بقاء دجاج المجموعة B حيا بعد حقنه الأول و الثاني و الثالث.

5 – سمي باستر المزرعة القديمة باللناح. اذكر مبدأ تأثير اللقاحات انطلاقا مما سبق، علل.

التمرين الثاني (06 نقط)

أحمد عامل في شركة الأشغال العمومي، يعمل من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة عشر مساءا.

يتوقف كل العمال عن العمل في وسط النهار ساعة واحدة لتناول وجبة الغداء. عمل أحمد شاق نوعا ما، يقوم بحفر خنادق لوضع قنوات صرف مياه الأمطار.

1 — اقترح على أحمد وجدة غذائية تؤمن له حاجياته العضوية اليومية.

2 — ما هي الأغذية العضوية التي يجب أن تحتوي عليها وجنته الغذائية؟ لماذا؟

3 — ما هي حاجياته الطاقوية اليومية بالكيلوجول حيث يحتاج 3800 حريرة؟

الوضعية الإدماجية (٤٨ نقط)

1 — أمال امرأة حامل في الشهر الثاني، طلب منها طبيبها المعالج مجموعة من التحاليل الطبية. عند مراجعة الطبيب بالتحاليل قال لها : «إنك تنترين إلى زمرة O ، ريزوس سالب، فما هي زمرة زوجك؟ أجبت : زمرته A أو B ريزوس موجب، لست متوكدة من الزمرة جيدا. فرد الطبيب : في هذه الحالة يجب أن تتحققني مباشرة بعد الولادة بأجسام مضادة IgG المضادة لعامل الريزوس Rh ، وهي عملية وقائية تسمح لك بإنجاب أطفال ريزوس موجب دون خطر على حياتهم. سألت أمال : كيف يمكن أن يحدث هذا لأطفالي الآخرين و لا يوجد خطر على هذا المولود؟».

في نفس الأسبوع اتبه الزوج نحو المركز الطبي لإجراء التحاليل الدموية فقصد تحديد الزمرة و كان برفقة أخيه.

جاءت نتائج التحاليل في الوثيقة كما يلي :

كريات التحليل		مصل التحليل			
كريات B	كريات A	$Anti A$ + $Anti B$	$Anti B$	$Anti A$	
					زوج أمال
					أخ الزوج
تطبيق قطرات من مصل الشخص على معلق من الكريات الدموية			تطبيق هذا المصل على كريات الشخص الذي يقوم بالتحليل		

2 — أمال تريد أن تعرف جنس مولودها و هل هو سليم؛ لأن بعض أفراد عائلتها يعانون من مرض وراثي اسمه *Epithelioma adenoides cysticum*.

و يتمثل في وجود حبيبات و بقع ملونة على الوجه و باقي الجسم فأنها و أبوها مصابان به لأنهما أبناء عم، لكن هي و اختها غير مصابتين بينما أخوها مصاب به.

— اعتماداً على هذه الوثائق و معلوماتك الشخصية :

— لماذا يجب أن نتحقق أمال مباشرة بعد الولادة بحصول *Anti Rh* ؟

— لماذا لا يتشكل خطر على ابنتها الأول و يكمن الخطر في الولادات المقبلة ؟

3 — فيما يخص التحاليل الدموية للزوج و أخيه، أحد هذه التحاليل غير صحيح من هو ؟
علل إجابتك.

4 — ما هي حظوظها في أن تلد ابنا سليماً و معافاً؟ هل جنس المولود له علاقة بالإصابة بالمرض ؟

الحلول

الموضوع الثالث و العشرون 23

التمرين الأول (06 نقط)

1 — موت دجاج المجموعة A دليل على أن عصيات الكولييرا سامة و ميتة.

2 — عدم موت دجاج المجموعة B عند حقنها في المرة الثانية بالزرعه الحديثه دليل على أن المزرعه القديمه أكسبتها حصانه «مناعة».

3 — النتيجه التي كان يتوقعها باستور عند حقن دجاج المجموعة B في المزرعه القديمه هي الموت، لكن العكس هو ما حصل ولم يكن متوقعا.

4 — سبب بقاء دجاج المجموعة B حيا يعود إلى أن عصيات الكولييرا فقدت مفعولها السام عندما تركت لمدة 3 أشهر في المزرعه وأصبحت غير سامة أي غير ميتة.

و لهذا عند حقنها في دجاج المجموعة B بقي حيا؛ لأن العضوية تعرفت على أن عصيات المزرعه القديمه جسم غريب فاستجابت ضدها.

و عند الحقن الثاني في المزرعه القديمه كانت الاستجابة سريعة، لتعرفه على الجسم الغريب، فقضت عليه و بقي الدجاج حيا.

5 — يعتمد تأثير اللقاحات على الذاكرة المناعية.

التعليق : عند الحقن الأول في المزرعه القديمه احتفظت الخلايا المقاومه ذات الذاكرة على بنية مولد الضد «عصيات الكولييرا» لهذا عند الحقن بالزرعه الحديثه كانت الاستجابة فوريه فتم القضاء على العصيات قبل أن تؤثر على الدجاج.

التمرين الثاني (06 نقط)

1 — الوجبة الغذائيه التي يمكن اقتراحها على أحمد لتلبية حاجياته العضوية اليومية تمثل في : وجبة متنوعة تحتوي على الأصناف الأربعه من الغلوسيدات (عجائن مطبوخة، خضر طازجة، حلويات).

الصنفان من البروتينات (لحوم أو دجاج و جبن أو مشتقات الحليب الأخرى و صنف من المواد الدسم). كما يجب أخذ من $1,5\text{ l}$ إلى $2,1\text{ l}$ من الماء.

2 - الأغذية التي يجب أن تحتوي عليها وجنته الغذائية هي :

— يجب أن تحتوي وجنته على كمية كبيرة من الغلوسيدات و كمية معتبرة من الدسم، لأن عمله اليومي يتطلب استهلاك طاقة أكثر تؤمنه هذه المواد العضوية.

2,5

— كما يجب أن تحتوي وجنته على البروتينات لصيانة عضويته.

3 - حاجياته الطاقوية اليومية بالكيلوجول هي :

1

$$3800 \times 4,17 = 15884 \text{ kJ}$$

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 - يجب أن تحقن أمال مباشرة بمصل IgG ، لأن أثناء الولادة الأولى عند ترقق المشيمة، كمية من دم الجنين يمكن أن تمر إلى دم الأم.

1

إذا كان الجنين Rh فجسم الأم سوف يولد استجابة $Anti\ Rh$.

2 - عند الحمل الثاني وإذا كان الجنين Rh فإن الأجسام المضادة التي أفرزها جسم الأم تقوم بـ : محاربة كريات دم الجنين فيموت.

1

لهذا نحقن مباشرة بعد الولادة لأن IgG المحقونة سوف تتوضع على كريات دم الجنين المتواجدة في دم الأم و تمنعها من توليد استجابة مناعية.

1

3 - التحليل الغير صحيح، هو : تحليل أخي الزوج الذي يجب أن يعاد؛ لأن النتائج غير منطقية، لأن كريات دم الشخص ارتصت مع مصل A يعني أن سطحها يحتوي على مولدات AgA .

1

ثم نلاحظ أنه حدث ارتصاص عندما عالجنا المصل بكريات A يعني أن المصل يحتوي على الأجسام المضادة ضد A وهذا غير صحيح فالدم لا يمكن أن يحتوي في نفس الوقت على كريات حمراء تحمل مولد ضد و المصل يحتوي على الجسم المضاد المكمل له.

1

4 - حظوظ أمال في الإنجاب : أمال حضوضها مرتفعة في إنجاب طفل سليم، فالمرض الوراثي الذي يعني منه أفراد عائلتها صفة سائد يعني تظهر حتى وإن كان أحد الأبوين سليما.

1

- أمال، أبوها مريضان و أنجباها هي و اختها سالتين، يعني أحهما غير حاملين للمرض. و بما أن زوج أمال سليم، فطفلهما حتما سوف يكون سليمان من هذه العاهة الوراثية.
- 1 0,5 — الصفة السائدة تظهر حتى وإن كانت ممثلة بعامل واحد فقط.
- 0,5 — جنس المولود ليس له علاقة بالمرض لأنه مس كل أفراد عائلتها ذكورا و إناثا.

التمرين الأول (٥٦ نقط)


نزرع قطعة جلد من فأر (أ) لفأر (ب) من نفس النوع، يتم رفض هذا الطعم بعد بضعة أيام (حوالي 12 يوما) من زرعه و الوثيقة التالية توضح لك ذلك.

١ – ما نوع الطعم الذي أجري ؟ اذكر الأنواع الآخرين مع التعليل.

٢ – حلل نتائج التجربة.

٣ – حدّد طبيعة الاستجابة التي حدثت. علل ذلك.

٤ – هل زرع قطعة جلد من نفس الفأر تعطي نفس النتائج ؟ علل.



التمرين الثاني (٥٦ نقط)

البييسين (*Pepsin*) و الترييسين (*Trypsin*) أنزيمات لها دور في هضم البروتينات التي ترکب أغذیتنا.


المنحنيان المقابلان يوضحان تطور نشاط هذه الأنزيمات بدلالة درجة حموضة الوسط.

١ – حلل و فسر كلا من هذين المنحنيين.

٢ – اشرح كيف يتم هضم البروتينات في مختبر. علماً أننا نستعمل زلال البيض (*Ovalbumin*) في وجود البييسين.

3 – يتم هضم البروتينات جزئيا على مستوى المعدة و تكمن نهائيا على مستوى المعي الدقيق.

4 – حدّد عضوا آخر من الأنوب الهضمي يتم على مستوى هضم البروتينات و نوع الأنزيم المتدخل.



الوضعية الإدماجية (08 نقط)

عند الإنسان قد توجد عاهات وراثية خطيرة يمكن أن تبرز من خلال دراسة الطابع النووي.

- تمثل الوثيقة 1 طابعاً نووياً لشخص عادي.
- تمثل الوثيقة 2 أجزاء من طوابع نووية لطفلين ط₁ و ط₂ ، يظهران عاهات صبغية تؤدي عندهما إلى اضطرابات في النمو، علماً أن الصبغيات في الزوج 14 و الزوج 21 متماثلة عند ط₁ و ط₂ .

- 1** – متى يمكن أن ننجز الطابع النووي (أي مرحلة من عمر الخلية) ؟
- 2** – باستغلالك للوثائق المقترحة، قارن بين الوثيقتين 2 و 3 و مع مثيلتهما في الوثيقة 1 .
- ماذا تستنتج ؟

- تمثل الوثيقة 3 طوابع نووية جزئية لأم و أب الطفل ط₂ (و هما سالمان ظاهرياً).
- 3** – أعط الصيغة الصبغية للأعراض التي اتحدت لتعطي البوسيطة الأصل و منشأ الطفل ط₂ .


4 – هل يمكن لهذين الأبوين إنجاب طفل سليم علماً أن الأم حاملة للعاهة و لكنها سليمة ظاهرياً؟

الصبغيات 21	الصبغيات 14	
		الطفل 1
		الطفل 2

الوثيقة 2

الصبغيات 21	الصبغيات 14	
		أم الطفل 1
		أب الطفل 2

الوثيقة 3



الوثيقة 1

الحلول

الموضوع الرابع و العشرون 24

التمرين الأول (06 نقط)

0,5

1 – نوع الطعم : متتشابه، يكون بين فردینمن نفس النوع.

0,5

– الأنواع الأخرى : المتماثل : يكون بين توأمين حقيقين.

0,5

المتخالف : يكون بين نوعين مختلفين.

2 – تحليل النتائج : – يعود رفض الطعم لعدم تعرف عضوية الفأر (ب) على خلايا جلد

الفأر (أ) فاعتبرتها أجساما غريبة فولدت ضدها استجابة مناعية أدت إلى رفض الطعم. 1

– عند تحليل مصل الفأر (ب) بينت النتائج عدم وجود استجابة أي عدم وجود أجسام مضادة في المصل أي أن الاستجابة المناعية ليست خلطية.

– عند تحليل النسيج أظهرت النتائج وجود خلايا لمفاوية وهي من النوع (T) أي التائية التي أفرزت ضد الطعم و عملت على تحليل خلاياه مباشرة.

3 – إذا طبيعة الاستجابة المناعية في حالة رفض الطعم هي استجابة مناعية نوعية خلوية لتدخل الخلايا المفاوية التائية (T). 0,5

4 – لا تعطي نفس النتائج، بل يقبل الطعم لاعتبار خلاياه من الذات، يتعرف عليها الجهاز المناعي و لا يرفضها.

1

التمرين الثاني (06 نقط)

1 – تحليل و تفسير هذين المنحنيين :

أ – يزداد نشاط أنزيم البيبسين عندما يكون الوسط حامضيا $ph = 3$ و ينقص نشاطها عندما تقل درجة الحموضة.

1

ب – يزداد نشاط أنزيم التريبيسين عندما يكون الوسط معتدلا $ph = 7$ و ينقص نشاطها عندما يصبح الوسط قاعديا.

1

2 – يتم هضم البروتينات في مختبر عندما استعملنا زلال البيض مع البيبسين في وسط حامضي $ph = 3$ و درجة حرارة حياتية (37°).

1

3 – المبدأ التجاري لتفكيك البروتينات هو : وضع كمية من زلال البيض في أنبوب اختبار

يضاف إليها $HC\ell$ لتحميس الوسط إلى جانب إضافة إنزيم البيسيين، يوضع الأنبوب في درجة حرارة $37^\circ C$.

4 – يتم هضم البروتينات على مستوى العفج، حيث على مستوى تفرز المعكولة و جدار المعي الدقيق إنزيم التريبيسين التي تنهي هضم البروتينات المتبقية.

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

1 – ينجز الطابع النوروي أثناء مراحل الانقسام عندما تكون الصبغيات واضحة. خارج الانقسام يلاحظ الصبغيات.

1

2 – عند مقارنة 2 مع 3 نلاحظ نوعين من العاهة الصبغية :

1

– عاهة تمثيل العدد : الزوج 21 تحتوي على 3 صبغيات عوض 2.

1


– عاهة تمثيل الشكل في الزوج 14 (الصبغين مختلفين و ليس متماثلين).

– بما أن عدد الصبغيات لـ ط 1 و ط 2 تبقى ثابتة فيمكن أن نفترض أن صبغي في الزوج 21 قد اندمج مع أحد صبغين الزوج 14 وهذا ما يفسر اختفاءه في الزوج 21 و طول الصبغي في الزوج 14 (عند الأم).

1

1 + 1

3 – الصيغة الصبغية للأعراس :



4 – هناك احتمال $1/2$ لكي ينجذب هؤلاء الآباء طفلا عاديا إذا منحت الأم الصبغي العادي بشرط أن تكون البو胥ة المتشكلة عادية. الأب كل نطاوه عادية.

1

النوصوص


الموضوع الخامس والعشرون 25

التمرين الأول (٥٦ نقط)


C امرأة سليمة




D امرأة سليمة



A رجل سليم



B رجل مريض




1 – يمثل المخطط التالي الشجرة العائلية لعائلة ظهرت على بعض أفرادها أعراض داء الهيموفيليا «الناعور – Hemophilia». تركز الدراسة على الصبغيات الجنسية رقم 23.

- زواج + نسل مورثة مورثة سليمة الهيموفيليا

رجل امرأة

1 – ما هو الفرق بين المرأة السليمة C و D ؟

2 – اعتماداً على معلوماتك، اشرح كيف انتقل مرض الهيموفيليا من الجد إلى الأحفاد مع كتابة الصيغ الصبغية في كل مرة حيث تكتب مثلاً :



00+44 نوع المورثات.

3 – لماذا لا توجد أي امرأة مريضة في هذه العائلة ؟

التمرين الثاني (٥٦ نقط)

يمثل الرسم التخطيطي المقابل نقل المغذيات بعد نهاية عملية الهضم التي تحدث داخل الأنوب الهضمي. كل مجموعة من المغذيات تسلك طريقاً معيناً حتى تنتقل داخل الأوساط الداخلية لتستعمل من طرف خلايا الأعضاء المركبة للعضوية.

1 – أعد الرسم المقابل مع كتابة البيانات التالية

ثم ضع العنوانا المناسب.

زغابة — المعى الدقيق — أوعية بلغمية

— قناة بلغمية — الوريد تحت الترقوة

— الوريد الأحوف العلوي — الوريد فوق الكبد

— الكبد — الوريد البابي.

2 — حدّ طبيعة طريق الامتصاص.

3 — ما هي المساحة الاجمالية للجدار الداخلي

للمعى الدقيق ؟

ما هي علاقتها مع عملية الامتصاص ؟

4 — مم يتركب الدم بعدما يخرج من الوريد

فوق الكبد ؟

الوضعية الإدماجية (08 نقط)

في القسم طلب الأستاذ من تلامذته التفكير في كل التحولات التي تطرأ على الأغذية في

الجهاز الهضمي و وضع معهم الإشكالية التالية :

ما هي كل التغيرات التي تتعرض لها الأغذية عندما تدخل الأنوب الهضمي ؟

قدم دليلاً تجريرياً يتضمن المراحل التجريبية التي يجب أن يبعها كل فوج لاستخلاص النتائج


المراد الوصول إليها.

— المجموعة الأولى : طلب منها إجراء هضم النشاء في المختبر.


— المجموعة الثانية : طلب منها إجراء هضم زلال البيض في مختبر.

بعد تركيب التجارب تحصلنا على الوثائق التالية :

أ / التجربة الأولى هضم النساء في مختبر



ب / التجربة الثانية هضم زلال البيض (بروتين) في مختبر



باستغلال التجارب التي تم إنجازها و مكتسباتك :

١ - علماً أن التجربة الأولى، الأنبوب ١ يحتوي على النساء + لعاب و الأنبوب ٢ يحتوي على زلال البيض + لعاب.

أ — سجل ملاحظاتك بعد مرور ساعة من الزمن بعد إجراء التحليل الكيميائي.

بـ ما هي النتائج التي تحصلنا عليها من خلال هذه التجربة؟

— أما التجربة الثانية فتحتوي الأنابيب الثلاثة على زلال البيض + أنزيم البييسين و وضع كل أنبوب في درجة حموضة معينة.

٢—أ سجل ملاحظاتك بعد نهاية التجربة و إجراء التحليل الكيميائي.

بـ ما هي النتائج التي تحصلنا عليها من خلال هذه التجربة؟

٣ – لماذا وضعت كل الأنابيب في حمام مائي (٣٧°)؟

٤ — حدّد الغدد المسؤولة على إفراز كل من أنزيم اللعابين و البيبيسين.

5 — ما هي خصائص هذه الأنزيمات المراد إفرازها من خلال هذه التجارب ؟

6 — حدّد مختلف أقسام الأنوب الهضمي التي تقوم بإفراز الأنزيمات و طبيعة هذه الأنزيمات.

الحلول

الموضوع الخامس و العشرون 25

التمرين الأول (06 نقط)

1 – الفرق بين المرأة السليمة C و D هو :

C سليمة و D سليمة أيضا لكنها حاملة لوراثة المرض و بما أنها صفة متمنية فلا تظهر عند

0,75

المرأة.


0,5	$44 + \text{♂}$	2 – الشرح : الجد كان مريضا يعني :
0,5	$23 + 0$ و $23 + \text{♀}$	أثناء تشكل الأعراس كان هناك نوعان من الأعرas :
0,5	$44 + \text{♂}$	تزواج الجد 1 مع الجدة 2 أعطى : ولد سليم يعني :
0,25	$44 + \text{♂♂}$	و ابنة سليم ولكن حاملة للمرض :
0,25		– الابن 4 تزوج من امرأة سليم فكان نسلهما كله سليميا.
0,25	$23 + \text{♂}$ و $23 + \text{♂}$	– البنت 5 تزوجت من رجل سليم، لكنها حاملة للمرض، لهذا شكلت نوعين من الأعراس .
1		– ابنها 11 سليم لأنه أخذ X سليم، لكن ابنها 12 مريض لأنها منحته X حامل للمرض.
0,5		– فما يخص ابنتهما 10 لا يمكن أن يحدد إذا كانت حاملة للمرض إلا بعد أن تزوج و تنجب.

3 – لا توجد نساء مصابات بالمرض لأن الصيغة الصبغية غير موجودة فالبوسيضة الملقحة ذات الصيغي XX و حاملة للمرض تموت في الانقسامات الأولى و لا تتطور إلى جنين.

1,5

التمرين الثاني (٥٦ نقط)

١ - إعادة الرسم، كتابة البيانات و العنوان :



٢ - طبيعة طريقي الامتصاص هي :

أ - طريق الامتصاص الدموي تمر فيها كل من الفيتامينات، الأحماض الأمينية، الجلوكوز، جزء من الماء والأملاح المعدنية.

0,5

ب - العلاقة الموجودة بين هذه المساحة و عملية الامتصاص هي : كلما كانت المساحة كبيرة كلما قام الدم بامتصاص كمية كبيرة من المغذيات.

0,5

٣ - أ - المساحة الإجمالية للجدار الداخلي للمعوي الدقيق هي : حوالي $200m^2$.

ب - العلاقة الموجودة بين هذه المساحة و عملية الامتصاص هي : كلما كانت المساحة كبيرة كلما قام الدم بامتصاص كمية كبيرة من المغذيات.

1

٤ - يتركب الدم الخارج من الوريد فوق الكبد من عدة مركبات منها : البلازما الذي يحتوي على بروتينات، الماء، العناصر الذائبة (مثل المغذيات) و كريات الدم الحمراء، البيضاء و الصفائح الدموية.

1

الوضعية الإدماجية (٤٨ نقط)

١ – الملاحظات المسجلة على كل من الأنوب (أ) و (ب) في التجربة ١ هي :

الأنبوب (أ) لا نسجل تفاعلا مع ماء اليود ولكن نسجل تفاعلا مع محلول فهنج بوجود الحرارة.

الأنبوب (ب) نسجل تفاعلا بالأصفر الأحيني.

ب١ : يتحول مطبوخ النشاء بعد إجراء عليه هضم في نختير حيث يتحول إلى سكر بسيط في وجود أنزيم اللعاب.

ب٢ : لا يتحول زلال البيض في وجود أنزيم اللعاب.

٢ – الملاحظات المسجلة على الأنابيب الثلاثة في التجربة ٢ هي :

– التفاعل سالب في الأنوب (١) . $ph = 8$

– التفاعل موجب في الأنوب (٢) . $ph = 5$ و الثالث 7

ب١ – التفاعل موجب؛ لأن أنزيم البيبسين تنشط في وسط حامضي.

ب٢ – التفاعل كان سلي بالأصفر الأحيني لأن أنزيم الهاضمة للبروتينات يبطل مفعولها في الوسط المعتدل و القاعدي.

٣ – وضعت كل الأنابيب في حمام مائي (37°)؛ لأن مفعول الأنزيمات يكون إيجابيا في درجة الحرارة الحياتية (37°) .

٤ – الغدد المسؤولة عن إفراز كل من أنزيم اللعاب و البيبسين هما : الغدد اللعابية و الغدد المعدية .

٥ – خاصية هذه الأنزيمات المراد دراستها من خلال هذه التجارب هي : كل أنزيم تؤثر في نوع معين من الجزيئات الغذائية التي تدخل الأنوب الهضمي، و نقول إن الأنزيمات لها أثر نوعي على الأغذية.

٦ – مختلف أقسام الأنوب الهضمي التي تقوم بإفراز الأنزيمات و طبيعة هذه الأنزيمات هي :

- الغدد الـلـعـاـيـة** = اللعابين (الأميلاز) هضم النساء المطبوخ.
- الغدد الـمـعـدـيـة** = الروتياز (البيبسين) هضم البروتينات.
- الغدد الـمـعـكـلـيـة** = التريبيسيين، هضم البروتينات.
- الغدد الـمـعـوـيـة** = المالتاز، هضم سكر الشعير.
- لاكتاز، هضم سكر اللبن.

فهرس المحتويات

- الرمز 72 يعني الموضوع السابع 7 — التمرين الثاني 2.
- الرمز 163 يعني الموضوع السادس عشر 16 — الوضعية الإدماجية 3.

رقم موضوع الاختبار و طبيعته						المحتويات	التنمية عند الإنسان	
13						تحول الأغذية في الأنوب المضمي		
191								
23						امتصاص المغذيات و طريقة نقلها في الجسم		
33								
222						امتصاص المغذيات		
43								
232						التوازن الغذائي		
12								
203						الاتصال العصبي		
21								
121						الاستجابة المناعية		
31								
221						الاعتلالات المناعية		
11								
22						مراحل تطور الجنين		
123								
201						الدعامة الوراثية لانتقال الصفات		
251								