

- الحساب في معلم متعمد و متباين
- الحساب التكامل
- الدالة الأسية
- الدالة اللوغاريتمية
- الاحتمالات

دنان عمر

2

# رياضيات

## الحساب التكامل

**خواص:**  $f$  و  $g$  دالتان مستمرتان على المجال  $I$

$c, b, a$  ثلثة أعداد حقيقية من  $I$ .

- $\int_a^a f(x) dx = 0$
- $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$
- $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$
- $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$
- $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

إذا كان  $a \leq b$  و  $f(x) \leq g(x)$  ومن أجل كل

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx : I \text{ من } x$$

تعريف:  $f$  دالة مستمرة على المجال  $I$  من  $R$  و  $b$  عدوان حقيقيان من  $I$  حيث  $a \leq b$  حيث  $f$  من  $a$  إلى  $b$  العدد الحقيقي المعروف كما يلي:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

حيث  $F$  دالة أصلية للدالة  $f$  على  $I$

إذا كان  $a \leq b$  و  $f(x) \geq 0$  ومن أجل كل

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0 : I \text{ من } x$$

## نظرية القيمة المتوسطة

دالة مستمرة على المجال  $[a,b]$  فإن  $f([a,b]) = [m,M]$  إذا كان  $m \leq \int_a^b f(t) dt \leq M(b-a)$

**نتائج:** إذا كان  $a \neq b$  فإن:  $m \leq \frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(t) dt \leq M$


نسمي  $\bar{f} = \frac{1}{(b-a)} \int_a^b f(t) dt$  القيمة المتوسطة للدالة  $f$  على المجال  $I$

لتكن  $u$  و  $v$  دالتان قابلتان للإشتقاق على مجال  $I$  بحيث دالتهما المشتقة  $u'$  و  $v'$  مستمرتان على  $I$  ولتكن  $a$  و  $b$  من  $I$

$$\int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx = [u(x) \cdot v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) \cdot v(x) dx$$

بذلك

إذا كان	نقول أن	الخاصة
$A = \emptyset$	$A$ هي الحادثة المستحيلة	$P(\emptyset) = 0$
$A$	$A$ حادثة كيفية	$1 \geq P(A) \geq 0$
$A \cap B = \emptyset$	$A$ و $B$ حداثين غير مترافقين	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
$A = E$	$A$ هي الحادثة الأكيدة	$P(E) = 1$
$\bar{A}$	$A$ هي الحادثة العكسية	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
$B, A$	$B$ و $A$ كيفيتان	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$



صورة -  
هادئ



2008 - 066

حي الكبان، عمارة آ، مدخل 10، محل 23، المحمدية، الجزائر.  
الهاتف: 021 82 96 37 / 021 82 96 37  
البريد الإلكتروني: cledition@gmail.com




## الدالة الأسية ذات الأساس $e$

من أجل الأعداد الحقيقية  $a, x$  و  $b$  لدينا:

- $e^1 = e$
- $e^0 = 1$
- $e^x > 0$
- $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$
- $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
- $e^{b-a} = \frac{e^b}{e^a}$
- $e^a = e^b$  يكافي  $b = a$
- $a < b$  يكافي  $e^a < e^b$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$



$$\bullet \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \quad \bullet (a^x)^y = a^{xy} \quad \bullet a^x \cdot a^y = a^{x+y} \quad \bullet \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x} \quad \bullet \frac{1}{a^y} = a^{-y}$$

**تعريف:** توجد دالة وحيدة قابلة للإشتقاق على  $R$  بحيث  $f(0) = 1$  و  $f'(x) = f(x)$  ونرمز لها بالرمز  $\exp$  ونسميها الدالة ذات الأساس  $e$

## ■ نتائج:

- من أجل  $x$  من  $R$  و  $X$  من  $R_+$  لدينا:

$$x = \ln X \text{ معناه } e^x = X$$

$$\ln e = 1, e^{\ln x} = x$$

- الدالة الأسية معرفة وقابلة للإشتقاق على  $R$

وتساوي دالتها المشتقة

- إذا كانت  $u(x)$  قابلة للإشتقاق على  $D$  فإن الدالة  $x \rightarrow e^{u(x)}$  قابلة على  $D$  ودالتها المشتقة

$$x \rightarrow u'(x)e^{u(x)} \quad \text{هي:}$$

## الدالة الأسية ذات الأساس $a$

ليكن  $a \in R_+$  من أجل كل  $x$  من  $R$  لدينا

$$a^x = e^{x \ln(a)}$$

## خواص:

من أجل العددان الحقيقيان الموجبان تماماً  $a$  و  $b$  ومن أجل الحقيقيان  $x, y$  لدينا:

$$\bullet (a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x \quad \bullet I^x = I$$

## الإحتمالات الشرطية

### • المثلث العددي:

$n \backslash P$	0	1	2	3	4	5
0	1			$C_{n-1}^{P-1} + C_{n-1}^P$		
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

### • دستور ثنائي الحد:

$n > P$  عددان طبيعيان و  $n$  عدد طبيعي حيث:  $a$  و  $b$

$$(a+b)^n = \sum_{P=0}^n C_n^P a^{n-p} \cdot b^p$$

$$= a^n + C_n^P a^{n-1} b + \dots + C_n^P a^{n-p} b^p + \dots + b^n$$

سحب  $P$  كرة من صندوق يشمل  $n$  كرة توجد عدة حالات

السحب	على التوالي	في آن واحد
تعاد الكوة إلى الصندوق	$n^P$ قائمة	<del>✓</del>
لا تعاد الكوة إلى الصندوق	$A_n^P$ ترتيبية	$C_n^P$ توفيقية

► ■  $A_n^P = \frac{n!}{(n-P)!}$

■  $C_n^n = 1$

مجموعة متجهة ذات  $n$  عنصرا حيث  $1 \leq n \leq P$   
 $P$  عدد طبيعي،

■ عدد قوائم ذات  $P$  عنصرا من  $E$  هو:

• الترتيبات:  
مجموعة ذات  $n$  عنصرا و  $P$  عدد طبيعي غير معروف حيث  $P \leq n$ .

عدد ترتيبات  $P$  عنصرا من مجموعة ذات  $n$  عنصرا هو العدد الطبيعي  $A_n^P$  المعرف كما يلي:

$$A_n^P = n(n-1)(n-2) \dots (n-P+1)$$

• التبديلات:  
عدد تبديلات مجموعة ذات  $n$  عنصرا هو  $n!$  المعرف كما يلي:

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$$

• التوفيقات:  
 $P \leq n$  و  $P$  عددان طبيعيان حيث  
عدد توفيقات  $P$  عنصرا من مجموعة ذات  $n$  عنصر هو العدد  $C_n^P$  أو  $\binom{P}{n}$  المعرف كما يلي:

$$C_n^P = \frac{n!}{P!(n-P)!}$$

• خواص:  
 $P \leq n$  و  $P$  عددان طبيعيان حيث

■  $C_{n-1}^{P-1} + C_{n-1}^P = C_n^P$

■  $C_n^P = C_n^{n-P}$

## ■ النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$$


$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \ln(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$$

## المشتقة ■

- إذا كانت  $u(x)$  قابلة للإشتقاق وموجبة تماما على المجال  $D$  فإن الدالة  $\ln(u(x))$  قابلة على

$$(\ln \circ u)' = \frac{u'(x)}{u(x)} \quad \text{و دالتها المشتقة هي: } D$$



## الدالة اللوغاريتمية النسبية

تعريف: دالة  $\ln(x)$  معرفة وقابلة للإشتقاق على  $[0, \infty[$

$$\ln(1) = 0 \quad \ln'(x) = \frac{1}{x}$$

خواص:

من أجل العددان الحقيقيان الموجبان تماما

$a$  و  $b$  لدينا:

$$\ln \frac{a}{b} = \ln(a) - \ln(b) \quad \ln \frac{1}{b} = -\ln(b)$$

$$\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln(a), \ln(a^n) = n \cdot \ln(a), n \in \mathbb{Z}$$

$a = b$  يكافي  $\ln(a) = \ln(b)$

$a > b$  يكافي  $\ln(a) > \ln(b)$

$0 < a < 1$  يكافي  $\ln(a) < 0$

$a > 1$  يكافي  $\ln(a) > 0$

$$\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$$

## دالة اللوغاریتم العشري

تعريف: نسمى دالة اللوغاریتم العشري التي نرمز لها بالرمز  $\log$  معرفة على  $[0, \infty[$  كما

$$\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln 10} \quad \text{يلي:}$$

خواص:

من أجل العددان الحقيقيان الموجبان تماما  $a$  و  $b$

$$\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b) \quad \text{لدينا:}$$

$$\log(a^n) = n \cdot \log(a), n \in \mathbb{Z}$$

$$\log 10 = 1 \quad \log 1 = 0$$

نتيجة: إذا كان  $x$  عددا حقيقيا موجبا

تماما حيث:

$$10^n \leq x \leq 10^{n+1} \quad \text{فإن} \quad n \leq \log x \leq n+1$$

## المعادلات التفاضلية : حلول المعادلة $y' = ay$

### ● مبرهنة 2

و  $a$  عدداً حقيقياً حيث  $a$  غير معروف  
الحلول على  $R$  للمعادلة التفاضلية  $y' = ay + b$   
هي الدوال  $f$  المعرفة على  $R$  كما يلي :

$$f(x) = C \cdot e^{ax} - \frac{b}{a}, \quad C \in R$$

### ● مبرهنة 1

ليكن  $a$  عدداً حقيقياً غير معروف  
الحلول على  $R$  للمعادلة التفاضلية  $y' = ay$  هي  
الدوال  $f$  المعرفة على  $R$  كما يلي :

$$f(x) = C \cdot e^{ax}, \quad C \in R$$

## الحساب في معلم متعامد ومتجانس

خواص :

ليكن  $\vec{u}$  ،  $\vec{v}$  ،  $\vec{w}$  أشعه ،  $k$  عدد حقيقي.

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v}$$

$$\vec{v}(\vec{u} + \vec{w}) = \vec{v}\vec{u} + \vec{v}\vec{w}$$

$$\vec{v}(k\vec{u}) = k(\vec{v}\vec{u})$$

بالتعريف : الشعاعان  $\vec{u}$  ،  $\vec{v}$  متعامدان إذا كان:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

■  $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + \vec{v}^2 + 2\vec{v}\vec{u}$

■  $(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + \vec{v}^2 - 2\vec{v}\vec{u}$

■  $(\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$

مع  $\vec{v}^2 = \|\vec{v}\|^2$  و  $\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس

$$(o, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$$

إذا كان  $(x', y', z')$  و  $(x, y, z)$  شعاعان  
من الفضاء

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v})$$


### ■ الجداء السلمي

ليكن الشعاعان  $\vec{v} = \vec{AC}$  و  $\vec{u} = \vec{AB}$  شعاعان من  
الفضاء حيث  $(\vec{u} \neq \vec{0})$

■ الجداء السلمي  $\vec{uv}$  هو العدد الحقيقي :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{AB} \times \vec{AH}$$

حيث  $H$  هي المسقط العمودي للنقطة  $C$  على المستقيم  
 $(AB)$  الموجه.




إذا كل  $\vec{v} \neq 0$  و  $\vec{u} \neq 0$  فإن :


$$\vec{uv} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos \theta$$

$\widehat{BAC}$  هي قيس الزاوية  $\theta$


## الحجوم




$$V = a^3$$



$$V = L \times l \times h$$




$$V = B \times h$$




$$V = \pi r^2 \times h$$

: مساحة القاعدة  $B$




$$V = \frac{1}{3} B \times h$$

: مساحة القاعدة  $B$



## ● سطح كرة

سطح الكرة التي مركزها  $c(a, b, c)$  ونصف قطرها  $R > 0$  هي مجموعة النقط  $M(x, y, z)$  حيث :



المعادلة الديكارتية لسطح هذه الكرة هي

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$$

## ■ معادلة كرة معرفة بقطرها $AB$

و  $A$  و  $B$  نقطتان من الفضاء. مجموعة النقط  $M$  التي تحقق  $\vec{AM} \cdot \vec{BM} = 0$  هي سطح الكرة التي قطرها  $AB$

■ إذا كانت  $(x_1, y_1, z_1)$  و  $(x_0, y_0, z_0)$  نقطتين مختلفتين فإن معادلة سطح الكرة التي قطرها  $AB$  هي :

$$(x-x_0)(x-x_1) + (y-y_0)(y-y_1) + (z-z_0)(z-z_1) = 0$$


## ● السطح الأسطواني الدوراني

المعادلة الديكارتية للسطح الأسطواني الدوراني الذي محوره  $OZ$  ونصف قطره  $r$  هي مجموعة النقط  $M(x, y, z)$  حيث :

$$x^2 + y^2 = r^2$$

## ● المستوى

يوجد مستوى وحيد  $P$  في الفضاء يمر من النقطة  $A(x_0, y_0, z_0)$  وعمودي على الشعاع غير المعدوم  $M(x, y, z)$  هي مجموعة النقط  $\vec{n}(a, b, c)$  التي تحقق  $\vec{n} \cdot \vec{AM} = 0$  أي  $a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$



■ لتكن  $c, b, a$  ثالث نقط ليست كلها معدومة: مجموعة النقط  $M(x, y, z)$  التي تتحقق العلاقة

$$ax + by + cz + d = 0$$

هي معادلة المستوى  $P$  العمودي على الشعاع  $i(a, b, c)$


## ● بعد نقطة عن مستوى

ليكن  $P$  المستوى الذي معادلته :

$$ax + by + cz + d = 0$$

نقطة من الفضاء.

$$AH = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$



## ● طولية شعاع

إذا كان  $(x, y, z)$  شعاع من الفضاء فإن :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

## ● المسافة بين نقطتين

لتكن  $B(x_2, y_2, z_2)$  و  $A(x_1, y_1, z_1)$  نقطتان من الفضاء

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

## ● التمثيل الشعاعي لمستقيم

لتكن  $A, B$  نقطتان مختلفتان من الفضاء، المستقيم  $(AB)$  هي مجموعة النقاط من الفضاء التي من أجلها يوجد عدد حقيقي  $k$  والتي تتحقق:

$$\vec{AM} = k \vec{AB}$$

## ■ التقسيير في معلم

ليكن  $\vec{u}$  شعاع توجيه المستقيم  $D$  و  $A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}$

لتكن  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$  إحداثيات النقطة  $M$ .

المساواة  $\vec{AM} = k \vec{AB}$  تكتب

$$\begin{cases} x = x_A + k \alpha \\ y = y_A + k \beta \\ z = z_A + k \gamma \end{cases} \quad k \in R$$

تسمى التمثيل الوسيطي للمستقيم  $D$